Phys. sp.
188

tendit ad æquum
Ad Bibliothecam
Academiæ Scientiarum
Electoralis Boicæ Monachii

<36609033760019

<36609033760019

Bayer. Staatsbibliothek

Phys. Sp. ~~469~~.
188.

Physica. De instrumentis meteorologicis

~~422~~.
425

R

Michael du Crest kleine Schriften von den Thermometern und Barometern

Dritte
und mit einer
neuen Abhandlung des Autoris
einige
Versuche mit Thermometern
betreffend
sowohl
als mit einer neuen Abhandlung
von den
Barometern
vermehrte Auflage
mit Kupfern.

Aus dem Französischen übersetzt
und
mit einigen Anmerkungen begleitet
von
M. Johann Christoph Thenn.

Augsburg,
bey Eberhard Kletts sel. Wittib. 1770.

Bayerische
Staatsbibliothek
München

Vorerinnerung
des
Uebersezers.

Es ist vor weniger Zeit diese Schrift, welche hier in einem deutschen Kleide erscheinet, in Basel in französischer Sprache herausgekommen und von dem Herrn Verfaßer selbst auf vielfältiges Ansuchen diese Sammlung von theils neuen,

theils alten, jedoch vermehrten und von ihm selbst verfertigten Stüken veranstaltet worden. So bald mir dieselbe in die Hände gekommen, so habe ich dafür gehalten, daß sie eine deutsche Uebersezung verdiente, und zwar um so viel mehr, da sie nicht nur die Lehre von den Thermometern selbst, sondern auch manche dahin einschlagende physicalische Meynungen und angenommene Säze zu untersuchen und zu berichtigen bemühet ist. Villeicht gibt sie wenigstens Gelegenheit, wenn auch die darinnen angenommene Meynungen von der Kälte und von den verschiedenen Graden derselben, unter welchen das Eis gefrieren kan, nicht völlig und allgemein gebilliget werden sollten, daß diese Sache noch etwas genauer untersuchet und die Natur in diesem Stüke noch beßer erforschet

forschet wird. Doch schon die darinnen enthaltene Lehre von den Thermometern und der Vorschlag ein allgemeines Thermometer zu verfertigen, verdienet die Aufmerksamkeit aller Liebhaber der Natur. Man nennet diejenige Instrumente Thermometer, welche uns die Abwechselungen der Wärme und Kälte in der Luft anzeigen, und man hält den Cornelium Drebbel, einen sehr sinnreichen und in Erfindungen glücklichen Bauer in Nord-Holland für den ersten Erfinder derselben. Da man aber gar bald gesehen, daß dieses Drebbelische Thermometer, so wie alle erste Erfindungen gemeiniglich noch sehr unvollkommen zu seyn pflegen, gar merklichen Fehlern unterworfen sey, so hat man auf eine Veränderung deßelben gedacht. Es kame

me das Florentinische Wetterglas auf, welches mit Weingeist gefüllet ware, da das Drebbelische nur aus Waßer bestunde, und es wurde deswegen das Florentinische Thermometer genennet, weil es die Academie der Wißenschaften, die dazumahl zu Florenz blühete, solle erfunden haben. Allein auch dieses Thermometer hatte einen merklichen Fehler, welcher darinnen bestunde, daß keines mit dem andern übereinkame und es also sehr unverständlich ware, wenn man sagte, daß die Wärme oder Kälte so viel Grade ab und zugenommen habe. Es konnte also zwar ein jeder, der mit diesem Instrumente versehen ware, solches vor sich selbst wißen, allein er konnte sich nicht andern erklären und ihnen einen Begrif hievon beybringen. Man hat sich dahero bemühet durch allerhand

hand Mittel und Wege zu einer verſtändlichen Eintheilung der Thermometer zu gelangen, allein bishero noch nicht recht damit zu Stande kommen können. Fahrenheit hat ſich zwar bemühet, dergleichen Wettergläſer zu verfertigen, welche mit einander zutreffen, allein er iſt nicht in allen glücklich geweſen, und es finden ſich viele von ihm, welche nicht völlig mit einander übereinſtimmen. Die Urſache hievon wird aus der Schrift des Herrn Verfaßers ſelbſt deutlicher werden. Andere haben ſich nicht weniger bemühet dergleichen ins Werk zu richten, und wir haben dieſer Abſicht die Newtoniſche, Desliſliſche, Reaumuriſche und andere Thermometer ſowohl von Weingeiſt als von Queckſilber zu danken. Da aber ein jedes derſelben wieder

seine besondere und eigene Abtheilung hat, so findet sich eben diese Unvollkommenheit noch in Ansehung dieser verschiedenen Wettergläser, welche man bey den Florentinischen antrifft. Derjenige, welcher ein Fahrenheitisches besitzet, kan den Grad der Kälte nicht wißen, welchen ein anderer auf seinem Reaumurischen Thermometer beobachtet hat, und es bleibt also diesen beyden gänzlich unbekannt, welches Thermometer mehr oder weniger angezeiget habe. Man mag also noch so sorgfältig die Beobachtungen anstellen als man will, so ist man doch nicht im Stande, sie mit und unter einander zu vergleichen. Es hat dahero der Verfaßer dieser Schrift diesem bisherigen Fehler abzuhelfen gesucht, und theils gezeiget, wie man mit einander übereinstimmende Thermome-

mometer machen müße, theils wie man andere Thermometer damit vergleichen könne; so daß man, wenn man ein Wetterglas von dieser oder jener Art besizet, im Stande sey, die nach einem andern Thermometer angegebene Wärme oder Kälte zu beurtheilen und sich einen Begrif davon zu machen. Man erkennet also hieraus zur Genüge, daß der Herr Verfasser mit dieser seiner Bemühung vielen Dank verdiene, da er durch seine Arbeit und vieljährige Versuche diese Instrumente zu einer solchen Vollkommenheit gebracht, daß man nunmehro mit Grund hoffen kan, daß kein Schiboleth mehr die Sprache der Naturforscher in Bestimmung der Wärme und der Kälte stöhren werde. Da es aber nicht jedermanns Werk ist, sich mit Verfertigung dieser Wetter-

gläser abzugeben, da sie mehr Zeit, Arbeit uud Vorsichtigkeit erfordern, als von manchen, welche sich dergleichen zu haben wünschen möchten, angewendet werden kan; so hat der Herr Verfaßer sich das Publicum noch mehr verbindlich machen wollen, und den hier in Augsburg befindlichen Mechanicus, welcher wegen seiner übrigen sowohl physicalischen als mathematischen Instrumenten sattsam bekannt ist, Herrn Georg Friederich Brander, mit denen hiezu gehörigen Nachrichten und nöthigen Behutsamkeits-Regeln versehen und ihm die Ausführung dieser Sache überlaßen. Ob es nun gleich deßen Werk nicht eigentlich ist, so hat er sich dennoch aus eigenem Triebe und Lust hiezu entschlossen und sich vorgesezet, diese Vergleichung verschiedener Thermometer,

welche

welche bishero am bekanntesten und üblichsten gewesen, auf einer Kupfer-platte anzubringen und sie diesen Instrumenten beyzufügen. Er hat auch bereits so viel als seine wichtigere Arbeiten ihm zugelaßen, einen glücklichen Anfang damit gemacht, und es werden also Liebhaber dieser Instrumente, sowohl in Ansehung der Prob-Thermometer mit großen Graden, als derer die nur eine geringere Anzahl der Grade haben und auch solcher, die bis zu dem siedenden Waßer reichen und gerichtet worden sind, von ihm sattsam vergnüget werden können. Ich habe in Ansehung der Uebersezung selbst nichts weiters beyzufügen. Ich hoffe, Kenner werden das Urtheil fällen, daß sie mit Fleiß und Aufmerksamkeit gemachet worden. Nur in Ansehung der Anmerkungen ist dieses noch zu bemerken,

merken, daß diejenige, welche mit einem (*) oder (†) bezeichnet sind, von dem Herrn Verfaßer selbst; diejenige aber, welche mit Zahlen bemerket worden, von dem Uebersezer herrühren. Der Leser lebe wohl, und bediene sich dieser Schrift zu seinem Vergnügen.

Neuer

Vorbericht.

Es würde kaum nöthig seyn, hier eine neue Vorrede dieser neuen Auflage beyzufügen, woferne ich nicht genöthiget wäre, von derjenigen Vermehrung einige Anzeige zu machen, welche dabey vorgenommen und hinzu gethan worden. Es kan keinem fleißigen Naturforscher oder Meßkünstler unbekannt geblieben seyn, von was für einer unumgänglichen Nothwendigkeit, nach denen neuesten Entdekungen, die Thermometer sowohl als die Barometer, bey al-

len

zen Arten der Operationen seyen, so daß ohne Beyhülfe der erstern nicht einmal eine richtige Linie auf dem Felde aufgenommen und gemeßen werden kan, die leztere aber schon lange von einem so vielfachen Nuzen und so unentbehrlich sind erkannt worden, daß es nicht einmal nöthig ist, dessen nur mit einem Worte zu gedenken. Je ausgebreiteter aber und allgemeiner der Gebrauch derselben zu werden angefangen, desto ernstlicher haben sich auch die gröseste und geschikteste Männer bearbeitet, etwas zu der Verbeßerung und mehrern Richtigkeit dieser beyden Instrumente beyzutragen und sie theils nach und nach zu einer solchen Vollkommenheit zu bringen, die nur immer möglich ist; theils aber zu dem rechten Gebrauch derselben sichere Regeln und Anweisungen zu geben. Dieses hat schon der berühmte Herr Verfaßer dieser Bogen gethan, indem er nicht nur ein Universal-Thermometer zu verfertigen gelehret, sondern auch noch zulezt in einer Tabelle gezeiget hat, wie

man

man das Barometer durch ein Thermometer verbeßern müße. Da mir nun in der neuesten Connoissance du Tems auf das Jahr 1765 eine Abhandlung zu Gesichte gekommen, welche von den Barometern vorzügliche Verbeßerungen und Gedanken enthält, so habe ich mich entschloßen, zumal da dieses Buch nicht in jedermanns Händen ist, und diese Materie mit der gegenwärtigen allerdings viele Aehnlichkeit hat, ja gewißer massen beyde zusammen zu gehören scheinen, dieselbe zu übersezen und sie als eine kleine Vermehrung dieser Auflage am Ende beyzufügen: und ich hoffe und schmeichle mir, damit manchen Liebhabern einen Gefallen gethan zu haben. Von meinen eigenen hinzugesezten Anmerkungen habe ich nichts weiters zu melden, als daß sie hier, so wie bey der ersten Ausgabe mit Zahlen bemerket und theils verbeßert, theils aber auch vermehret worden. Die gütige Aufnahme und der gänzliche Abgang der vorigen Auflage sowohl als

das

das noch immer anhaltende Verlangen nach diesen Bogen, hat übrigens diese neue Auflage verursachet und machet eine schmeichelnde Hofnung, daß dieselbe, so wie die vorige, Liebhaber finden werde, welchen ich mich auch nebst meinen Bemühungen um diese Schrift empfehle, und alles daraus zu erwartende Vergnügen anwünsche.

Beschrei-

Beschreibung der Methode
ein
Universal-Thermometer
zu verfertigen.

Auf das neue durch den Verfasser selbst übersehen, verbessert und vermehrt.

Da ich im Jahr 1740 Lust bekommen hatte, einige Versuche mit den Thermometern anzustellen; so fande ich gar bald, daß verschiedene von diesen Versuchen sich mit den Grundsäzen nicht vereinigen ließen, welche einige Schriftsteller, die davon gehandelt, angenommen hatten. Dieses munterte mich auf an eine Verbesserung derselben zu gedenken, und, um desto sicherer hierinnen zu gehen, selbst ei-

ne gewisse Anzahl von Thermometern nach meinen Gedanken zu verfertigen und sie einigen bekannten Persohnen zu schenken. Da ich nun damit sehr glücklich gewesen bin und mich viele um eine Erläuterung in dieser Sache gebeten haben, so habe ich mich endlich entschlossen, diesen Aufsaz zu ihrem Unterricht zu verfertigen.

Die Vollkommenheit dieses Instruments besteht hauptsächlich in zwey Stüken. 1. Daß es allezeit auf das genaueste einerley Grade bemerket: so daß unter mehreren Thermometern, welche nach dieser Art verfertiget sind und an einerley Luft stehen, kein einiger von dem andern verschieden ist, wann der Saft in der Röhre zu seinem Punkt des Gleichgewichts mit der Luft, die ihn umgiebt, gekommen ist. 2. Daß die Vorschriften, welche man bey Verfertigung deßelben zu beobachten hat, leicht sind, und man ohne ein dergleichen Instrument selbst zu besizen, eines zu Rom machen kan, welches mit einem andern, das zu Paris verfertiget worden ist, auf das genaueste übereinstimmet (1).

Was

(1) Man siehet leicht ein, daß diese gedoppelte Eigenschaft eines solchen Thermometers für Liebhaber und sorgfältige Beobachter der Natur von der grösten Wichtigkeit seyn müße. Die Beobachtungen der Wärme und Kälte, welche man in verschiedenen Weltgegenden vorgenommen hat, sind bishero noch kei-

Was das erste von diesen beyden Stüken betrift, so siehet man leicht ein, daß der Saft des Thermometers höher oder niedriger stehet in der Röhre, je nachdem der innere Durchschnit dieser Röhre breiter ist oder nicht. Es muß dahero dieselbe immer einerley Durchschnitt behalten, so weit als der Saft gehen kan, wo dieses Instrument anders zu einer Vollkommenheit gebracht werden solle. Gesezt aber, daß dieses nicht wäre, so müste man mit der grösten Sorgfalt und genauesten Aufmersamkeit die Theilung der Grade nach dem Verhältnis vornehmen, nach welchem der Durchschnitt dieser Röhre größer oder kleiner wird. Aus diesem Grunde muß das Meßen der inwendigen Röhre das erste seyn, welches man bey der Verfertigung dieses Instuments zu verrichten hat.

Der Herr von Reaumur, welcher sich um diese Materie sowohl als um viele andere sehr verdient gemacht hat, ist der erste gewesen, welcher

keinesweges so brauchbar und nüzlich gewesen, als sie hätten seyn können, wenn theils die Instrumente selbst mehrere Richtigkeit aufweisen könnten, theils aber wenn die Vergleichung von mehreren Orten möglicher wäre und schärfer angestellet werden könnte. Bey gegenwärtigen Umständen wäre es bey nahe nöthig, daß man eben so vielerley Thermometer selbst bey der Hand hätte, als zu den Beobachtungen gedienet haben, und dennoch würde man, wie aus dem folgenden erhellen wird, noch beträchtlich genug irren und fehlen können.

cher diese Nothwendigkeit eingesehen hat. Dahero will er, daß man kleine Maße von einem oder mehrern Graden gebrauchen solle, welche man mit Merkur anfüllet, den man hierauf in das Instrument gießet und alsdann jeden neuen Zusaz auf dem Brete bemerket, auf welchem das Instrument angeheftet ist. Weil aber diese ganze Art zu meßen in den **Schriften der königlichen Academie der Wissenschaften** 1730 umständlich beschrieben ist, so will ich nur meine Gedanken darüber eröfnen.

Diese Art scheinet in so ferne gut genug zu seyn, wenn diese kleine Maße sehr richtig sind, wenn man sie allezeit mit gleich viel Mercur anfüllet und wenn endlich das Thermometer während dieser ganzen Beschäftigung sich nicht verändert (2) Weil es aber damit sehr langsam hergehet, die Sache auch sonsten vielen Schwierigkeiten unterworfen, und in Ansehung derjenigen Röhren, die einen sehr kleinen Durchschnitt haben, als welche fast allezeit denen

(2) Der Herr Verfasser fordert, daß das Thermometer während dieser ganzen Beschäftigung sich nicht verändern solle. Diejenige, welche sich nicht sogleich der Ursache erinnern sollten, haben nichts weiter nöthig, als nur daran zu gedenken, daß das Quecksilber sich durch die Hize ausdehne und durch die Kälte einziehe, so wie eben dieses auch mit dem Weingeist geschiehet, daher auch von beyden die Thermomet-

denen weiten vorzuziehen sind, nicht einmal möglich ist: so habe ich ein anderes Mittel gefunden, welches leichter ist und wobey ich mich niemals geirret habe. Es bestehet in folgenden:

Ehe man das Thermometer zusammensezt, ist es nöthig, daß man in die Röhre, deren man sich zu diesem Ende bedienen will, eine Mercur-Säule von 3 oder 4 Zoll in der Länge, auch wohl mehr oder weniger, wie man will, bringe. Diese Röhre legt man horizontal auf einen Tisch, worauf man mit einem Zirkel den Raum, welchen diese Mercur-Säule einnimmt, abmißet, oder auf der Röhre bezeichnet. Nach diesem neiget man die Röhre ein wenig und läst diese Säule einen zweyten Raum durchlaufen, welcher da anfängt, wo sich der vorhergehende geendiget hat. Diesen neuen Raum mißt oder zeichnet man wie den vorhergehenden und sezt diese Arbeit fort, bis man damit von einem Ende der Röhre zu dem andern gekommen ist. Hierauf theilet

meter gemacht werden können. Wollte man also nicht auf einen gleichen Stand des Thermometers sein Augenmerk richten, oder gar die gänzliche Vollendung dieser Arbeit bis auf einen andern Tag oder auf eine andere Stunde verschieben, so wird die entweder größere oder geringere Wärme schon eine beträchtliche Verschiedenheit herfürbringen und die Richtigkeit der Instrumente selbst dadurch hindern können.

man sie entweder in Theile, worüber man ein Verzeichnis hält, oder in gewiße Weiten (espaces,) welche gleich viel halten. Zu der Röhre des Thermometers gebrauchet man alsdann denjenigen Theil der Röhre, welcher gleiche oder wenigstens beynahe gleiche Weiten in der Länge enthält, welchen man nachgehends bey der Austheilung des Thermometers einerley Anzahl der Grade gibt, das übrige dieser Röhre aber zu einem andern Gebrauch bewahret. Ich habe vor einiger Zeit vernommen, daß der Herr de l'Isle in Petersburg auf eben diese Art verfallen sey.

Wann man nun also erforschet oder bezeichnet hat, was die innere Röhre faße, so kan man das Thermometer zusammensezen, und mit dem Saft bis zu dem behörigen Punkt füllen. Ich gehe daher zu der Beschreibung der Art und Weise, welcher ich zu folgen für gut befunden habe, theils um dieses Instrument genau zu richten, theils aber um es gehörig in Grade abzutheilen. Zu diesem Endzweck muste ich einige Grade einer zunehmenden Wärme oder Kälte wißen, von welchen die äuserste bestimmte Punkte wären, die man mit leichter Mühe und aller Orten ohne Fehler bestimmen könnte, damit ich zwischen diesen beyden Punkten die Eintheilung in Grade vornehmen möchte.

Der Herr von Reaumur hat sich hierzu des Punkts des siedenden und des gefrornen Waßers bedienet.

Den

Den ersten bestimmten Punkt anlangend, so ist derselbe zwar bestimmt und richtig genug, man kan ihn auch gar leicht aller Orten erhalten: da aber diejenige, welche den Grundsäzen des berühmten Herrn von Reaumurs gefolgt sind, aus ihren Thermometern bey dem Zublasen, einen beträchtlichen Theil der Luft heraus gezogen, ferner, nicht den ganzen Saft dieser Instrumente, wenn sie dieselbe gerichtet haben, in das siedende Waßer gesteket, und endlich auch, wenn sie ihr Waßer haben sieden laßen, sich nicht auf einerley Stand des Barometers eingeschränket haben (3), so muste

(3) Es ist allerdings möglich, daß ein solches Verhalten einen sehr beträchtlichen Irrthum von vielen Graden in Ansehung des Punktes des siedenden Waßers verursachen könne. Dann was erstlich die allzuviele Beraubung der Luft betrift, welche, wo man in dem Zuschmelzen der Röhre nicht sehr geschwind und vorsichtig ist, gar leicht geschehen kan! so wird dadurch in der obern Röhre die noch übrig gelaßene Luft, da sie sich in den ganzen Raum vertheilen muß, sehr verdünnet. Sobald dieses geschiehet, wird die mit dem Weingeist vereinigte und in demselben eingeschloßene Luft so lange hervordringen, bis das Gleichgewicht hergestellet ist, nicht anders als wie solches zu geschehen pflegt, wenn unter der Gloke einer Luftpumpe, nachdem die über dem mit Waßer angefüllten Gefäse befindliche hinweg genommen worden, die in dem Waßer eingeschloßene und damit genau vereinigte Luft hervorsteiget und das Gleichgewicht wieder herzustellen bemühet ist. Es kan da-

dieses nothwendig viele Irrthümer in Ansehung dieses bestimmten Punktes verursachen. Was ist es also Wunder, wenn bey den meisten dieser Thermometer ein Irrthum von 25, 30, ja wohl bis 35 Graden in diesem Punkte angetroffen wird, und daß selbst das große Thermometer des Observatorii beynahe um 30 fehlet.

Den andern bestimmten Punkt, nemlich des gefrierenden Waßers, hat Herr von Reaumur auf

---

her auch die Ausdehnung des Weingeistes in solchem Fall niemals mehr so stark seyn, nachdem er eines guten Theils seiner eingeschloßenen Luft hiedurch beraubet worden. Folglich muß er nicht nur tiefer in dem siedenden Waßer stehen, als es seyn solle, sondern es muß unter diesen Instrumenten selbst eine unrichtige Verschiedenheit bemerket werden, je nachdem aus dem einen oder dem andern mehrere oder wenigere Luft bey dem Zuschmelzen herausgezogen worden ist. Was das andere Verhalten betrift, da man nemlich nicht allen Saft in das Waßer tauchet, so wird unten von dem Herrn Verfaßer selbst gezeiget werden, daß es nothwendig Fehler und Unrichtigkeiten verursachen müße. Der gleiche Stand des Barometers ist nicht weniger unentbehrlich, wenn anders eine Uebereinstimmung dieser Instrumente erhalten werden solle. Ist die Luft schwerer, so wird sie auch mehr auf den Weingeist in der offenen Röhre des Thermometers drüken und denselben etwas tiefer halten, ist sie leichter, so wird der stärkere Druk aufhören und der Weingeist höher steigen müßen. Es wird also unmöglich eine völlige Sicherheit und Gleichheit der Thermometer erhalten werden können, wo sie nicht unter einerley Höhe des Mercurs auf diesen Punkt gerichtet werden.

auf zweyerley Weise bestimmet. Die erste Art wird mit einem Gefäße mit Waßer vorgenommen, welches man gefrieren macht, indem man Eis und Salz um daßelbe leget, nachdeme man zuerst die Kugel des Thermometers, welchen man richten will, in dieses Waßer gesezet. Die andere Art aber ist, wenn man Eis, welches schmelzen will, sehr klein zerstoßet, und damit die Kugel des Thermometers umgibet.

Die erstere von diesen beyden Arten scheinet mir sehr vielen Fehlern unterworfen zu seyn, weil das Eis, welches sich rings herum anlegt und endlich bis an die Kugel des Thermometers ziehet, ihm auch alsdann erst seinen Grad der Kälte mittheilet, mehr oder weniger kalt seyn kan, je nachdem mehr oder weniger Salz von außen um das Gefäß geleget worden.

Die andere Art ist unstreitig viel sicherer, doch läßt sich dadurch kein recht gewißer Punkt an dem Thermometer bestimmen. Dann ich habe im Jahr 1742 und 1743 zu Paris erfahren, daß das Eis, wenn es gleich schmelzen wollte, doch in dem Grad der Kälte verschieden ware.

Ich habe übrigens verschiedene andere Punkte der Gefrierung untersucht, nnd besonders denjenigen, welchen man mit Eis und gemeinem Meer-Salze, welche miteinander zerstoßen werden, bewürket. Weil ich versichert bin, daß in diesem Fall sowohl das Eis als das

Waßer nur eine gewiße Menge Salz in sich schluken; so glaube ich, daß man auf diese Art einen Grad der Kälte finden könnte, welcher bestimmt und allgemein genug ist. Ich halte dafür, daß ich ihn selbst gefunden habe, und er findet sich auch auf meinen Thermometern bey 29¼ Grad angemerket. Allein, da in diesem Lande diese Art der Gefrierung durch die äußerliche Luft allezeit gehindert wird, und es folglich in noch wärmeren Gegenden noch weit mehr Schwierigkeiten machen würde, wenn man diesen bestimmten Punkt erhalten wollte; so will ich nicht einmal dazu rathen.

Es ist auf dem Observatorio ein Keller 84 Schuh tief, welcher aus lauter alten Gängen bestehet. In einem Gange unter andern, welcher sich gegen die Abtey von Port Roial hinziehet, ist ein Loch in der Mauer mit einer steinernen Tafel zu finden, worinnen Herr de la Hire das alte Thermometer des Observatorii beobachtet, und worinnen eine große Anzahl der meinigen von mir selbst sind beobachtet worden.

Die Eigenschaft dieses Loches in der Mauer ist folgende: Daß sich die Mittelmäsigkeit der Luft (temperature) niemals im geringsten verändert, es mag auch seyn wann es will. Ich habe dieses mit einerley Thermometern, sowohl in dem Sommer als im Winter oft wahr befunden. Hieraus schloße ich: 1. daß diese Mittelmäsigkeit der Luft nicht von der äuserlichen Luft herkommen könne, weil man sonsten eini-

einigen Unterschied bemerken würde: sondern daß sie lediglich eine Wirkung seyn müß: von einem gewißen Grad der Wärme, welche die Erde beständig in dieser Tiefe besizet. 2. Daß dieser Grad der Wärme, welcher in dieser Tiefe sich so beständig findet, in den Erzgruben, welche tiefer sind, noch beträchtlicher ist, in denen Brunnen zu Paris, welche nicht so tief sind, zwar nicht so beträchtlich, doch gleichmäßig bestimmt bleibet, ein gewißes Central-Feuer in der Erde vorauszusezen scheinet, welches, indem es seine Wärme denen äusersten Enden mittheilet, bey den Polen und unter der Linie einerley Grad der Mittelmäsigkeit der Luft würken muß, wo nicht bey einerley Entfernung von diesem Central-Feuer, doch zum wenigsten bey gewißen Tiefen der Erde, welche man durch verschiedene Versuche bestimmen muß. Geschiehet dieses aber ordentlicher Weise, so folget daraus, daß die Mittelmäsigkeit der Luft in dem Keller des Observatorii ein allgemein bestimmter Punkt sey (4).

Wollte

---

(4) Es haben viele von den Naturforschern in dem innern der Erde ein solches beständiges Feuer angenommen. Boyle in seinem Tractat de temperie subterraneanum regionum gibt merkwürdige Erfahrungen an, welche solches beynahe ohne Zweifel darzuthun scheinen. Der Herr von Mairan führet zu einer Bestätigung dieser Meynung unter andern auch theils die Empfindung der Wärme in tiefen Gruben, theils die Flüßigkeit des Waßers an, welche sich beständig

auf

Wollte man sagen, daß die gemeldete Versuche sehr unsicher und ungewiß seyn, weil den Erzgruben ein Grad der Wärme mitgetheilet wer-

---

auf dem Grunde des Meeres antreffen läßet. Dann was das erstere betrift, so behauptet er in dem ersten Theil seiner Abhandlung von dem Eis, bey dem Keller des Observatorii in Paris eben diese Eigenschaft welche unser Herr Verfasser angenommen hat, daß man nemlich in demselben an dem Thermometer das ganze Jahr hindurch weder ein merkliches Steigen noch Fallen wahrnehmen könne. Die Meynung deßelben muß also durch dieses widerholte Zeugnis eine neue Befestigung erhalten, da er sich besonders nicht auf den Keller überhaupt, sondern nur auf einen gewißen und bestimmten Plaz deßelben, nemlich auf das Loch in der Mauer eingeschränket hat. Man kan diese Wärme, nach dem Zeugnis des Herrn von Mairans, auch in den Bergwerken bis zu einer Tiefe von 400 bis 600 Fuß noch immer einerley finden, ob sie gleich nachhero immer mit der Tiefe zunehme, so daß denen Bergleuten einige Abkühlung auf diese oder auf jene Weise verschaffet werden müße. Was das andere Stück, nemlich die niemals gestörte Flüßigkeit des Waßers auf dem Grunde des Meeres, betrift; so behauptet er, daß man die Sonne keineswegs als die Ursache davon ansehen müße, weil diese ihre Kraft niemals weiter als 12 Fuß tief in die Erde bringen könne. Wenn man also gleich wegen der größeren Lokerheit des Waßers zum Ueberfluß zugeben wolte, daß sie 240 Fuß tief in das Waßer wirken könne, so müste in einer größeren Tiefe nichts als Eis angetroffen werden. Da man nun in einer Tiefe von zwey, drey und vierhundert Faden das Gegentheil

werde, der von der Arbeit, die darinnen vorgenommen wird, entstehe, und weil in den Brunnen zu Paris viele Salze sich befinden, welche

---

gentheil davon finde, so könne man leicht ein dergleichen unterirdisches Feuer annehmen. Dieser leztere Grund des Herrn von Mairan aber beweiset nichts, denn er beruhet auf dem von vielen Naturlehrern, wie mich dünket, ohne Ursache angenommenen Saze, daß das Waßer alleine durch das Feuer und die Feuertheilgen, die sich in die Zwischenräume deßelben eindringen, flüßig gemacht und flüßig erhalten werde. Siehet man die Beschaffenheit der Theile an, aus welchen das Waßer bestehet, so sind sie ihrer Natur, ihrer Einrichtung und Gestalt nach schon vermögend, da sie eine sphärische Figur haben und hart sind, übereinander hinwegzurollen, folglich die Flüßigkeit des Waßers hervorzubringen, so lange nicht entweder durch irgend eine Ursache eine Veränderung in ihrer Figur vorgehet und sie andere Flächen bekommen, die geschikter sind als die Kugelflächen, sich zusammenzuhängen und also die Flüßigkeit zu verhindern, oder so lange nicht durch Beymischung eines andern fremden Cörpers, welcher in die Zwischenräumgen der Waßertheilgen eintritt und sie also unter einander mehr verbindet, ihre sonst so nothwendige Eigenschaft des Fließens oder übereinander Hinrollens aufgehoben wird. Es ist also gewis ein Dienst, den das Feuer nicht Ursach hat zu verrichten, und welchen sich das Waßer selbst durch die Einrichtung und Gestalt seiner Theilgen leisten kan. Es kann also auch auf dem Grund des Meeres das Waßer immer flüßig bleiben, wenn gleich die Sonne durch ihre Wärme nicht so tief würken kan

welche in den Häusern erzeuget werden, und genugsam im Stande sind, den natürlichen Grad ihrer Wärme zu verändern. Ja wollte man sodann die Vermuthung von einem Central-Feuer gänzlich verwerfen, so müste man doch diese Meynung gelten laßen, nach welcher man die Erde als eine Kugel betrachtet, welche sich um ein gleiches Feuer seit ihrer Schöpfung herumdrehet. Ist diese Zeit nicht genug, daß diese Kugel schon lange bis in ihrem Mittelpunkt alle die Wärme, welche das Sonnen-Feuer in derjenigen Entfernung, worinnen sie sich befindet, derselben mittheilen sollte, hat empfangen können? Ob also gleich der Grad der Wärme alle Tage auf der Oberfläche dieser Kugel sich verändert und nothwendig verändern muß, (weil nicht ein jeder Theil von dieser Oberfläche alle Tage eine gleiche Anzahl Feuerstrahlen bekommt, und noch verschiedene andere Ursachen dieses Feuer hindern oder zerstöhren können,) so ist nichts destoweniger dieser Grad der allgemeinen Wärme der Erde, seit dem Augenblick, in welchem er zu dem Gleichgewicht zwischen der Macht, welche ihn hindert oder zerstöhret, gekommen ist, bestimmet

---

kan und wenn auch gleich kein solches unterirdisches Feuer angenommen wird. Man kan hiebey nachsehen, was ich in meinem, in dem vergangenen Jahre herausgegebenen Versuch einer neuen und deutlichen Erklärung der Kälte und ihrer Wirkungen §. 28 seqq. hievon schon angemerket habe.

met worden, und hat niemals mehr von innen sich verändern können. Die Ursach ist begreiflich genug. 1. Weil die Veränderung, welche sich zu einer Zeit auf der Erde zuträgt, zu einer andern Zeit wieder aufgehoben wird, und also nicht Zeit genug hat, auf das innere der Erde bis zu einer beträchlichen Tiefe zu würken. 2. Weil die Erdkugel, überhaupt betrachtet, alle Tage auf der einen Hälfte eben so viel Feuerstrahlen empfängt, als sie auf der andern Hälfte verlieret. Es muß also vermittelst dieser Abwechselungen eine gegenseitige Ersezung geschehen, welche jeden Tag in dem innersten der Erde einerley Grad der Wärme erhält. Ist aber dieser Grad der allgemeinen Wärme der Erde nichts anders, als die Mittelmäßigkeit der Luft, wovon hier die Rede ist, so ist nach dieser Meynung offenbar, daß diese Mittelmäßigkeit ein allgemein bestimmter Punkt sey.

Wollte man weder die eine noch die andere, noch auch eine aus diesen beyden zusammengesezte Meynung annehmen, so würde man nicht erklären können, wie es möglich sey jenseits des Polar-Cirkels Quellen zu finden, welche auch in dem strengsten Winter nicht gefrieren? Dann die Wärme, welche man das Jahr hindurch daselbst empfindet, ist weit geringer, als die große Kälte, welche sich einstellet. Es müste also der Frost, wenn er in dem Winter viele Schuhe tief in die Erde gedrungen und in dem Sommer nicht völlig wiederum wäre zerstöhret worden, alle Jahre weiter gekommen und

seit

seit der Schöpfung der Welt sehr tief in die Erde gedrungen seyn. Dennoch aber findet man zu Pello eine Quelle, welche niemals gefrieret, so wie man in dem Buch von der Figur der Erde sehen kan. Man muß also einen Grad der Wårme in der Erden annehmen, wo diese Quelle durchgehet, welcher im Stande ist, der obern Kålte zu widerstehen. Gesezt, daß dieser Grad nicht einerley seyn sollte mit dem Grade des Kellers des Observatorii bey einerley Tiefe, so muß er doch demselben sehr nahe kommen.

Dieser Punkt der Mittelmåßigkeit ist übrigens zu Paris viel bequemer und richtiger zu bestimmen als ein jeder anderer Punkt. Es ist zwar wahr, daß man nicht eher schließen kan, daß er allgemein sey, bis man durch eine gewiße Anzahl von Versuchen bewiesen, daß man ihn auf dem ganzen Erdboden in gewisser Tiefe genau und richtig finden kan; dennoch ist es aber auch sehr wahrscheinlich, daß, einige besondere Fålle ausgenommen, welche durch Neben-Umstånde verursacht werden, die Einförmigkeit in Ansehung dieses Punkts beståndig statt finden werde.

Nach einer Beobachtung, welche den 17. Jul. 1741 mit zwey von meinen Thermometern ist gemacht worden, und zwar in einer Erzgrube bey Ardingheim zwischen Calais und Boulogne, welche 447 königliche Schuhe tief ware, hat man befunden, daß die Beschaffenheit der Luft sehr genau einerley ware mit derjeni-

jenigen, welche, wie wir oben gemeldet, in dem Keller des Observatorii angetroffen wird. Diese Erfahrung, welche sorgfältig und richtig genug ist gemacht worden, scheinet die Meynung von dem Central-Feuer umzustoßen und die andere zu bestätigen (5).

Eine andere Beobachtung ist es, welche man zu Salelle bey Carcaßona im Jahr 1741 gegemacht und 1742 zu verschiedenen mahlen widerholet hat, in einer Höle, über welcher eine Deke von mehr als 60 Klaftern (toises) Marmor oder Erde sich findet. Man ist in derselben fünfhundert Schritte weit fortgegangen, und hat diesen Versuch an verschiedenen Plätzen dieser Höle von neuem angestellet, allezeit aber einerley Grad der Wärme wie bey dem vorhergehenden Versuche gefunden.

Wie wahrscheinlich wird es also, daß dieser bestimmte Punkt der Mittelmäßigkeit der Luft kein besonders Eigenthum des Kellers des Observatorii sey, sondern vielmehr ein allgemein be-

(5) Könnte man diese gleiche Wärme, wie Herr von Mairan behauptet, vier bis sechshundert Fuß in den Bergwerken antreffen, so würde der Versuch in dieser Erzgrube, welche nur 447 Fuß tief wäre, die Meynung von dem Central-Feuer noch nicht umstossen. Es mag aber im übrigen die Wahrheit auf dieser oder jener Seite seyn, so ist es zu gegenwärtiger Absicht genug, daß unter unserer Erde bis auf eine gewiße Tiefe immer einerley Wärme und eine gleiche Temperatur angetroffen werde.

bestimmter Punkt, ein Grad, der aus Vermischung der Wärme und Kälte bestehet, welchen die Erde seit ihrer Schöpfung durchaus an sich genommen hat, und den man das mittelmäßige nennet. Dieser Grad muß sich also in dem inneren des Erdbodens allezeit finden lassen, so bald man darinnen bis zu einer gewißen Tiefe hinabgekommen ist, diejenige Fälle alleine ausgenommen, wo Neben-Umstände einige Verschiedenheit verursachen.

Dem sey aber wie ihm wolle, weil dieser Punkt der Mittelmäßigkeit der Luft, sowohl im Sommer als im Winter zu Paris in dem obengemeldetem Loch in der Mauer bestimmet ist; so kostet es wenig Mühe, von daher ein Thermomether mit großer Abtheilung zu bekommen, auf welchem derselbe genau bezeichnet werden muß (*), um hiedurch sein richtiges Verhält-

(*) Um die Beobachtungen der Mittelmäßigkeit der Luft in unterirdischen Hölen, tiefen Brunnen, oder auf dem Grund des Meeres selbst genau anzustellen, muß man Thermometer mit großer Abtheilung haben, welche in Futerale eingemacht sind, die auf beyden Seiten aufgehen, wovon die oberste Bedekung einige Grade über und unter dem Punkt des mittelmäßigen in Gestalt eines Fensters, welches man vermittelst einer Fuge öfnen kan, ausgeschnitten seyn muß. Unter diesem Fenster muß ein Glas angebracht werden, durch welches man den Saft sehen könne, ohne etwas anders als dieses Fenster zu eröfnen. Will man in unterirdischen Hölen den Versuch anstellen, so muß man den untern Theil des Futerals

hältnis mit eben diesem Punkte in tiefen Brunnen und Hölen zu bestimmen, welche in ver-

---

terals, besonders aber die Bedekung der Kugel dike umwikeln, damit das Thermometer lange Zeit brauche seinen Punkt des Gleichgewichtes zu erlangen oder wieder zu verliehren, und man also Zeit genug haben möge zu beobachten, aufzuschreiben, und die Beobachtungen zu wiederholen, ehe der Stand des Saftes sich wieder verändere. Dann sonsten wirket die Wärme des menschlichen Cörpers, oder des Lichtes, welches man dabey haben muß, an diesen Orten, die ohnehin gemeiniglich niedrig sind, auf den Saft der Thermometer, welches ich in den Kellern des Observatorii oft bemerket habe.

Will man nicht selbst in eine solche Höle hinabsteigen, oder ist Gelegenheit vorhanden, das Instrument an einer Schnur hinab zu laßen, so muß man außer den bereits gemeldeten Regeln der Vorsichtigkeit, ein Gewicht unten an das Instrument zu hängen nicht vergeßen, damit es gerade stehen bleibe, und es zum wenigsten 24 Stunden lang also hängen laßen. Hierauf kan man, um es wieder herauf zu ziehen, diejenige Zeit des Tages erwarten, welcher die Luft an dem Orte der Beobachtung, der Luft in der Höle am nächsten kommt, und den Umschlag, welcher das Glas bedeket, abwikeln. Auf solche Weise wird man noch übrige Zeit haben, genau zu beobachten, aufzuschreiben, und die Beobachtungen zu wiederholen.

Ich hatte in dem Sommer im Jahr 1741 in diesem Loch in der Mauer des Kellers des Observatorii ein Thermometer mit der großen Abtheilung 24 Stunden gelaßen. Dieses Thermometer ware in

schiedenen Ländern sich finden, und welche, weil sie niemals in ihrem Grad der Mittelmäßigkeit sich

---

einem Futeral von Eichenholz eingemacht, welches über der Oberfläche der Kugel einen Zoll dik ware. Das Fenster, welches dabey angebracht worden, ware eben so dik an Holz und öfnete sich vermittelst einer Fuge bey dem Grad des mittelmäßigen. Dieses Instrument, wenn es in der Luft in einem gemeinen Keller aufgehänget wurde, brauchte neun bis zehen Stunden Zeit, bis es zu seinem Gleichgewicht kame. Ich nahme es aus dem Keller des Observatorii, indem ich daßelbe in der Hand hielte an seinen Ringen, und truge es durch verschiedene Kammern des Observatorii dahin, wo wir unsre Beobachtungen anstellten, und obgleich mein Thermometer zehen Grad der Wärme hatte, dennoch 8 bis 9 Minuten Zeit hatten, ehe der Saft die geringste Veränderung zeigte.

Was die Beobachtung der Mittelmäßigkeit in tiefen Brunnen betrift, so kan man dieselbe anstellen, wenn man das Instrument an einer Schnur hinunter läßt und es zu gehöriger Zeit wieder heraufziehet. Allein die bequemste Art ist wohl unstreitig diese, wenn man aus dem Brunnen, bey derjenigen Tageszeit, welche sich am wenigsten von dieser Mittelmäßigkeit entfernet, ein sehr großes Gefäße mit Waßer herausziehen läßt. So bald dieses Gefäß herauf kommt, taucht man das Thermometer hinein, womit man den Versuch anstellen will. Es muß aber ganz blos seyn und eine kleine Kugel haben; desgleichen müßen auch die Seidenfaden an demselben, bey dem Punkte des mittelmäßigen, und einige Grade darüber oder darunter, sich finden. Hat das Instrument nun in diesem Waßer seinen Punkt des

sich verändern, zu eben diesem Ende könnn gebraucht werden, wenn man nur ihre Verschiedenheit genau bemerket.

---

des Gleichgewichtes erlanget, so ziehet man daßelbe heraus, hält es aber in eben dergleichen Waßer, bis man ein anders Gefäße voll Waßer aus dem Brunnen herausgezogen hat, in welches man das Thermometer abermals tauchet, und also die vorhergehende Beobachtung bestätigen kan.

Damit man aber desto mehr versichert seyn möge von der Mittelmäßigkeit der Brunnen, wovon hier die Rede ist, so kann man zum wenigsten ein Jahr lang diesen Versuch alle Monate widerholen, und wofern, wie man Ursache hat zu glauben, einige kleine Veränderungen sich finden sollten, das Mittel hievon nehmen. Denn seit der andern Auflage dieser meiner Beschreibung, welche in den Schweizer Mercur im Januarius 1747 eingeruket worden, hat man in einem Brunnen bey Genf, welcher ungefähr 130 königliche Schuhe tief ware, bemerket, daß die Säule der obern Luft einige Veränderung in Ansehung der Mittelmäßigkeit des Waßers, welches selbst von dem Grunde des Brunnens heraufgeholet worden, verursachet habe.

Will man endlich den Grad der Mittelmäßigkeit in der Tiefe des Meeres untersuchen, so muß man das Futeral des Thermometers mit einem Ueberzug von Eisen oder Bley versehen, welcher aus zwey diken Stüken bestehet, die vermittelst einer Fuge, welche unten angebracht ist, geöfnet, oben aber mit Haken zugeschloßen werden. Zu oberst müßen zwey Ringe, und da, wo der Ausschnitt des Futterals ist, ein Fenster angebracht werden, damit man

Man wird übrigens durch ein dergleichen Mittel viel mehrere Richtigkeit und Bequemlichkeit finden, um die Thermometer richten zu

---

den Saft des Thermometers sehen könne, ohne nöthig zu haben, die zwey große Stüke dieses Futerals aufzumachen. Sodann verstreicht man alle Fugen deßelben wohl mit Unschlit, und läßt es an einer Schnur in das Meer so tief als es nöthig ist, worinnen es auch so lange gehalten wird, bis das Thermometer seinen Punkt des Gleichgewichts erreichen kan.

Um aber von der Dike des Metalls, welche zu diesem Futeral erfordert wird und nothwendig ist, da einstweile zum Versuch zwey königliche Zoll vorgeschlagen werden, urtheilen zu können; muß man untersuchen, um wie viele Grade der Wärme das obere Meerwaßer von dem unteren unterschieden seyn möchte, und wie viel man Zeit brauchte dieses Instrument wieder in das Schiff hinauf zu ziehen.

Man nehme also z. E. an, daß das obere Meerwaßer 16 Grad der Wärme nach meinem Thermometer habe, und das auf dem Grunde oder Boden 0 sey; so kan man also 8 Grad für die mittlere Wärme annehmen, welchen die Dike des Metalls zu widerstehen hat in dem Meer, während daß das Instrument herauf gezogen wird. Hat man also das Thermometer und seine ganze Einwiklung genau auf das mittelmäßige gebracht, so kan man hernach daßelbe in ein Gefäß voll Meerwaßer tauchen, welches 8 Grad der Wärme hat, die man auf das sorgfältigste unterhalten muß, so lange man mit dem Versuche beschäftiget ist, bis man siehet, daß der Saft des Thermometers anfange über das mittelmäßige hinauf

zu können, als mit dem Eis, weil man mit leichter Mühe, wenn man einmal ein Thermometer mit der großen Abtheilung hat, auf

---

hinauf zu steigen. Zählet man dieses nach den Minuten zusammen, so kan man auch hiedurch erfahren, wie viel man Zeit übrig hat, sowohl das Instrument aus der Tiefe des Meeres wieder herauf zu ziehen, als auch seine Beobachtungen auf dem Schiffe anzustellen, folglich auch, ob die zum Versuch vorgeschlagene Dike des Metalls von zwey Zoll dienlich sey.

Was endlich die Zeit anlangt, welche man dieses Instrument auf dem Grund des Meeres laßen muß, damit der Saft deßelben gewiß seinen Punkt des Gleichgewichts erreichen könne; so wollen wir setzen, daß man auf dem Schiffe in der Nacht 16 Grade der Wärme nach meinem Thermometer habe, worauf man das Instrument erwärmet, bis daß es vollkommen diese 16 Grad der Wärme erlanget hat, welches gar leicht mit warmen Waßer geschehen kan, das man eine Zeitlang in diesem Grade erhalten muß. Ist dieses geschehen, so taucht man dieses Instrument in temperirtes Meerwaßer, welches fließet oder welches man in der Mittelmäßigkeit zu erhalten suchet, und läßt es darinnen so lange eingetaucht, bis der Saft des Thermometers zu seinem Gleichgewicht, bey dem bestimmten Punkt des mittelmäßigen gekommen ist. Rechnet man nun die Zeit zusammen, welche dazwischen verfloßen ist, so hat man eben damit auch die Zeit gefunden, welche man dieses Instrument auf dem Grund des Meeres laßen muß, damit daßelbe seinen Punkt des Gleichgewichtes erreiche.

welchem dieser Grad der Mittelmäßigkeit genau angemerket ist, vermittelst deßelben, so richtig als nöthig ist, und so viele andere, als man will, bemerken kan. Dann will man dieses thun, so hat man nichts weiters nöthig, als nur sie in einerley Gefäße zu halten, welches mit Waßer angefüllet und hernach ohne große Mühe zu dieser Mittelmäßigkeit gebracht wird (6). Nur muß man dabey diese Vorsichtigkeit gebrauchen, daß man dieses Gefäße an einen Ort stelle, wo sich eine Luft findet, die sich von diesem Grad nicht allzuweit entfernet. Dann da sich in solchem Fall das Waßer in seiner Mittelmäßigkeit nicht verändert, so hat man gar bald das Vergnügen, die Thermometer in ihrem Gleichgewichte zu sehen und sie richtig und sicher zu zeichnen.

Gesetzt aber auch, daß die Luft an dem Orte, wo diese Arbeit vorgenommen wird, viel wärmer wäre, so wird doch diese Veränderung, woferne das Gefäße nur dike genug ist, und viel Waßer

(6) Es ist so schwer nicht, ein Waßer, welches vorhin schon von dem Punkte des mittelmäsigen nicht weit entfernet ist, zu der völligen Temperatur zu bringen. Eine wenige Bewegung, welche demselben vermittelst eines Stoks oder Ruthe beygebracht wird, kan es gar bald dahin bringen, daß man in demselben die Thermometer auf den Punkt des mittelmäßigen richten kan, besonders wann dieses in einem etwas tiefen Keller vorgenommen wird und geschehen kan.

Waßer in sich enthält, lange Zeit unmerklich bleiben. Man wird also in guter Ruhe und weit sicherer verschiedene Thermometer richten können, als mit zerstoßenem Eis, weil daßelbe, wenn man auch versichert wäre, daß es allezeit und an allen Orten einerley Grad der Kälte habe, sich doch niemals so gut als das Waßer an das Instrument legt, und man also auch nicht so genau darnach richten kan (7).

---

(7) Es ist bekant genug, daß das Gleichgewicht der Wärme in zweyen ungleich warmen Cörpern um so viel geschwinder hergestellet und befördert werde, in je mehreren Punkten sich beyde berühren können. Eine warme Kugel wird längere Zeit brauchen, einer andern Kugel, die sie berühret, ihre Wärme mitzutheilen, als zwey Cubus-Flächen hiezu vonnöthen haben. Es muß dahero auch ein Cörper, welcher sich stark an einen andern anhängt, demselben seinen Grad der Wärme und Kälte geschwinder und leichter mittheilen, weil er ihn in viel mehrern Punkten berühret, als ein anderer, der sich nicht so stark anziehen läßet. Nun ist ja aber das Waßer ein Cörper, welcher sich an alle Cörper beynahe gleich stark anhänget, so, daß man nur einen Stok in daßelbe tauchet, und wenn man ihn ganz naß und befeuchtet wieder herausziehet, sehen darf, daß sich daßelbe sehr stark angehänget und in sehr vielen Punkten berühret hat. Es wird daher daßelbe auch am allergeschiktesten seyn, einem andern Cörper seinen Grad der Wärme leicht, bald und sicher mitzutheilen, folglich auch am allerbesten taugen, die Thermometer auf die Temperatur zu bringen, so bald das

Diese Mittelmäßigkeit des Kellers des Observatorii hat noch die Eigenschaft, daß sie ein richtiges Mittel zwischen der Kälte und der Wärme nach unserer sinnlichen Empfindung zu halten scheinet. Dann wir fangen an die Wärme zu empfinden, so bald der Saft des Thermometers sich über den Punkt des mittelmäßigen erhebt, und die Kälte zu spühren, so bald er unter diesen Punkt zu stehen kommt.

Hieraus glaube ich, können noch diese Folgen gezogen werden. 1. Daß, ob man gleich zugeben muß, daß die Grade der Wärme der Luft, welche wir über das mittelmäßige empfinden, eine Wirkung der Sonnenstrahlen sind, nichts destoweniger die Grade der Kälte, welche wir unter dem mittelmäßigen verspühren, keinesweges von den schief auffallenden Sonnenstralen oder von einem Mangel derselben entstehen. Dann wir haben oben gezeigt, daß die Erde an und vor sich selbst einen Grad der Wärme hat, welcher noch größer ist. Es kan aber dieses herkommen von unbegreiflich kleinen und reizenden Salz-Theilgen, welche von den Winden auf den Schnee- und Eisgebür-

---

Waßer dieselbe erhalten hat. Hingegen wird das Eis, wegen seiner geringern anziehenden Kraft, die Kugel des Thermometers nicht in so vielen Punkten berühren, folglich auch demselben, wenn auch sonst alles seine Richtigkeit hätte, nicht so leicht und geschwinde seinen Grad der Kälte mittheilen können.

gebirgen losgerißen und in verschiedene Gegenden getrieben werden (8.) 2. Daß man also auch diese zweyerley Grade, die eine Wirkung von zwey verschiedenen Ursachen zu seyn scheinen, und durch unsere sinnliche Empfindung selbst so deutlich unterschieden werden, bishero mit Unrecht auf allen Thermometern, mit welchen man Beobachtungen angestellet, vermenget habe. Man muß dahero bey den Graden, welche über das mittelmäßige hinaufgehen, anfan-

(8) Man siehet hier schon, was für einer Meynung von der Kälte der Herr Verfaßer zugethan und geneigt ist. Er schreibet dieselbe kleinen Salz-Theilgen zu, welche von den Winden auf den Schnee- und Eisgebirgen losgerißen und weiter gebracht werden. Man sezet sich bey dieser Meynung aber in eine große Verlegenheit, wenn man auf den Vorwurf antworten solle, daß man das Salz in dem Schnee und Eis schmeken müßte. Denn da gewiß keine kleine und geringe Anzahl solcher Salz-Theilgen erfordert würden, um die Erscheinungen des Winters, nemlich Kälte, Eis und Schnee herfürzubringen, sondern vielmehr eine ungeheure Menge; so würde sich der Geschmak der Salze unmöglich darinnen so verbergen können, daß man denselben nicht gewahr werden sollte. Ja es müßte sich dieses nothwendig in chymischen Proceßen zeigen und durch dieselbe das Salz wieder sichtbar gemacht werden können. Man mag also noch so subtile Salz-Theilgen bey der Erklärung der Kälte annehmen als man will, so wird man dennoch niemals allen Vorwürfen und Zweifeln entgehen können.

anfangen, die Grade der Wärme zu zählen, was aber unter demselben sich befindet, für die Grade der Kälte halten, damit man sich deutlich erklären könne nach denen Begriffen und der Empfindung selbst, welche ein jeder von der Vermehrung oder Verminderung des einen oder des andern hat. Man kan also hernach z. E. sagen: Wir haben heute so viel Grade der Wärme, oder wir haben so viel Grade der Kälte.

Da ich mich also auf die Mittelmäßigkeit des Loches in der Mauer des Kellers des Observatorii als auf einen sicheren Grund verlaße, und von da, als von einem sicheren und tüchtigen Punkt die Grade zu zählen anfange; so kommt es jezo hauptsächlich darauf an, daß man noch einen andern entfernten, unveränderlichen und allgemeinen Punkt bestimme, damit man einem jeden Grad sein gewißes Maß verschaffe. Ich habe zu diesem Ende den Punkt des siedenden Waßers unter solchen Bedingungen, als ich hernach anzeigen will, angenommen, und den Raum, welcher sich zwischen dem einen und dem andern Punkte findet, in hundert Grade getheilet. Diese Anzahl hat mir um so viel tauglicher geschienen, weil sie eine leichte Theilung verschaffet und die Grade noch von einer mäßigen Größe macht, welche denen Graden der Thermometer, die nach den Lehrsätzen des Herrn von Reaumur verfertiget, und woran viele Leute gewöhnet sind, beynahe gleich kommen.

Man

Man hat sich bishero eingebildet, daß die Thermometer von Weingeist den Grad der Hize des siedenden Waßers nicht genau anzeigen können: ich habe aber deren eine große Anzahl gemacht, welche das Gegentheil beweisen können. Ich muß zwar gestehen, daß sich zuweilen einige Luftblasen darinnen zeigen welche den Saft trennen. Allein man kan diesem Zufall bald abhelfen, wenn man eine Schnur beweglich um den Knopf anleget, welcher oben an dem Thermometer ist, und damit demselben in der Luft eine cirkelförmige Bewegung beybringt. Wird er hernach von neuem wieder in das Waßer getaucht, so steigt er bis zu seinem bestimmten Punkt und hält sich daselbst ohne einige Veränderung (*).

Man

(*) Da der Herr D. Desaguliers zu London ungefähr um die Zeit, da er den zweyten Theil seiner physicalischen Versuche druken ließe, von mir eines von meinen Thermometern mit Weingeist gefüllet, empfangen, das bis zu dem Grad des siedenden Wassers abgetheilet ware und denselben vollkommen gut aushielte, wobey noch ein Stük von dieser Beschreibung, die zu Paris 1741 gedrukt worden, gewesen, und er dennoch p. 328. in diesem Theil nach der französischen Uebersezung behauptet hat, daß die Thermometer von Weingeist nicht im Stande wären, den Grad der Hize des siedenden Wassers anzuzeigen; so hat mir dieses um so viel wunderbarer geschienen, besonders da er noch hernach p. 411 bezeuget, daß er dieses Thermometer

samt

Man muß aber vorläufig folgende zwey nothwendige Stüke wohl beobachten. 1. Wenn man das Thermometer oben zuschmelzt, daß man es schnell thue und ohne den Knopf allzusehr zu erwärmen. 2. Daß der Saft in dem Thermometer ungefähr bey dem mittelmäßigen, und das Barometer auf 29 Zoll 9 Linien stehen müße. Dann befindet sich dieses leztere niedriger oder höher, als allererst angezeiget worden, so muß auch der Saft des Thermometers niedriger oder höher stehen als das mittelmäßige, damit Luft genug in dem Instrument bleibe.

Die Art und Weise, das Waßer sieden zu laßen, betrefend, so muß man merken, 1. daß es sehr stark sieden müße. 2. Das man ein Gefäße von weißem Blech bereit halte, welches tief genug ist, daß der ganze Saft des Thermometers völlig in dem Waßer seyn, oder doch wenigstens durch die aufwallende Blasen angespühlet werden könne. Dann wann man nur einen Theil des Saftes hineintauchet, so nimmt der übrige theil an dem Grad der Wärme oder Kälte der äußerlichen Luft, und da diese nicht

---

samt der Beschreibung empfangen, und daß der Herr Präsident Volkes zu gleicher Zeit drey dergleichen von mir erhalten habe. Hatte nicht also Herr Desaguliers vier würkliche Proben in Händen, welche ihm den Ungrund seiner Meynung sattsam zeigen konnten?

nicht allezeit gleich ist, so muß nothwendig eine Verschiedenheit daraus entstehen.

Diese Verschiedenheit ist aber besonders bey den großen Thermometern, noch mehr aber bey denen, welche mit Weingeist gefüllet sind, beträchtlich. Dann weil die Ausbreitung dieses Saftes in Ansehung ihres Volumen viel größer und stärker ist, als bey dem Merkur, so darf man dasjenige, was sich von diesem Saft in der Röhre befindet, um so viel weniger ausser Acht laßen, da es gemeiniglich die allersubtileste Theilgen enthält, welche sich am allermeisten ausbreiten.

Man merke hiebey noch: daß es in dem Falle, wenn man ein Thermometer von einer andern Flüßigkeit mit einem Thermometer von Weingeist in den bestimmten Punkten des siedenden Waßers und des mittelmäßigen in eine Uebereinstimmung bringen will, damit man ihr Steigen und Fallen hernach miteinander vergleichen könne, ganz unumgänglich nöthig sey, das eine sowohl als das andere, so weit als ich gemeldet habe, in das Waßer zu tauchen, indem man sich sonsten beträchtlich irren würde. Da ich also auf dieser Seite alle mögliche Vorsicht gebrauchet, auf der andern Seite aber gesehen habe, daß der Grad der Schwere der Luft die Ausdünstung des Waßers mehr oder weniger erleichterte, und folglich auf die mehrere oder geringere Wärme, welche daßelbe im sieden erlangt, einen Einfluß hatte; so habe ich das Waßer sieden laßen,

wann

wann das Barometer, welches auf dem Feuer von der Luft gereiniget worden, und bey welchem der innere Durchschnitt der Röhre eine Linie ware, auf 27 Zoll und 9 Linien stunde. Es ist dieses ein solcher Stand des Barometers, welcher zu Paris sowohl als an den meisten andern Orten nicht selten ist. Ich habe mich auch sehr wohl dabey befunden und allezeit auf das genaueste einerley Grad der Wärme erhalten. Außer diesem habe ich auch bemerket, daß 7 Linien des Barometers mehr oder weniger meinem Thermometer auch einen Grad der Wärme mehr oder weniger verschaften, folglich, daß an denen Orten, wo das Barometer 26 Zoll stehet, das siedende Waßer auf meinem Thermometer 97 Grad der Wärme verursachen muß (9). Uebrigens aber ist es einerley, was man

(9) Daß die Barometer nicht aller Orten eine gleiche Höhe in ihrem Steigen erreichen, habe ich zwar Kennern derselben nicht nöthig zu sagen, dennoch aber um anderer willen, denen diese Bogen villeicht in die Hände gerathen möchten, auch nicht zu übergehen. Das Steigen der Barometer rühret von dem Druk der Atmosphäre oder des ganzen Dunstkreises her, in welchem wir selbst leben. Wird dieser nun mit vielen fremden Theilgen und Dünsten angefüllet, und gleichsam dichter durch dieselbe gemacht, so muß die Luft, die uns umgiebet, schwerer dadurch werden und also nothwendig auch stärker auf das Quekfilber bey dem untern Kolben des Barometers, welcher offen ist, drüken, und daßelbe in der Röhre in

man für Waßer sieden läßt, dann ich habe Regen- Brunnen- Fluß- ja eben das Waßer, welches ich den vorhergehenden Tag habe sieden

---

in die Höhe treiben. Fallen hingegen diese fremde Theilgen oder Dünste durch den Regen herab, oder werden dieselbe durch einen stärkeren Wind in unsrer Gegend beweget, so muß die Luft selbst ihre vorige Leichte wieder bekommen; daher sie auch nicht mehr so stark auf das Quecksilber des Barometers drüken kan, folglich daßelbe in der Röhre gezwungen wird, hinab zu weichen. Hieraus erhellet nicht weniger von selbst, daß an den höhern Orten die Luft weit dünner seyn müße als an den niedrigen. Dann man kan sich die Atmosphäre gleichsam als übereinander liegende Schichten der Luft vorstellen, wo immer eine auf die andere drüket. Die unterste Schichten sind also gewiß diejenige, welche am stärksten gedrüket, und von den obersten am meisten beschweret werden. Je tiefer ein Ort in Vergleichung eines andern Ortes lieget, desto mehrere Schichten des Dunstkreises können wir bey demselben auch annehmen, desto mehr muß also auch die an solchen Orten befindliche Luft gepreßet und von den mehreren Schichten beschweret werden. Es ist dahero gar kein Wunder, wenn man siehet, daß das Barometer auf Bergen, und an höheren Orten tiefer stehet, als an niedrigen und in Thälern, da bey jenen nicht so viele Schichten der Luft aufeinander liegen, folglich auch kein so starker Druk vorgehet, als bey diesen. Es wird dahero auch eine jede Gegend beynahe einen andern Stand des Barometers aufzuweisen haben. Unser Herr Verfaßer nimmt zu seinem Stand des Barometers, welcher nicht selten vorkomme, 27 Zoll und 9 Linien an. Dieses wird zwar an solchen Orten

den laßen, genommen, und allezeit einerley Grad der Hize bekommen.

Zu den Graden der Kälte habe ich eben diese Eintheilung, wie bey den Graden der Wärme, beybehalten, und nachdem ich verschiedene Säfte versuchet, so hat mir der Weingeist, welcher das Pulver anzündet (*), am besten zu den Thermometern geschienen: ja es dünket mich, daß er dem Mercur noch allezeit vorzuziehen sey, und zwar um folgender Ursachen willen:

1. Weil er nach unserer sinnlichen Empfindung viel beßer zu seyn scheinet, um die Kälte und die Wärme vergleichen zu können; dann der Mercur dränget sich bey einer heftigen Kälte viel mehr zusammen, als er, nach diesem Verhältnis betrachtet, bey der Wärme

---

ten geschehen können, welche eben so tief liegen als Paris, hingegen wird man hier in Augsburg den höchsten Stand deßelben nicht viel über 26 Zoll und drey Viertheile annehmen können.

(*) Dieses will so viel sagen: wenn man in einen Löffel ein wenig Schießpulver thut und Weingeist darauf schüttet, daß derselbe, nachdem er angezündet worden ist, fortbrennet, bis das Pulver selbst entzündet wird. Bey der Wahl dieses Weingeistes kan man auch noch dieses bemerken, daß er keinen andern, als Weingeruch haben muß, dann sonsten ist es eine Anzeige, daß andere Geiste darunter gemenget seyn, welche in der Folge der Zeit ausdunsten, gleichwie ich dieses mit der Quinteßenz von Bergamot erfahren habe.

me sich ausdehnet. Wenn man also für eine auserordentliche Wärme das Jahr 1738, welches einerley ist mit den Jahren 1706, 1707 und 1724 und für eine außerordentliche Kälte das Jahr 1709 annimmt, und zwey Thermometer, wovon das eine mit Weingeist, das andere mit Mercur gefüllt ist, beyde aber eine gleiche Eintheilung in 100 Grade von dem mittelmäßigen bis zu dem siedenden Waßer haben, miteinander vergleichet; so wird das mit Weingeist angefüllte für die Wärme von 1738 zwanzig Grad und ein Sechstheil, für die Kälte aber von 1709 sechs und zwanzig und einen viertel Grad anzeigen, da hingegen das von Mercur die Wärme von 1738 mit vier und zwanzig und einem viertel Grad anzeiget, die Kälte aber von 1709 mit fünf und dreyßig Graden bemerket. Dieses macht nun in diesen zwey außerordentlichen Fällen bey dem einen eine Gleichheit, die sich zu der Lage der Stadt Paris sehr richtig verhält, bey dem andern aber eine Ungleichheit, die groß genug ist, um merklich zu werden.

Man kan dieses aber noch deutlicher merken, wenn man die heftigste Wärme und Kälte, wovon wir Versuche haben, vergleichet, nemlich den Punkt der Wärme zu Senegal (*),

(*) Dieser Punkt ist nicht einmal wahrscheinlich. Den Beweis hievon wird man sehen in der Antwort auf den vierten Theil der physicalischen Vorlesungen des Herrn Abt Nollets, welche unten vorkommen wird.

und den Punkt der Kälte auf der Reise von Kamchatka. Dann das Thermometer mit Weingeist wird zu der Wärme von Senegal neun und zwanzig und ein viertel Grad, für die Kälte aber auf der Reise von Kamchatka sechs und vierzig und sieben achtheil Grad angeben; dahingegen das Thermometer von Mercur für die Wärme zu Senegal vier und dreyßig und zwey drittheil, für die Kälte auf der Reise von Kamchatka fünf und sechzig Grad anzeigt. Die Kälte ist also nach dem Thermometer von Mercur beynahe noch einmal so stark als nach dem Thermometer von Weingeist (*).

2) Der

(*) Dieses wird noch weit mehr durch einen anderweitigen Versuch bestätiget, wovon ich seit der zweyten Auflage dieser Beschreibung Nachricht bekommen habe. Der Hr. Prof. Gmelin erzehlet in seinem Buche, welches er Flora Siberica nennet, eine Beobachtung, welche er zu Jeni sey in Siberien im Jahr 1735 mit einem Thermometer des Herrn de l'Isle von Mercur gemacht hat, welcher daselbst bis auf den 281 Grad herabgefallen ist. Dieser Grad kommt nun mit dem 116 Grad des Fahrenheitischen unter der Nulle, mit dem 106 und ein viertel der Kälte meines gleich abgetheilten Thermometers von Mercur, und ungefähr mit dem 72sten und drey viertel Graden der Kälte meines Thermometers von Weingeist überein. Also übertrift auf meinem Thermometer von Mercur, welcher gleich eingetheilet ist, diese Anzahl der kalten Grade die Anzahl der hundert warmen Grade, welche von dem mittelmäßigen bis zu dem siedens

2) Der Weingeist scheinet mir auch diesen Vortheil zu haben, daß er sich nemlich sehr schön färben läßt (†), und folglich sehr gut und deutlich in die Augen fällt; da man hin-

siedenden Waßer gezehlet werden, desgleichen auch an den Thermometern der Herren de l'Isle und Fahrenheit selbst, da sie hingegen auf meinem Thermometer von Weingeist nicht einmal völlig drey viertheile erfordern.

Ist es also wohl wahrscheinlich, daß man auf unsrer Erde einen Grad der Kälte erfahren könne, welcher in seinem Verhältnis die Hize des siedenden Waßers übertrift? Nein, gewis nicht. So muß man also hieraus schließen, daß das Steigen und Fallen des Weingeistes viel gleicher ist, als des Mercurs, und bequemer, das Zunehmen der Kälte zu meßen.

(†) Man muß sich hierzu keiner metallischen Farben bedienen, weil sie das Steigen und Fallen des Weingeistes in etwas hindern. Eben so wenig darf man die Orseille gebrauchen, weil diese Farbe sich verändert und oft verdirbt. Desto sicherer aber kan man sich der Ochsenzungen-Wurzel (Orcanette) bedienen, welche man völlig troknen und hernach nur die kleinsten und dunkelsten Theile nehmen und in den Weingeist einweichen muß. Wann er nun genugsam gefärbet ist, welches man gar leicht erkennen kan, durch eine Röhre, welche man in das Glas hält, so schüttet man denselben in ein anderes Glas, welches man auf das beste verstopfet und ein paar Monate der Sonnenhize und der Kühle der Nächte aussezet, damit die Farbe die noch darinnen befindliche Unreinigkeiten an der Seite nud auf dem Boden des Glases anc

gegen den Mercur, wenn man Versuche in grosser Kälte machen will, mit genauer Noth unterscheiden kan, auch noch über das die Ungelegenheit mit seiner Schwere hat und Gefahr lauft das Thermometer zu zerbrechen, wenn man es von einem Orte zu dem andern hinträgt.

3) Ist es zwanzigmal leichter, gute Thermometer von Weingeist als von Mercur zu machen, weil es sehr viele Schwierigkeiten macht, bis man den Mercur reiniget und alle Feuchtigkeiten aus der Röhre herausbringet. Ja man findet selbst nur sehr wenige Röhren, welche von einer so gleichen Weite sind, als zu dem Mercur beförderlich ist, da sie hingegen, so wie sie der Weingeist erfordert, nicht selten sind.

Es ist wahr, daß der Weingeist in den Thermometern zuweilen einer Aufsteigung seiner Geisterchen unterworfen ist, welches macht, daß der Saft tiefer zu stehen kommt, als es seyn sollte, welches auch besonders bey denen zu geschehen pflegt, woraus gar zu viele Luft herausgezogen wird, besonders wenn sie allzulange in dem siedenden Waßer gehalten werden,

seze und fallen laße, und dieses nicht erst in den inneren Röhren der Thermometer geschehe. Hierauf wird er wieder in ein anderes Glas gethan und zu dem Gebrauch aufbewahret.

den (10). Man kan diesem aber leicht abhelfen, wenn man den Saft in den Knopf her-

(10) Dieses Aufsteigen der Geisterchen des Weingeists ist ein Fall, welcher von denjenigen sehr sorgfältig vermieden werden muß, welche ein richtiges Thermometer verfertigen wollen. Der Fehler, welcher daraus entstehen kan, ist beträchtlich genug, wenn ihm nicht durch das vorgeschlagene Mittel abgeholfen und also die Unrichtigkeit gehoben wird: indem dadurch gar leicht ein Irrthum von einem, anderthalb auch wohl zweyen Graden erwachsen könnte. So lange dem Weingeist keine Gewalt angethan, und derselbe nicht erhizet oder gesotten wird, ist zwar dieses Aufsteigen der Geisterchen nicht so leicht zu besorgen. Desto leichter aber kan dieses geschehen, wenn er eine Zeitlang bey dem Versuche in das siedende Waßer gestecket wird, wo alsdann die subtileste und am meisten spirituose Theilgen sich loswikeln, in eine Art der Dünste verwandelt werden, und da sie nicht in der freyen Luft davon gehen können, sich oben in den Knopf des Thermometers anlegen, wodurch hernach nothwendig eine Verminderung des Weingeistes und des Volumen deßelben erfolgen muß. Noch leichter aber kan dieses geschehen, wie der Herr Verfaßer erinnert, in solchen Thermometern, aus welchen bey dem Zublasen zu viele Luft herausgezogen worden ist. Dann da bey diesen weniger Widerstand der Luft, die sich in der Röhre selbst befindet, für die spirituosen Theile des Weingeistes angetroffen wird, so können sie sich auch desto leichter von der ganzen Massa loswikeln, folglich auch in größerer Menge aufsteigen und einen beträchtlicheren Irrthum verursachen. Daher es sehr nothwendig wird, daß diese Geisterchen mit dem Weingeist bald

unter laufen läßt, und ihn nachhero durch die cirkelförmige Bewegung, wovon ich oben schon gesagt habe, wider vereiniget, oder wenn man das Thermometer in die rechte Hand nimmt und ihm öftere Stöße beybringt, indem man mit der rechten Faust auf die linke klopfet. Hiedurch erhält man, daß der Saft wieder hinabgehet und alle Geisterchen mit sich nimmt. Bleibt aber noch etwas weniges von dem Saft an der Seite der Röhre hangen, so muß man das Thermometer mit Papier bedeken, so weit als der Saft hinauf steigen möchte, und daßelbe in die Sonne sezen, damit sie auf den Knopf und die leere Röhre scheinen könne, Die Wärme wird gar bald machen, daß es herunter laufen

---

wieder vereiniget, und eine neue Probe mit dem Thermometer in dem siedenden Waßer angestellet werde, damit man auch in solchem Fall einen Irrthum vermeide, wann ungefähr die Geisterchen bey währendem ersten Versuche und unter dem Sieden selbst aufgestiegen seyn sollten. Bey dieser Gelegenheit aber, da der Herr Verfaßer in der vorhergehenden Anmerkung die Art und Weise beschreibet den Weingeist zu färben, will ich nur noch dieses erinnern, daß es gut wäre, wenn man denselben, ehe man ihn in ein anders Glas abschüttet, zuvor filtrirte oder durch ein Löschpapier laufen ließe, so würde auf einmal der gröste Theil der Unreinigkeiten davon genommen werden und was noch vielleicht davon übrig geblieben wäre, durch das darauf folgende längere stehen, sich zu Boden sezen müßen, wo es alsdenn wider sachte abgegoßen und zum ferneren Gebrauch

sen muß, besonders wann das Glas der Röhre rein und sauber ist, als worauf man wohl acht haben muß.

Auch dieses ist eine eitle Einbildung, wenn man glaubt, daß der Weingeist durch die Länge der Zeit seine Kraft verliere, weil man siehet, daß das bereis mehr als 24 Jahr alte Thermometer des Observatorii, noch seine völlige Kraft habe. Ja wann dieses wäre, so müßte man nothwendig, wenn man das Thermometer zwey Stunden lang in das siedende Waßer hält, einige Veränderung bemerken können, besonders wenn man dieses mehrmahlen wiederholte. Ich habe aber einige dergleichen, welche schon oft viele Stunden lang darinnen geblieben sind

 und

---

brauch aufbehalten werden könnte. Man könnte auch den Weingeist mit Pappelblätern färben, welche man vorhero wohl troknen läßet. Doch erfordert es längere Zeit bis die Farbe völlig und genug herausgezogen werden kan. Es gießen zwar einige etliche Tropfen von Vitriolgeist hinzu, um den Proceß zu beschleunigen und die Farbe geschwinder herauszubringen; es ist dieses aber kaum zu rathen, da es villeicht dem Gang des Weingeistes einigen Schaden zufügen und ihn verändern könnte. Will man dem Saft eine grüne Farbe beybringen, so kan man die Blätter von Bärenklauen (branca ursina) hiezu nehmen und sie mit Safran vermischt einweichen. Die Farbe hievon ist sowohl daurhaft als schön zu nennen. Doch muß es auch hier beobachtet werden, daß die Blätter sehr wohl getroknet werden, ehe man sie in den Weingeist hineinleget.

und noch eben diese Kraft besizen, welche sie den ersten Tag gehabt haben. Ja ich habe einige von diesen wohl vier und fünf Stunden darinnen gehalten, ob ich sie gleich nur stufenweise von fünf zu fünf Graden bis zu dem Punkte des siedenden Waßers habe steigen laßen. Nur dieses beobachte ich auch jedesmal, wenn ich sie aus dem Waßer ziehe, daß ich den Saft in den Knopf laufen laße, hernach wieder vereinige und an die Sonne seze, wie ich vorhin gesagt habe.

Man sagt noch, daß ein Thermometer von Mercur empfindlicher sey als ein Thermometer von Weingeist. Allein dieser Einwurf ist von keiner Wichtigkeit. Dann wann man von diesem Vorzug des einen vor dem andern urtheilen will, so muß man auf nichts als auf die Röhre sehen, weil diese eigentlich anzeiget. Nun braucht aber, bey einer gleichen innern Weite der Röhre ein Thermometer von Weingeist nur eine Kugel, welche achtmal kleiner ist, als an dem Thermometer von Mercur; und folglich wird das von Weingeist wenigstens eben so geschwind zu seinem Punkt des Gleichgewichts kommen als das von Mercur. Es kommt noch hiezu, daß dieser Punkt des Gleichgewichtes auch viel von dem Grad der Wärme oder Kälte abhänget, welchen das Brett des einen und des andern an sich nimmt. Braucht nicht aber wider allezeit das Thermometer von Mercur ein weit stärkeres als das Thermometer von Weingeist?

Ein Thermometer von Mercur, wird man villeicht noch sagen, hat den Vortheil, daß es grössere Grade der Wärme anzeiget, als ein Thermometer von Weingeist. Allein dieser Vortheil wird unnüzlich, weil man hiezu noch ein anderes Thermometer vonnöthen hat. Ist dieses nun von einerley Art mit jenen, so wird es noch kleinere Grade haben als das Thermometer von Weingeist, und man wird folglich auf der einen Seite dabey weit mehr verspielen, als man auf der andern damit gewonnen hat.

Man siehet also nicht ein, warum so viele den Mercur dem Weingeist vorgezogen, ja diesen leztern in manchen Schriften selbst für untauglich erkläret haben. Dann es erhellet aus dem bisher angeführten ganz deutlich, daß dieser Saft am allerbequemsten und tauglichsten zu den Thermometern ist, besonders da es keine merkliche Veränderung verursachet, wenn er etwas mehr oder weniger gereiniget ist. Ich habe es mit dem allerschlechtesten Weingeist versuchet, sie haben aber einerley Gang von dem siedenden Waßer an bis auf die gröste Grade der Kälte, welche man zu Paris haben kan, beobachtet. Hat man nicht also Ursache, dieses an allen Orten eben so zu vermuthen? Ihre Ausdehnung ist zwar, die Wahrheit zu gestehen, in Ansehung ihres Volumen sehr verschieden, denoch aber bleibet ihr Gang beständig einerley.

Ver-

Verschiedene von diesen Schriftstellern haben zwar behaupten wollen, daß der Weingeist gefriere, allein ich unterstehe mich sie zu fragen: ob wohl jemand einen solchen gereinigten Weingeist, welcher das Pulver anzündet, und dergleichen ich mich zu meinen Thermometern bediene, habe gefrieren sehen? Ich glaube, es wird niemand im Stande seyn, dieses durch die Erfahrung zu beweisen.

Andere haben versichern wollen, daß dieser Weingeist, welcher das Pulver anzündet, noch viel, ja beynahe die Hälfte Waßer in sich halte, und daß nur der Aether eines berühmten Chymisten, welchen man nicht mehr hat, der aber in der That nichts anders als ein außerordentlicher gereinigter Weingeist ist, kein Wasser mehr bey sich führe, weil man ihn, wie man sagt, von diesem Ueberbleibsel des Waßers noch abgezogen hat. Will man sich nun hievon überzeugen, so nehme man einen dergleichen Geist, und seze so viel Waßer zu demselben, als man versichert, daß davon hinweg genommen worden sey; so kan man bald sehen, ob er das Pulver anzünde. Geschiehet dieses nicht, wie ich mit Recht glaube, so wird man desto leichter einsehen können, wie nüzlich und nöthig es sey, die Wahrheit der Versuche selbst zu erforschen.

Da ich zu verschiedenen malen den bestimmten Punkt des gefrornen Waßers vergeblich gesucht habe, indem solcher so beschaffen ist, daß man ihn nicht allezeit auf eine beständige

Weise finden kan: so habe ich im Jahr 1742 die Entstehung des Eises entdeket uud noch über das einen neuen bestimmten Punkt, welcher vortreflich und sehr bequem ist, wahrgenommen. Dieses ist der Punkt des Waßers in dem Eis. Man findet denselben auf den Thermometern, welche ich seit dieser Zeit gemacht habe, auf 10 Grad zwey fünftheil unter dem mittelmäßigen des Kellers des Observatorii bemerket. Ich habe auch zweyerley Gefrierungen angemerket, welche ich öfters mit Salmiak und gemeinem Meer-Salze zuwegen gebracht habe, indem ich dieses einige Stunden lang mit dem einen sowohl als mit dem andern versuchet, nachdem ich das Waßer immer wieder abgegoßen und neues Salz und Eis dazu gethan habe.

Ich habe auch den Grad der Wärme angezeigt, welcher hinreichet, das Jungfer-Wachs so zu schmelzen, daß es unten zusammenrinnt, nach dem Versuche, welchen ich hievon mit großer Sorgfalt gemacht. Dieser Grad fällt auf den 51. Grad der Wärme meines Thermometers.

Ferner habe ich den Grad der Wärme des siedenden Weingeistes mit solchem Weingeist untersuchet, welcher das Pulver anzündet und den ich in einem offenen Gefäse habe sieden laßen. Die Grade der Wärme zu Senegal von 1738, zu Marra in Syrien 1736, zu Pondicheri 1737, zu Paris 1738, ingleichen die Grade der Kälte zu Paris 1740 und

1709

1709 gründen sich alle auf die Beobachtungen, welche in den Memoires de l' Academie des Sciences angezeiget sind. Der Grad der Kälte aber von Tornea in Lappland gründet sich auf eben dasjenige Thermometer selbst, welches ihn ausgestanden, und welches mir von dem Herrn von Maupertuis zweymal anvertrauet worden ist, um das Verhältnis dagegen richtig einzusehen; der Grad der Kälte auf der Reise von Kamchatka beziehet sich auf eine besondere Beschreibung.

Nicht weniger habe ich auf beyden Seiten meiner Eintheilung des Thermometers eine vierfache Vergleichung angestellet, mit den Thermometern der Herren Neuton, Reaumur, de l' Isle und Fahrenheit, weil diese am üblichsten, oder weil damit wenigstens die beste Beobachtungen angestellet worden sind.

Ich hatte ehedem auch eine Vergleichung mit dem alten Thermometer des Observatorii angebracht; allein da ich dieses auch in einer gedrukten Schrift, welche nach dieser mit einigen Zusäzen vermehret vorkommen wird, angezeiget, so habe ich für dienlich erachtet, sie wegzulaßen.

Was das Thermometer des Herrn Neutons betrift, welches aus Leinöl gemacht ist, so habe ich daßelbe auf das genaueste beobachtet, und folglich auch sein Verhältnis gegen die andern sehr richtig angegeben. Der Saft deßelben aber hat diesen großen Fehler bey den Graden der Kälte, daß er sich alsdann an das

Glas

Glas anhångt und lange Zeit vonnöthen hat, bis er sich wieder vereiniget; ob er gleich in den Graden einer großen Wärme vortrefliche Dienste leistet.

Das Thermometer des Herrn von Reaumur bestehet aus drey viertheilen Weingeist und einem viertheile Waßer. Diese Vermischung ist die Ursache, daß wann gleich die Röhren weit sind, das Glas und die Grade auch einerley Dike und Größe haben, doch es långere Zeit braucht, bis es zu seinem Punkte des Gleichgewichts kommt, als ein Thermometer von bloßem Weingeist. Es gefriert auch gerne bey den Graden einer heftigen Kålte, besonders, wenn man sich nicht eines wohl gereinigten Weingeistes hiezu bedienet.

Unterdeßen, wenn man mit drey viertheilen Weingeist, welcher das Pulver anzündet, ein viertheil Waßer vermischet, so behålt das Thermometer, welches man damit machet, wenn es gleich weniger sich ausdehnet und langsamer ist in seiner Bewegung als das von Weingeist allein, doch einerley Gang von dem siedenden Waßer an bis auf die Gefrierung, welche mit Salz gemacht wird, gleichwie ich dieses öfters versucht habe. Wenn aber der Weingeist das lezte in einem Glase, oder stark ausgerochen oder nicht genug gereiniget ist, und das viertheil Waßer noch hinzu kommt, so fangt es an bey der einfachen Gefrierung, ja villeicht schon bey dem mittelmåßigen sich zu verändern und einen sehr ungleichen Gang zu bekommen. Ja wann

es bis zu dem Gefrierungs-Punkt selbst gekommen ist, so wird es sich durch eine heftigere Kälte beynahe gar nicht mehr zusammen ziehen laßen (11). Man kan also für eine genaue Uebereinstimmung dieses Thermometers nicht weiter, als bis zu der künstlichen Gefrierung mit Salze, gut stehen; wobey man aber doch

---

(11) Wenn der Weingeist stark ausriechet, so fliegen die spirituose Theilchen davon und das wäßerichte und unkräftige bleibt zurüke, weil es sich nicht so geschwind und leicht in Dünste verwandeln läßt und in die Höhe steiget. Ein nicht genug gereinigter Weingeist ist der, welcher noch viele fremde und wässerichte Feuchtigkeit bey sich hat. Es kan also bey dem ersten sowohl als bey dem andern, wann noch ein viertheil Waßer zugegoßen wird, nichts anders entstehen, als das das Waßer die Oberhand bekommen, und dieser gemischte Weingeist die Eigenschaften deßelben an sich nehmen müße. Da nun das Waßer, wie solches unten wird gezeiget werden, in der Hize sich zwar ausdehnet, allein in der Kälte sehr ungleich und wenig zusammengezogen wird, bey einer größeren Kälte, die ein gefrieren deßelben bewerkstelliget, aber selbst wieder aufschwellen und sich ausdehnen muß; so kan ein solches Thermometer auch wenig Richtigkeit haben, wenn das Waßer darinnen in größerer Menge als der Weingeist vorhanden ist. Man siehet also leicht hieraus, wie nothwendig und wichtig es sey, daß man einen hoch rectificirten Weingeist zu der Verfertigung der Thermometer gebrauche. Da es aber theils sehr mühsam und beschwerlich ist, durch den gemeinen Weg, nemlich durch das Destilliren denselben so genau zu reinigen,

doch noch allezeit versichert seyn muß, daß es nicht nur von gutem Weingeist gemacht, sondern auch, daß die Weite der innern Röhre genau erforschet und das Thermometer selbst sorgfältig gerichtet worden sey, so wie das große Thermometer des Observatorii und andere, welche mit der gehörigen Sorgfalt sind gemacht worden. Man hat auf deren Seite auch einige von meinen Thermometern angebracht und nach

gen, theils öfters kaum möglich ist alles Phlegma dadurch abzusondern, so wird es hoffentlich nicht unangenehm seyn, wenn ich hier ein leichtes und bequemes Mittel anzeige, wodurch diese Absicht erhalten werden kan. Es wird aber der Weingeist rectificiret, wenn man etwas trokne Potasche demselben zusezet. Denn das Salz ziehet den wäßerigen Theil des Spiritus in sich hinein, es löset sich darinnen auf und läßet sich als eine besondere Flüßigkeit auf dem Boden sehen, wovon der zu oberst befindliche spirituose Theil abgegoßen oder durch einen Heber abgelaßen werden kan. Findet man, daß noch etwas wäßeriges darinnen zurücke geblieben, so kan man diesen Proceß wiederholen. Dann so lange sich noch die Potasche darinnen auflöset, kan man gewiß seyn, daß der Weingeist noch nicht völlig gereiniget worden. Wenn aber die Potasche wie ein troknes Pulver zu Boden fällt, und unaufgelöset liegen bleibet, so ist er völlig von allen wäßerigen Theilen befreyet, und ein solcher Spiritus wird hernach nicht nur das Pulver anzünden, sondern auch in einem Löffel hinweg brennen, ohne die geringste Feuchtigkeit zurücke zu laßen. Indeßen müßte man durch die Erfahrung sich versichern, ob der Gang des Weingeißes dadurch keine Veränderung litte.

nach einer sehr großen Anzahl von Beobachtungen befunden, daß sie allezeit auf das genaueste übereingestimmet haben, wenn der Saft der einen und der andern zu seinem Punkt des Gleichgewichts gekommen ist.

Wann ich mit dem Herrn von Reaumur 10 Grad und ein viertheil von dem Gefrierungs-Punkt bis zu dem mittelmäßigen zähle, so finden sich hingegen deren 105 und ein halber, nach seiner Eintheilung bis zu dem Punkt des siedenden Waßers meines Thermometers.

Was das Thermometer von Mercur des Herrn de l'Isle anbelangt, so setzt er dabey voraus, daß ein jeder Mercur sich auf einerley Weise ausdehnet; woraus er schließet (da er nur einen einigen Punkt zum Grunde seiner Theilung annimmt, nemlich den Grad der Wärme des siedenden Waßers) daß alle untere Grade durch die mehrere oder wenigere Ausdehnung dieses Minerals können bestimmet werden, welche er dahero in hundert tausend oder zehen tausend Theile abtheilet. Dieses hat mich bewogen, verschiedene Versuche deswegen zu machen.

Erstlich habe ich dreymal einerley Thermometer mit drey verschiedenen Arten von Mercur gefüllet, und da ich daßelbe jedesmal auf das mittelmäßige folglich auf einerley Punkt gerichtet, so habe ich gefunden, daß der Punkt des siedenden Waßers auch allezeit gleich wäre. Dieses beweiset nun die Richtigkeit des Grundsazes, welchen Herr de l'Isle angenommen

men hat, und zwar um so vielmehr, weil unter diesen dreyerley Arten von Mercur besonders eine war, welche die andern an Güte und Flüßigkeit merklich übertrafe.

Zweytens habe ich eine 23 Zoll lange Röhre, deren innerer Durchschnitt zwey drittheile oder drey viertheile einer Linie ware, genommen, die aber im übrigen von einem Ende zu dem andern eine vollkommene gleiche Weite hatte. Ich nahme eine gute Wage zur Hand und Gewichte, welche mir ein alter Münzmeister sorgfältig abgegleichet hatte. Die Luft in meinem Zimmer ware während dieser ganzen Arbeit genau auf dem mittelmäßigen. Worauf ich in diese Röhre eine Säule von Mercur gethan, welche, nachdem ich sie gemeßen, 146 Linien und ein sechzehentheil lang ware, und da ich sie in einer jeden Schale der Wage einigemal gewogen, 165 Gran hielte. Ich thate hernach eine andere hinein, die 185 und eine halbe Linie lang und 211 Gran schwer ware, ferner eine dritte, von 143 Linien in der Länge und 162 in der Schwere, nicht weniger eine vierte 182 Linien und ein sechzehentheil lang, 207 Gran schwer. Die fünfte ware von 186 und zwey drittheil Linien, welche 211 Gran woge; und endlich die sechste hatte die Länge von 167 Linien, und ware 189 Gran schwer.

Nach diesem habe ich die Flasche an die Röhre schmelzen laßen, und da sie zuvor von aller Feuchtigkeit wohl gereiniget worden ist, habe ich das Glas dieses Thermometers zu

zwey verschiedenen malen gewogen, jederzeit aber das Gewicht von anderthalb Unzen einem Quint und 21 Gran gefunden. Nach diesem habe ich es mit einem wohl gereinigten Mercur aus einem Spanischen Bergwerke so weit gefüllet, daß das Gewicht von zehentausend Gran herauskame, und ein jeder Gran einen Grad bezeichnen könnte. So bald dieses geschehen, habe ich daßelbe auf das mittelmäßige des Kellers des Observatorii gerichtet, hernach aber, da das Barometer auf 28 Zoll und 4 Linien stunde, in das siedende Waßer gesezet, wozu ich ein Gefäs genommen, in welchem das Thermemeter von dem Waßer, bis zu dem Punkte des mittelmäßigen berühret wurde, und nachdem ich diesen Punkt des siedenden Waßers gezeichnet, so habe ich denselben nachgehends noch einmal zu erhalten gesucht, um desto richtiger darinnen zu verfahren.

Da sich der Punkt des mittelmäßigen fast ganz unten an der Röhre befunden hatte, so hat mir dieses eine Gelegenheit verschaffet, daß ich mit leichter Mühe in dieser eine Mercur-Säule am Gewichte von 100 Gran anbringen und abgesondert erhalten konnte, welche ich im übrigen, so wie ich wollte, näher bringen, entfernen, meßen, heraus und wieder hinein thun konnte.

Diese Säule diente mir auf zweyerley Weise; einmal, um mich von dergleichen Weite der Röhre, hernach aber von der gleichen Eintheilung der Grade zu versichern. Da ich sie bey dem Punkt des mittelmäßigen gemeßen habe,

so

so fande ich sie 88 Linien und ein achttheil lang, und da ich seine Ausdehnung in dem siedenden Waßer mit dem vier und siebenzigsten Theil vermehrte, so mußte er damals 89 Linien und ein Drittheil haben.

Diese 89 Linien und ein Drittheil, nachdem sie von dem Punkte des siedenden Waßers an in 100 Grade getheilet worden, machten, daß das mittelmäßige des Kellers des Observatorii auf 136 Grad drey viertheil, folglich auch der Punkt der Gefrierung, so wie er auf meinen ersten Thermometern bezeichnet ist, auf 155 Grade sieben achttheil zu stehen kame.

Weil man aber seithero bemerket hat, daß der Stand des Barometers ein wenig zu hoch angenommen worden, auch der Herr de l'Isle seine große Thermometer, wonach die übrigen gerichtet worden sind, nicht bis zu dem mittelmäßigen in das siedende Waßer getauchet, sondern nur ungefähr bis zu 90 Grad der untern zehentausend, so habe ich um dieser beyden Ursachen willen einen Grad und drey viertheile fahren laßen und folglich das mittelmäßige des Kellers des Observatorii auf 135, die Gefrierung aber auf 154 fest gesezet.

Ich habe dieses Thermometer Kennern zur Prüfung vorgeleget; und gleichwie die Säule von 100 Gran, welche ich zum Grund meiner Eintheilung angenommen, leicht konnte gemessen und gewogen werden, auch noch überdas mit der ersten, dritten, fünften nnd sechsten Meßung der Weite vollkommen über-

 ein-

einstimmte, von der zweyten und vierten aber nur um einen Gran unterschieden ware, da ferner bey allen sechsen ein vier und siebenzigtheil für ihre Ausdehnung in dem siedenden Waßer angenommen worden; so halte ich dafür, daß die Uebereinstimmung dieses Thermometers richtig genug ist, besonders da diese Arbeit mit einer solchen genauen Sorgfalt unternommen worden ist als es nur seyn kan. Doch muß man dabey voraus sezen, daß der Herr de l'Isle seinen Punkt des siedenden Wassers bestimmet habe, da das Barometer auf 28 Zoll einer Linie stunde, ingleichem, daß er seine Thermometer bis zu der Höhe von 2200 oder 2300 eingetauchet. Dann dieses verursachet nothwendig, daß sein Punkt des siedenden Waßers zwey Grad und einen halben, nach seiner Eintheilung, unter dem meinigen zu stehen kommt. Stimmt aber sein hundert und fünf und dreyßigster Grad mit meiner Nulle überein, so folgt es jederzeit bey dem übrigen, so wie ich es durch eine Menge sorgfältig gemachter Versuche erfahren habe, sowohl in Ansehung der Wärme als der Kälte, dem Verhältnis, in welchem der Gang des Mercurs mit dem Gang des Weingeistes stehet.

Diese Art des Herrn de l'Isle die Thermometer zu verfertigen und zu richten, hat, wie man aus dem bisher angeführten leicht abnehmen kan, ungemein viele Schwierigkeiten bey sich. Dann macht man nicht, so wie ich gethan habe, ein großes Thermometer, so ist es

sehr

sehr leicht geschehen, daß man in einen Irrthum von vielen Graden verfällt.

Es wäre aber übrigens gut gewesen, daß man einen Punkt an dem Barometer bestimmet hätte, damit man also auch nicht blos muthmaßlich den Grad der Wärme des siedenden Waßers bestimmen müßte. Nicht weniger wäre zu wünschen gewesen, daß man sich entschloßen hätte, den ganzen Mercur völlig in das Waßer zu tauchen. Dann ob sich gleich derselbe nicht so sehr stark ausdehnet als andere Flüßigkeiten, so verursachet doch bey den großen Thermometern, der verschiedene Grad der Wärme der Luft, welche über dem Waßer ist, ingleichem das wenigere oder mehrere Eintauchen der Röhre, ja selbst die verschiedene Dike des Glases an der Röhre, einigen Unterschied.

Wollte man dahero ein dergleichen Thermometer, welches mit einer Kugel, die ungefähr zehentausend Gran von Mercur in sich hält, versehen ist, so wie ich gethan habe, auf eben diesen Punkt des siedenden Waßers, welchen mein Thermometer hat, richten, und auch den ganzen Mercur in das Waßer tauchen, so würde alsdenn das mittelmäßige des Kellers des Observatorii auf 137 Grad und einem halben stehen.

Hielte die Kugel dieses Thermometers aber nur ungefähr 2500 Gran von Mercur in sich, so würde dieser Punkt des mittelmäßigen auf dem 135 Grad sich befinden. Dann die Aus-

dehnung, welche das siedende Waßer an dem Glase der Kugel und in der Weite der Röhre verursachet, wenn man die Thermometer hineintauchet, ist nach dem Verhältnis desjenigen, was sie in sich faßen, weit grösser bey den Thermometern, die eine kleine Kugel haben, als bey denen, die mit einer großen Kugel versehen sind. Dahero muß auch der Punkt des siedenden Waßers, bey denen, die eine kleine Kugel haben, tiefer zu stehen kommen.

Ich kan ferner diese Art des Herrn de l'Isle nicht billigen, daß er seine Röhren offen läßt; dann es muß sich auf solche Weise nothwendig Staub und Feuchtigkeit hineinziehen. Ich kan dieses mit drey Thermometern von dieser Art beweisen, welche der Herr von Reaumur in Händen hat, und welche mir, da ich sie sahe, sehr übel beschaffen zu seyn schienen.

Ich kan noch hinzusezen, was ein Academiste, welcher diesen vorhergehenden Artikel gelesen hatte, mir geschrieben, daß er nemlich bey diesem Thermometer noch einen andern Fehler bemerket habe, welcher darinnen bestehe, daß die verschiedene Schwere der Luft bey ihm durch die obere Oefnung wie bey einem Barometer eine Veränderung verursache.

Ich hatte auch würklich im Jahre 1748 selbst Gelegenheit, da ich einige Thermometer von Mercur machte, die Richtigkeit der Anmerkung dieses geschikten Mannes einzusehen und zu erfahren, daß solches bey diesem Thermometer nothwendig angetroffen werden müße.

Dann

Dann weil der Mercur durch die schwerere Luft darinnen würklich zusammen gedrüket wird, und nach Masgabe der verschiedenen Oerter und Zeiten sich um einige Grade zusammenziehen oder ausdehnen kan, so ist es eine unumgängliche Nothwendigkeit diese obere Oefnung zuzuschmelzen.

Es scheinet mir aus dieser Beobachtung von der Zusammendrükung des Mercurs, durch die Schwere der Luft, noch ein anderer unvermutheter Fehler zu folgen, welcher nicht nur das Thermomer des Herrn de l'Isle sondern überhaupt alle diejenigen trift, welche man in verschiedener Grösse von Mercur verfertiget. Es bestehet, derselbe darinnen, daß die gröste Höhe der Säulen eine dergleichen Zusammendrükung durch sein eigenes Gewichte selbst hervorbringen muß. Dennoch hat aber auch dieses seine Richtigkeit, daß dieser Fehler nicht so gar beträchtlich ist als der vorhergehende uud man demselben auch leichter abhelfen kan.

Was das Fahrenheitische Thermometer von Mercur betrift, da es anfänglich nicht so viele Grade der Kälte hatte als des Herrn de l'Isle, und man also auch seinen Punkt des siedenden Waßers nicht so tief sezen durfte; so habe ich denselben einen Grad höher angenommen, daß also der 214 Grad dieses Thermometers mit dem 100 des meinigen übereinkommt.

Das übrige seiner Eintheilung aber in eine Uebereinstimmung zu bringen, habe ich die Nulle auf denjenigen Punkt gesezet, zu welchem ich

meine Thermometer vermittelst des Salmiaks gebracht habe, und da ich alles nach dem Verhältnis, welches der Merkur gegen den Weingeist in Ansehung des Gangs beobachtet, eingetheilet; so habe ich gefunden, daß auf diese Art der 61 Grad dieses Thermometers sehr genau übereinkomme mit dem 14 und einen halben des Thermometers, deßen sich Herr von Maupertuis bedienet hat, die Penduln zu Tornea zu berichtigen, daß ferner sein 23 Grad mit dem 10 Grad und einen halben der Kälte auf meinem Thermometer übereinstimme, das mittelmäßige aber des Kellers des Observatorii sich auf 54 Graden befinde.

Vermittelst dieser verschiedenen Punkten nun, und der vierfachen Vergleichung, welche ich auf meinem Thermometer angebracht habe, glaube ich Ursache zu haben, wann ich sage, daß mein Thermometer allgemein ist: theils, weil man es allenthaben machen kan, theils, weil man alle die Beobachtungen, welche bishero durch verschiedene Personen in verschiedenen Ländern gemacht worden sind und künftig noch gemacht werden, mit weniger Mühe nach denen, welche ich zum Versuch vorgelegt habe, vergleichen kan.

Bestimmung der grösten Kälte, welche man durchgehends in Paris auf der Nordseite in den Jahren 1709, 1740, und den 10 Jenner 1742 empfunden hat. Durch den Verfaßer des vorhergehenden.

Damit ich genau den Grad der grösten Kälte, welchen man durchgehends in Paris 1709, 1740 und den 10 Jenner 1742 empfunden hat, bestimmen möchte; habe ich für nöthig erachtet, diejenige Thermometer, welche noch jezo auf der Stelle sich befinden, auf welcher sie damals waren, und welche folglich alleine geschikt waren in diesem Fall ein richtiges Zeugnis zu ertheilen, sorgfältig zu untersuchen.

Ich habe zwey von dieser Art angetroffen; das eine ist das alte Thermometer des Observatorii von dem Herrn de la Hire, das andere ist des Herrn de Ville von seinem Herrn Vater. Das erstere ist der freyen Luft ausgesezet auf einer Anhöhe des Observatorii auf der Seite des Eingangs; das andere aber ist außen vor dem Fenster angebracht, welches auf die Straße St. Martin bey St. Mery siehet.

Man darf glauben, daß der Herr de la Hire und besonders der alte Herr de Ville sorgfältig genug gewesen sind, zu diesen Thermometern sich Röhren zu wählen, welche von glei-

gleicher innerer Weite sind, wenigstens so wie es äußerlich scheinet, und wann sie von außen gleich sind, so sind sie es gemeiniglich auch von innen. Wenn man sie also, wie ich selbst gethan habe, in solchen Punkten versuchet, welche denen darauf angemerkten Beobachtungen nahe genug kommen, so kan man nicht wohl in einen beträchtlichen Irrthum verfallen.

Man kan nicht weniger versichert seyn, daß sie diese Thermometer mit mittelmäßig gereinigtem Weingeist gefüllet haben, welches genug ist, daß man schließen kan, daß sie bis zu dem Punkt der Kälte von 1709 einen Gang beobachtet haben, welcher dem Gang eines Thermometers, der mit dem besten gereinigten Weingeist gefüllet ist, gleich kommt.

Da aber diese beyde Thermometer nicht auf zwey bekannte Punkten gerichtet sind; so wäre es nothwendig, daß ich sie bey ihrem Punkte des Gleichgewichts mit andern vergleichen mußte, welche auf zwey bestimmte Punkten sehr genau gerichtet waren, damit ich also ihre Eintheilung einsehen und erfahren könnte, woran ich mich halten solle.

Wäre der Punkt der Gefrierung ein solcher Punkt, den man eben so genau bestimmen könnte als den Punkt des Kellers des Observatorii, welcher genau genug ist, so würden diese zwey Punkten hinreichen, um ein gutes Vergleichungs-Thermometer zuzurichten. Da aber die Erfahrung genugsam gezeiget hat, daß dieser Punkt der Gefrierung nicht so richtig in

der

der Ausführung ist, und daß ein geringer Fehler von einem halben ja nur von einem viertheil Grad alsobald einen andern herfürbringt welcher immer beträchtlicher wird, je weiter man sich davon entfernet, so ist es offenbar, daß ein Thermometer, welches auf die zwey Punkte des mittelmäßigen in dem Keller des Observatorii und der Wärme des siedenden Waßers gerichtet ist, so wie ich zu thun pflege, viel sicherer bleibet. Dann bey dem ersten Punkt kan man nicht leicht außer durch Nachläßigkeit einen Fehler begehen, bey dem andern aber kan ein Fehler nicht über einen viertheil Grad ausmachen, welcher bey dem ganzen Thermometer sehr unmerklich wird.

Ich habe also mit solchen Thermometern, welche auf diese beyde Punkte gerichtet worden, eine gleiche innere Weite haben, und von einem Punkte zu dem andern in 100 Grade getheilet waren, diese zwey Instrumente untersuchet und folgendes befunden.

Vergleichung des alten Thermometers des Observatorii mit meinem Thermometer.

Ich habe selbst den letzteren 18 Jenner in dem Loche in der Mauer des Kellers des Observatorii und an eben dem Ort, wo der Herr de la Hire allezeit den Punkt des mittelmäßigen auf diesem alten Thermometer versuchet, den-

denselben gerade auf 47 Grade gefunden, da er doch zu der Zeit des Herrn de la Hire auf 48 ware.

Dieser Unterschied läßt mich vermuthen, daß würklich so viel Geistergen als ein Grad beträgt, in die obere Röhre sich hinaufgezogen haben; oder, welches ich selbst für wahrscheinlicher halte, daß dieses Thermometer seit 1709 so viel an Schleimen abgelegt, welcher sich an die inwendige Röhre von dem mittelmäßigen an, bis zu dem höchsten Stand deßelben angehänget hat. Da nun dieser Grad in dem Volumen des sich bewegenden Safts sich wirklich weniger befindet, und so wie das Thermometer unter das mittelmäßige hinabfällt, auch wächset und zunimmt, so glaube ich, daß man um seinen Punkt von 1709 mit dem Punkt von 1740 genau vergleichen zu können, wohl voraus sezen darf, daß dieses Thermometer bey dem Punkt von 1740 einen Grad und einen halben, bey dem Punkt von 1742 aber einen Grad und zwey drittheil höher würde gestanden seyn als es wirklich geschehen ist.

Nun hat nach der Beobachtung vom 10 Jenner des Jahres 1742 des morgens um drey viertheil auf sieben Uhr, (ich ziehe diese Beobachtung aber deswegen der vom 9 Jenner vor, weil sich die Thermometer damals in ihrem Gleichgewichte befanden, hingegen an dem neunten noch unbeständig waren) dieses alte Thermometer 10 Grad weniger ein sechstheil angezeiget,

und

und mein Thermometer, welches auf seiner Seite angebracht ware, stund auf 22 Graden.

Sezt man also zu dieser Beobachtung mit dem alten Thermometer einen Grad und zwey drittheil hinzu; um seinen Fehler zu verbeßern, so würde es also 11 Grad und einen halben angezeigt haben. Wird noch überdas sein Punkt des mittelmäßigen wieder auf 48 gesezet, so folget daraus, daß 36 Grad und ein halber auf diesem Thermometer 22 Grad meines Thermometers gleich kommen.

Ist also dieses alte Thermometer im Jahr 1709 bis auf fünf Grade herabgefallen, so würde der meinige ihm zur Seite 26 Grade angezeiget haben.

Dieses alte Thermometer aber ist seit dieser Beobachtung, welche früh morgens an dem 10 Jenner 1742 gemacht worden ist, bis um neun Uhr noch immer gefallen, so daß dieser Unterschied etwas weniger als einen Grad betragen hat; folglich würde mein Thermometer, wenn man es nicht hinweg genommen hätte, auf 22 Grade und drey fünftheile gezeiget haben. Es würde also auch mein Thermometer einen Unterscheid von drey und zwey fünftheil Graden gemacht und so viel weniger angezeiget haben, als im Jahre 1709.

Dieses alte Thermometer hat sich im Jahr 1740 auf 14 Graden befunden, allein vermuthlich hat man erst darnach gesehen, da es schon wieder anfienge in die Höhe zu gehen. Dann daß große Thermometer des Herrn von

Reau-

Reaumur, welches neben demselben sich befindet und sich nicht so geschwind beweget, befande sich damals mehr als einen halben Grad unter seinem Punkt des Gleichgewichts mit diesem. Ich nehme also an, daß dieses alte Thermometer früh morgens auf 12 Grad und einen halben gestanden, zu welchen ich noch um seinen richtigen Stand herauszubringen, einen und einen halben Grad zähle, so würde es also auf 14 Grade, folglich das meinige neben ihm auf 20 Grad und einen halben gezeiget haben.

Vergleichung des Thermometers des Herrn de Ville mit meinem Thermometer.

Das mittelmäßige des Kellers des Observatorii ist auf dem Thermometer des Herrn de Ville auf 42. Der Punkt von 1740 auf 8 und einen halben, der vom 10 Jänner 1742 auf fünf und einen viertheil und der von 1709 halb auf der Nulle.

Den vergangenen 9 Jenner um 6 Uhr des Morgens ware dieses Thermometer im Gleichgewichte und zeigte auf 7 Grade; mein Thermometer auf der Seite bemerkte 22, folglich müßen 22 Grad meines Thermometers 35 Graden von jenem gleich seyn.

Es würde also mein Thermometer neben jenem im Jahr 1740, 21 Grad, den 10 Jenner 1742, 23 Grad, und 1709, 26 Grade angezeiget haben.

Der Punkt von 1709 ist also einerley mit demjenigen, welcher auf der Anhöhe des Observatorii ist bemerket worden; und wenn sich im Jahr 1740 ein Unterscheid darzwischen von einem halben Grad und im Jahr 1742 von zwey fünftheilen äußert; so kommt dieses ohne Zweifel daher, weil die große Kälte nicht lange genug gedauret hat, um aller Orten gleich kalt zu machen.

Bestimmung der mittleren Kälte in Paris in denen drey obengemeldeten Jahren.

Allein dieser erhabene Ort des Observatorii, auf welchem die Thermometer der Luft ausgesezet werden, und wo man sie beobachtet, wenn die Kälte schnell wächset, ist nicht so kalt als der Ort, wo der Herr de Ville sein Thermometer aussezet, (indem ein großer Steinhaufe längere Zeit braucht kalt zu werden als ein mittelmäßiger) und dieser leztere Plaz ist nicht so kalt als ein anderer Plaz auf der Nordseite in Paris. Ich verstehe hier nicht diejenige Pläze, welche an dem Fluß oder an den Wällen oder gar außerhalb Paris sind, dann diese sind gar zu kalt (*), sondern z. E. auf

(*) An denen kältesten Plätzen in Paris, wie z. E. an den Quais und am Ende der Fischstraße auf der

auf dem Plaz des victoires oder in der Straße Montmartre.

Um nun die gemeine Kälte in Paris in diesen drey Epochen zu bestimmen, muß man, wie ich dafür halte, zu der im Jahr 1740 von dem Herrn de Ville gefundenen Bestimmung noch einen viertheil Grad meines Thermometers, und zu derjenigen auf dem Observatorio noch drey viertheil hinzusetzen, vermittelst deßen ich also schließe, daß die mittlere Kälte in dieser Epoche auf 21 Grad und ein viertheil meines Thermometers zu schäzen sey.

In dem Jahr 1742 glaube ich, muß man zu dem ersten ein viertheil eines Grades sezen, zu dem andern ungefähr drey viertheile, so wird also die mittlere Kälte dieser Epoche auf 23 Grad und ein viertheil meines Thermometers gesezt werden müßen.

In dem Jahr 1709 endlich, seze ich zu beyden noch ein viertheil eines Grades, und halte folglich die mittlere Kälte dieses Zeitpunkts für 26 Grad und ein viertheil nach meinem Thermometer.

Ver-

Nordseite, ist mein Thermometer, welches ich ausgesezet habe, den 10 Jenner 1742 auf 24 und einen halben Grad, und an denen nicht so kalten Orten, als z. E. in der Straße, welche Traversiere heißet auf 22 Grad. herabgefallen.

Vergleichung der nach denen Lehrsäzen des Herrn von Reaumur verfertigten Thermometer mit den meinigen.

Da man ohne Zweifel fragen wird, mit wie vielen Graden des Reaumurischen Thermometers, diese drey angezeigte Summen übereinkommen, so antworte ich.

1. Wenn man ein Reaumurisches Thermometer hat, welches einem der ersteren von seiner Art gleich kommt, (als welche ich deswegen den andern vorziehe, weil sie sich auf der einen Seite weniger von den 80 Graden, welche Herr Reaumur zu dem Punkte des siedenden Waßers vorgeschrieben hat, auf der andern Seite aber weniger von derjenigen Kälte, welche das Eis bilden kan, entfernen) und daßelbe bey St. Joseph in der Straße Montmartre mit einem der meinigen ausgesezet wird, (so wie ich seit einigen Jahren eines darneben angebracht und bemerket habe, daß diese beyde immer in einer genauen Uebereinstimmung geblieben sind, sowohl bey der grösten Wärme als bey dem mittelmäßigen, bey der Gefrierung und bey der heftigsten Kälte) so muß dieses Thermometer in diesem Fall, welchen ich für die mittlere Kälte halte, zehen Grade anzeigen, so wie es auch würklich im Jahr 1740 geschehen ist, den 10 Jenner 1742 aber 12 Grade weniger ein achttheil, folglich hätte es auch

1709 vierzehen Grade und vier fünftheile bemerken müßen. Wollte man es in dem siedenden Waßer beobachten, so müßte es gänzlich hineingetauchet werden und das Barometer auf 27 Zoll und 9 Linien stehen; in solchem Falle würde es nun 105 und einen halben Grad oder auch weniger in denen geringeren Graden der Wärme bemerken müßen.

2. Daß ein solches Reaumurisches Thermometer, welches eine gleiche Eintheilung der Grade hat, die noch überdas in den Graden der Kälte mit der Eintheilung, die auf seinem großen Thermometer des Observatorii ist beobachtet worden, übereinstimmet, wenn es neben demjenigen, wovon ich allererst geredet habe, zu stehen kommt, im Jahr 1740, eilf Grade und ein sechstheil, 1742, dreyzehen Grade und ein viertheil, und 1709 sechzehen Grade und ein viertheil würde bemerket haben. Würde es aber in siedendem Waßer versucht, so müßte es darinnen 110 Grad und ein viertheil, auch weniger in den geringern Graden der Wärme anzeigen.

3. Wenn man dergleichen Thermometer hat, welche eine solche Eintheilung der Grade haben, welche der Eintheilung derjenigen Thermometer gleich ist, die in den Anmerkungen über die neuesten Schriften in dem 395sten Briefe für die beste gehalten werden, und dieselbe eben diesen Grad der Kälte, wie dasjenige, von welchem ich vorhin gesagt habe, in de

Straß

Straße Montmartre ausgestanden, auch, wie man versichert, 14 Grad ein viertheil gezeiget haben; so würden sich diese Thermometer im Jahr 1740 auf 12 Grad und ein achttheil, 1709 aber, auf 17 Graden und zwey fünftheilen befunden haben. Würden sie endlich in dem siedenden Waßer erforschet, so müßten sie 115 und einen halben Grad zeigen und auch weniger in den geringeren Graden der Wärme.

Bey allen diesen 3 Fällen aber, von welchen ich jezo geredet habe, seze ich voraus, daß diese Thermometer auf das genaueste in Ansehung ihrer innerlichen Weite erforschet, und so, wie es Herr von Reaumur fordert, zu dem mittelmäßigen des Kellers des Observatorii auf 10 Grade und einen viertheil gerichtet seyn müßen.

Vergleichung der Thermometer von Mercur des Herrn de l'Isle und Fahrenheit mit meinem Thermometer.

Villeicht möchte man endlich noch zu wißen verlangen, wie viele Grade meine drey Bestimmungen auf den Thermometern des Herrn de l'Isle und Fahrenheit erfordern. Es dienet also zur Antwort:

1) Daß im Jahr 1740 zwey und zwanzig Grade und ein viertheil auf meinem Thermometer, 173 und einen halben auf des Herrn

de l'Isle, und 9 über der Nulle des Fahrenheitischen gleich kommen.

2.) Daß 1742 drey und zwanzig Grade und ein viertheil meines Thermometers mit 177 und einem drittheil des Herrn de l'Isle, und mit 4 und einem halben über der Nulle des Fahrenheitischen übereinstimmen.

3) Daß endlich 1709 sechs und zwanzig Grade und ein viertheil auf meinem Thermometer 183 Graden und einen viertheil des ersteren, und zweyen und einem halben unter der Nulle des lezteren Thermometers gleich sind.

Verfahren, wodurch eben dieser Verfasser die Uebereinstimmung der Thermometer der Herren de l'Isle, Fahrenheit, Newton und noch anderer mit seinem Thermometer von Weingeist zu bestimmen gesucht hat.

Ich habe mich hiezu eines länglicht runden Gefäses von Blech bedienet, welches 10 und einen halben Zoll hoch ware, unten im Durchschnitt über 4, oben aber nur 3 und einen halebn Zoll hatte.

In dieses Gefäs habe ich eine gewiße Maschine gebracht, welche 1) aus einem kleinen runden Blech, welches 3 Zoll und 5 Linien im Durchschnitt hatte, bestunde; dieses ware ganz durchlöchert wie ein Schaumlöffel, und in sechs

Pläze

Pläze abgetheilet, wovon ein jeder einen Rand hatte, und in der Mitte ein wenig hol ware.

2) Aus einem vierekigten und 12 bis 13 Zoll langen Stänglein, welches durch dieses runde Blech gienge, damit man es hierdurch auf dem Boden des Gefäses in einem Kreis herumdrehen könnte.

3) Aus einem blechernen Dekel von 3 Zoll 8 Linien im Durchschnitt, der das Gefäs mit einem Rand bedekte. Dieser Dekel ware mit sechs Löchern versehen, welche auf die sechs abgetheilte Pläze des unteren Tellergens gerichtet waren, das vorherbeschriebene Stänglein aber gienge ebenfalls durch die Mitte dieses Dekels hindurch.

In die sechs abgetheilte Pläze dieser Maschine habe ich nun sechs Thermometer gesezet, die Röhre eines jeden hatte 10 Zoll und drey Linien, die Kugeln waren beynahe auch gleich gros. Zwey davon waren von Weingeist, zwey von Mercur und zwey von Leinöl. Alle aber wurden von mir sehr sorgfältig auf meine beyde bestimmte Punkte, des mittelmäßigen und des siedenden Waßers, gerichtet, zwischen diesen zwey Punkten in 100 Grade eingetheilet; welche ich nachgehends jederzeit zu fünf Graden auf ihren Röhren, mit zweymal gezwirnter Seide, von zweyerley Farben bemerket, und sie mit Gummi Copal, Firnis und Leinöl aufgeklebet habe.

Da nun das Gefäs voll Waßers ware, und ich meine Thermometer vermittelst der besagten Maschine leicht herausziehen, wieder hineinthun und in dem Gefäse herumdrehen konnte; so unterhielte ich also durch eine öftere Bewegung des Waßers einen beständig gleichen Grad der Wärme. Dann dieses ware nothwendig, damit ich mich in meinen Beobachtungen nicht betrügen möchte.

Ich sezte nachgehends dieses Gefäs an einen Ort, wo die Luft so warm ware, daß mein Thermometer 5 Grade anzeigte. Nachdem nun das Waßer in dem Gefäse sich auf diesen Punkt gerichtet und beständig bliebe, so beobachtete ich meine sechs Thermometer einige Minuten hernach, und schriebe, was ich bey einem jeden bemerket habe, sorgfältig auf. Nach Verlauf einiger Minuten wiederholte ich diese Beobachtung, welche ich eben so sorgfältig niederschriebe, und weil ich sahe, daß sowohl die erstere als leztere Beobachtung völlig übereinstimmte, so ließe ich es dabey bewenden.

Eben dieses Verfahren beobachtete ich auch, in Ansehung des zehenden Grades der Wärme. Bey dem fünfzehenden, zwanzigsten und folgenden Graden habe ich, um dieselbe zu erhalten, nur ein wenig warmes Waßer zugegoßen, und, damit ich einen solchen neuen Grad beständig erhalten möchte, unter das Gefäs kleine Lampen gesezt, welche ich vermehrte, oder ihnen

nen mehr Dacht gabe, so wie es die Umstände erforderten. Wenn nun also das Waßer beständig ware, so widerholte ich, eben so wie vorhero meine Beobachtungen.

Diese Arbeit, bis ich zu dem siedenden Wasser kame, dauerte ungefähr fünf Stunden. Damit ich mich aber von der Richtigkeit meiner Beobachtungen noch beßer überzeugen möchte; so habe ich diese Arbeit zum öftern mit neuen Instrumenten vorgenommen.

Außer diesem aber, was ich mit dem warmen Waßer vorgenommen, habe ich eben dergleichen mit dem kalten Waßer gethan, und zwar bey verschiedenen Gefrierungs-Punkten, die ich entweder mehr oder weniger mit gestossenem Eis und Salz, welches so gut als möglich ware, vermischt worden ist, gezwungen habe, beynahe bis auf den dreyßigsten Grad der Kälte meines Thermometers von Weingeist.

Durch alle diese verschiedene Beobachtungen, zusammengenommen, habe ich endlich herausgebracht, daß der Gang des Thermometers von Mercur, desgleichen auch des Thermometers von Leinöl, in Vergleichung mit dem Gang des Thermometers von Weingeist, nach einem arithmetischen Steigen (progression) geschehe; solchergestalt, daß, wenn man diese drey Thermometer, gesezt, daß sie auf einerley Punkte des siedenden Waßers und des

mittelmäßigen gerichtet, und von dem einen bis zu dem andern Punkte in hundert Grade eingetheilt würden, in eine Uebereinstimmung bringen und ihre Eintheilungen von dem Punkte des siedenden Waßers hinabwärts anfangen wollte: man den ersten zehen Graden des Mercurs sieben Grade und sechs und dreyßig Minuten geben müßte, damit er mit jenen gleich gienge, dem Leinöl aber 8 Grade: bey den andern zehen Graden dem Mercur 8 Grade und acht Minuten, dem Leinöl hingegen acht Grade, sechs und zwanzig Minuten und vierzig Secunden. Folglich wäre das Steigen (progression) des Mercurs herabwärts für zehen Grade, zwey und dreyßig Minuten, für fünf Grade aber acht Minuten, für jeden Grad endlich 19 Secunden und 12 Tertien zu rechnen. Bey dem Leinöl hingegen müßten auf zehen Grade, sechs und zwanzig Minuten und vierzig Secunden, auf fünf Grade, sechs Minuten vierzig Secunden und auf jeden Grad sechzehen Secunden gerechnet werden.

Wollte man also, wie ich gesagt habe, diese Thermometer in eine Uebereinstimmung bringen, so müßte man sie zuerst nach ihrem gleichen Gang eintheilen, neben dieser Eintheilung aber noch eine andere auf der Seite anbringen, welche auf folgende Weise eingerichtet wäre.

	Weingeist.	Mercur.			Leinöl		
	Grade	Grade	Min.	Sec.	Grade	Min.	Sec.
Sied. Waß.	100	100			100		
Grade der Wärme.	90	92	24		92		
	80	84	16		83	33	20
	70	75	36		74	40	
	60	66	24		65	20	
	50	56	40		55	33	20
	40	46	24		45	20	
	30	35	36		34	40	
	20	24	16		23	33	20
	10	12	24		12		
Mittelmäßig	0	0			0		
Grade der Kälte.	10	12	56		12	26	40
	20	26	24		25	20	
	30	40	24		38	40	
	40	54	56		52	26	40
	50	70			66	40	
	60	85	36		81	20	
	70	101	44		96	26	40
	80	118	24		112		
	90	135	36		128		
	100	153	20		144	26	40

Man siehet aus dieser Tabelle, daß man die Grade des Mercur und Leinöls allezeit vergrößern müße, je weiter man hinab kommt, wenn man ihren Gang mit dem Gang des Weingeistes in eine Uebereinstimmung bringen will.

Nachdem ich den Gang des Mercurs und des Leinöls also bestimmet habe, so wurde es mir

mir nicht mehr schwer, die Uebereinstimmung der Thermometer von Mercur des de l'Isle und Fahrenheit mit meinem Thermometr von Weingeist in Richtigkeit zu bringen. Dann eilf Grade des de l'isle machen achte auf dem meinigen von Mercur, welcher nach seinem gleichen Gang eingetheilet ist, und achte des Fahrenheitischen machen auf demselben fünfe. Wenn man also auf einer Tafel, sowohl von dem einen als von dem andern die Eintheilung verfertiget, und sie neben die Eintheilung des gleich abgetheilten Thermometers von Mercur sezen will; so kan man sehr genau bemerken, mit welchem Grad ste allezeit von zehen zu zehen Graden übereinkommen, eben sowohl als wie sie sich gegen mein Thermometer von Weingeist verhalten.

In Ansehung des Newtonischen Thermometers von Leinöl habe ich gefunden, daß einer von seinen Graden, auf meinem gleich eingetheilten Thermometer von Leinöl, drey ausmachte. Dann sein vier und dreysigster Grad kommt mit meinem hunderten überein, und sein vierter Grad mit der Nulle meines mittelmäßigen. Folglich muß auch der fünf und zwanzigste Grad der Kälte dieses Thermometers mit dem hunderten der Kälte meines Thermometers übereinstimmen.

Kennet man nun das Verhältnis des Gangs meines Thermometers von Weingeist; so ist es leicht, daß man die Uebereinstimmung aller Grade des Newtonischen Thermometers, mit

mit den Graden des meinigen von Weingeist, finden kan, wenn man auf eine Tafel die verschiedene Eintheilungen bringet, wie ich bereits erinnert habe, oder, wenn man noch genauer dieses Verhältnis einsehen will, die nöthige Ausrechnung hiezu nicht scheuet.

Man hat in der vorhergegangenen Schrift, die Uebereinstimmung meines Thermometerts in den Graden der Kälte mit dem alten Thermometer des Observatorii gesehen, so wie es ehemals beschaffen ware, nachdem ich sein mittelmäßiges wieder auf 48 gestellet habe, weil es seitdem in der innern Röhre einen Schleimen angeleget hatte. Nun habe ich aber durch andere Beobachtungen gefunden, daß der hunderte Grad der Wärme auf diesem Thermometer ungefähr 30 Grad zwey drittheil der Wärme auf dem meinigen mache und habe also seine Nulle auf 29 Grad ein achttheil der Kälte meines Thermometers gesezt. Es ist also sehr leicht, die übrige Uebereinstimmung selbst zu bemerken, weil er einerley Gang mit meinem Thermometer beobachtet.

Wenn der Gang der Luft dem Gange des Weingeistes genau folget, wie der Herr Amontons versichert hat, so wird es auch nicht schwer seyn, die Uebereinstimmung seines Thermometers mit dem meinigen herzustellen. Dann sein drey und siebenzigster Grad macht auf dem meinigen den Punkt des siedenden Wassers, und sein vier und fünfzigster die Nulle meines mittelmäßigen. Man darf also nur

diese Eintheilung hinabwärts verlängern, wenn man die Uebereinstimmung in den Graden der Kälte fest sezen will.

Das Thermometer des D. Hales, mit welchem er eine Menge artiger Beobachtungen über das Wachsthum der Pflanzen angestellet hat, ist von Weingeist: dahero wird es leicht seyn die Uebereinstimmung deßelben zu bemerken. Dann seine Nulle kommt mit zehen und drey viertheil Graden der Kälte meines Thermometers überein, und sein hundert und achtzigster Grad der Wärme mit 97 Graden und einem viertheile der Wärme des meinigen. Will man also die Uebereinstimmung deßelben in der grösten Kälte erhalten, so muß man auch bey diesem die Eintheilung hinabwärts verlängern.

Das alte Thermometer der königlichen Societät in London ist nicht weniger von Weingeist, und macht also eben so wenig Schwierigkeiten, wann man die Uebereinstimmung davon zu wißen verlanget. Dann die Nulle deßelben macht 17 Grad drey viertheile der Wärme des meinigen, sein hunderter Grad aber bey mir 18 und einen halben Grad der Kälte. Gesezt also, daß es noch tiefer falle und die Röhre deßelben gleich ist, so darf man nur die Eintheilung deßelben verlängern.

Das Thermometer von Fowler, deßen man sich in den meisten Gewächs-Häusern in Engelland bedienet, kan auch, weil es von Weingeist ist, besonders wenn es mit gehöriger Sorgfalt gemacht worden, leicht verglichen werden.

Die

Die Nulle deßelben ist bey mir die Nulle des mittelmäßigen, sein hundert und sechzigster Grad der Wärme, mein fünfzigster, und der hundert und sechzigste Grad der Kälte trift mit dem fünfzigsten Grad der Kälte meines Thermometers ein.

Dieses sind, wo ich nicht irre, alle die Thermometer, mit welchen man bishero die Beobachtungen, welche von einiger Wichtigkeit sind, angestellet hat. Liebhaber derselben können sie gar leicht auf ihre Bretter bringen. Wenn es aber noch einige giebt, von welchen ich nichts gemeldet habe, so kan man diese Lüke gar leicht selbst ausfüllen, da man nichts weiters hiezu nöthig hat, als nur auf ihre verschiedene bestimmte Punkte und auf die Beschaffenheit ihres Gangs acht zu haben.

Ich kan hier nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, daß ein neues Thermometer an das Tageslicht kommt, welches man in dem Calender von Lion, unter dem Namen eines Thermometers von Lion oder von Mercur angekündiget hat.

Dieses Thermometer ist von dem Gefrierungs-Punkte an, welcher mit einer Nulle bezeichnet worden, bis zu dem Punkte des siedenden Waßers in hundert Grade abgetheilet. Eben diese Abtheilung ist aber auch zu den untern Graden beybehalten worden.

Gesezt also, daß dieser Gefrierungs-Punkt mit dem zwey und dreysigsten Grad des Fahrenheitischen Thermometers, und der hunder-

te

te Grad von jenem mit dem zweyhundert und zwölften dieses leztern übereinkäme; so folgt, daß die hundert Grade des Thermometers von Lion, 180 Graden des Fahrenheitischen gleich kommen. Kennt man also das Verhältnis des Fahrenheitischen in meinem Thermometer, so wird man auch leicht das Verhältnis von demjenigen kennen lernen, wovon hier die Rede ist.

Nachricht von den Thermometern des Herrn von Reaumurs und des Verfassers in einem Brief, welcher die Antwort auf den vierten Theil der physicalischen Vorlesungen des Herrn Abt Nollet in Ansehung dieser beyden Thermometer enthält.

Mein Herr.

Hier haben sie die Antwort, welche ich zu Bern im Jenner 1749 auf den vierten Theil der physicalischen Vorlesungen des Herrn Abt Nollet aufgesezet: ich habe den Eingang davon weggelaßen, weil er ihnen unnüze ist; die Sache selbst aber wird also von mir berühret.

Der Herr Abt Nollet drüket sich (p. 566. in der deutschen Uebersezung) folgendergestalt aus: „Es ist unter den Naturkündigern zur „Gewohnheit worden, denjenigen Grad der „Kälte, der nöthig und hinlänglich ist, das „Waßer

„Waßer in Eis zu verwandeln, als einen ge„wißen und festen Punkt anzunehmen. Der „Herr von Reaumur hat denselben bey denen „übereinstimmenden Thermometern, deren „Verfertigung er uns eröfnet hat, mit einer „Nulle angedeutet, und von dar fängt er an „die Grade der Ausdehnung oder Wärme „aufwärts zu zählen, und die Grade der Ver„dikung oder Kälte herabwärts. Es hat „auch in der That die Erfahrung bisher „gezeiget, daß, wenn man diese Instrumente „in Eis oder Schnee, der zu schmelzen anfängt, „oder in Waßer, das eben gefrieren will, ge„sezet, der Liquor zu allen Zeiten und an al„len Orten, jedesmal bis an den Faden herab„geruket, bey dem die Nulle gezeichnet ist, und „wo gerade gegenüber die Worte stehen; „Punkt des Eises, oder Gefrierung des „Waßers, welches also beweiset, daß man den„jenigen Grad der Kälte, wobey das Waßer „anfängt zu gefrieren, als unveränderlich an„zusehen habe.„

Auf dieses Vorgeben, welches den Eingang jener kleinen Schrift stillschweigend widerlegen solle, die ich zu Paris im Jahr 1741 über die Thermometer herausgegeben, habe ich die Ehre Ihnen zu antworten:

1. Daß ich einige Monate zuvor, ehe diese kleine Schrift erschienen, zwey von meinen Thermometern, welche vollkommen gleich giengen, genommen, und das eine neben das große Reaumurische Thermometer auf der Anhöhe

des Observatorii, das andere aber neben ein kleines Reaumurisches, welches der Herr Abt Nollet selbst verfertiget, gesezet habe. Dieses leztere Instrument ware auf dieser Anhöhe an einem Fenster gegen Norden zu aufgehänget uvd der Saft deßelben ware blau gefärbt. Der Herr Maraldi nahme selbst die Mühe auf sich, die Beobachtungen sorgfältig zu machen und aufzuschreiben. Da nun dieselbe sieben oder acht Morgen hintereinander gemacht wurden und alle nahe bey dem Gefrierungs-Punkt zutrafen, so fande sich, daß in Ansehung dieses Punkts zwischen dem großen und kleinen Thermometer ungefähr ein ganzer Grad Unterscheid sey. Ich habe hierauf diese Beobachtungen dem Herrn von Reaumur selbst angezeiget, kurz hernach aber fande man dieses blaue Thermometer zerbrochen und an seiner Stelle ein anderes. Da aber das große Thermometer die Gefrierung verschieden anzuzeigen schiene, welche der Herr Abt Nollet auf seinen Thermometern ordentlicher Weise nicht zu bemerken gewohnt ware; so hat man seit dieser Zeit dieses Instrument sehr leicht erhöhen oder erniedrigen, und also auf den beliebigen Punkt selbst richten können, weil das Loch des Brettes, in welches die Kugel eingefüget ware, sehr groß und ohne Ausfüllung gewesen ist.

2. Daß viele Leute zu Paris und anderer Orten sich sehr beklagt haben, daß diese Thermometer besonders aber in dem Gefrierungs-Punkte, nicht mit einander übereinstimmen.

Die

Die kleine Abhandlung, welche in dem 399sten Brief der Anmerkungen über die neueren Schriften vorkommt, zeigt dieses zur Genüge; indem man daselbst die Verschiedenheit von dreyerley Reaumurischen Thermometern, mit welchen man in Paris Beobachtungen angestellet hat, bemerket.

3. Daß diejenige, welche den Gefrierungs-Punkt dieser Thermometer auf den Grad der Kälte, bey welchem das Waßer gefrieret, gegründet haben, sich nothwendig voneinander und zwar merklich genug haben entfernen müssen, indem die Versuche der Academie del Cimento in Florenz zeigen, das das Waßer unter verschiedenen Graden gefriere.

Ich habe selbst verschiedenemale zu Paris das Waßer in cylindrischen Gläsern, worinnen ich Thermometer hatte, zum gefrieren gebracht, woraus man sehen konnte, daß diese Waßer nicht nur unter verschiedenen Graden, sondern auch selbst unter demjenigen Grade, unter welchem ich wollte, gefrieren können. Ich hatte die Grade auf den Röhren dieser Thermometer angezeiget, und ihren Saft ganz in das Waßer getaucht. Man konnte also durch das Glas und Waßer den Grad der Kälte dieses leztern, ehe es noch gefrore, genau unterscheiden, und selbst alsdann noch deutlich bemerken wann das Eis schon gebildet ware. Ich erbiete mich auch diesen Versuch allezeit in Gegenwart glaubwürdiger Persohnen zu wiederholen, und eine Wette darüber einzugehen, so

hoch man will, daß ich nemlich in dem Waßer Eis herfürbringen wolle, bey 11, bey 12 bey 13 und selbst bey 14 Graden der Kälte meines Thermometers, so daß nicht eher als bey diesen Punkten ein Eis in dem Waßer sich zeigen solle.

Ich sage noch mehr: ich erkühne mich fast jemanden, er mag auch seyn, wer er wolle, herauszufordern, ob er im Stande sey, den Grad der Kälte, welcher hinreichet, das Eis zu bilden, genau zu bestimmen. Dann ich glaube, daß es beynahe unmöglich ist, eine solche gleiche Kälte, als hiezu erfordert wird, entweder in der Luft anzutreffen, oder durch die Kunst um ein cylindrisches Gefäse voll Waßer herfürzubringen. Die Kälte ist nichts anders als eine subtile Materie, welche, ob sie gleich unsren Augen nicht sichtbar wird, dennoch auf die Erde in kleinen von einander unterschiedenen Theilgen, wie der Staub herabfället, welchen der Wind von einem Ort zu dem andern hinführet. Es reicht also ein kleines Theilgen von dieser Materie, welche um einen Cylinder Wasser herum schwebet, (wenn er nemlich bereits 12 bis 14 Grade der Kälte meines Thermometers erhalten hat) schon hin, wenn es die Kraft von 15 oder 16 Graden hat und in den Cylinder hineinfällt, seine Gefrierung zu bewerkstelligen.

Wenn die Ursache der Gefrierung des Waßers, wie der Herr Abt Nollet, mit allen Naturkündigern, nach dem Ausspruch des

Herrn

Herrn Geoffroy (p. 492) behauptet, einig und allein in der Entfernung der Feuer-Materie, welche daßelbe in sich schließet, zu suchen wäre, dann dieses ist die einige Ursache (sagt er p. 446 und an mehreren Orten) welche die Beweglichkeit seiner Theile herfürbringet und folglich auch seine Flüßigkeit: so würde das Waßer in verschiedenen Cylindern, welche eine in allen Stüken gleiche Menge deßelben enthielten und an einerley Luft gesezet würden, auch jederzeit unter einerley Grad nothwendig gefrieren müßen. Dann da in solchem Fall die Entfernung der Feuer-Materie des Waßers in diesen verschiedenen Cylindern eine Folge wäre von der Entfernung der Feuer-Materie in der Luft, womit sie umgeben sind, und zwar eine solche Folge, welche beständig durch ein gewißes Gewicht oder durch das Gleichgewicht dieser äußerlichen Materie bestimmet würde; so müßte ja diese Entfernung aus dem Cylinder allezeit unter einerley Grade seine Wirkung haben. Der Herr Abt Nollet behauptet dieses zwar als einen Lehrsaz, welcher bey den Naturkündigern zur Gewohnheit worden; allein die Erfahrung zeiget offenbar das Gegentheil davon, und ich erbiete mich daßelbe zu zeigen (12).

(12) Es hat jederzeit einige gegeben, welche dieser gemeinen Meynung der Naturforscher, die sie von der Kälte, daß sie nemlich in nichts anders als in einer Ent-

Ich seze noch dieses hinzu, daß ein Cylinder laulichten Waßers, welcher in seiner ganzen

---

Entfernung der Wärme bestehe, angenommen, zu widersprechen gesucht haben. Sie haben um die unüberwindliche Schwierigkeiten zu vermeiden, die sich sonsten dabey finden würden, eine besondere Materie angenommen, welche, wie einige behaupteten, der Salpeter selbst, nach der Meynung anderer aber, eine solche Materie sey, die nur die Eigenschaft des Erkältens, wie der Salpeter an sich habe. Diese leztere entgiengen dem Einwurf, den man jenen machen konnte, da man ihnen vorgeworfen, wann die kaltmachende Materie Salpeter wäre, so müßte auch das Eis ja ein jedes Eis den Geschmak des Salpeters an sich finden laßen. Da man aber auch durch die schärfsten Versuche nichts dergleichen bey dem Eis befinde, so könnte man auch mit keinem Schein der Wahrheit annehmen, daß dergleichen Salpeter-Theilgen, die in der Luft herumgetrieben werden, die Ursache der Kälte sey. Hingegen haben diejenige, welche eine solche kaltmachende Materie für die Ursache der Kälte angesehen, ohne dabey hartnäkig zu behaupten, daß dieselbe nichts anders als Salpeter sey, mit desto größerem Schein die entgegen gesezte Meynung zu bestreiten gesucht. Dann sagen sie, untersuchet man die Art, wodurch die Naturforscher die Entstehung des Eises und die Eigenschaften deßelben zu erklären bemühet sind, so wird man sogleich bey dem ersten Anblick gewahr werden, daß sie denen gemeinsten und bekanntesten Versuchen widersprechen. Das Eis dehnet sich allezeit aus, und erfordert einen größern Raum als das Waßer, daher es nicht nur starke eiserne Röhren zu zersprengen im Stande ist, sondern auch auf dem Waßer schwim-

zen Länge einen kleinen Durchschnitt hat, wenn er gerade über sich in der Luft, und so, daß er

F 4 dem

---

schwimmet. Fragt man nun diejenige, welche die Kälte für nichts anders als für einen Mangel der Wärme halten, woher diese Ausdehnung komme; so werden sie dieselbe alleine der Luft zuschreiben, und da auch das von der Luft befreyte Waßer sich noch ausdehnet, behaupten, daß dieses geschehen müße, weil man die Luft nicht so rein und völlig herauszuziehen im Stande sey, daß nicht die darinnen zurückgebliebene noch eine solche Ausdehnung bewerkstelligen und hersürbringen könne. Soll diese Antwort gegründet seyn, so muß zuerst etwas bewiesen werden, was man doch in Ewigkeit nicht zu beweisen im Stande ist. Nemlich, man muß ausmachen, daß die Luft durch die Kälte sich ausdehnen kan. Nun sind aber alle Naturkündiger in der Lehre von der Luft darinnen vollkommen einig, daß durch die Kälte sich die Luft je mehr und mehr einziehe und verdike, hingegen aber allein durch die Wärme verdünnet und ausgebreitet werden könne. Sobald man aber die Ausdehnung des Eises verständlich erklären solle, muß die Luft eine der vorigen ganz entgegen gesezte Eigenschaft bekommen, und sich wider alle Erfahrung, an statt sich zu verdiken, auszudehnen suchen. Wollte man sagen, daß, indem das Waßer das Eis zu bilden und in einen dichten oder festen Cörper verwandelt zu werden anfange, die Luft in den Zwischenräumchen gedränget werde, einen Ausgang suche und sich in größere Blasen verwandele, welche endlich eine solche Gewalt von sich bliken laßen und äußern. So werden jene nicht weniger sagen, daß diese Antwort eben so viel beweise und erkläre als die vorhergehende. Dann hat die Luft vor-

dem Wind nicht ausgesezt ist, aufgehänget wird, gewiß eher auf dem Boden des Cylinders,

---

vorhero, da die Feuertheilgen noch in dem Waßer waren, folglich dieselbe auch mehr ausgedehnet seyn mußte, Plaz in den Zwischenräumchen des Waßers haben können, warum sollte sie jezo, da die Feuertheilgen fortgejaget werden, und sich die Luft also in die Enge ziehen muß, nicht mehr daselbst bleiben können. Müßte man nicht also behaupten, daß an demjenigen Plaz, wo vorhin ein größerer Cörper bequem hatte stehen können, ein kleinerer unmöglich bleiben könnte. Streitet dieses aber nicht gegen alle Erfahrung? Es hilft nichts, wenn man gleich, diesen Umstand zu retten, sagen wollte, daß die Waßerkügelchen näher aneinander gedränget werden, und die Luft, wenn sie sich gleich noch so sehr zusammenziehe, denoch hiedurch aus ihrem Plaz hervorgetrieben werde. Dann wie wollte man in diesem Fall die Ausdehnung des Eises erklären? Cörper, deren Theile näher und enger zusammengetrieben werden, müßen nothwendig kleiner werden und einen engeren Raum einnehmen. Wie kan also wohl in solchem Fall das Eis sich ausdehnen? Ja werdeu nicht jene sagen, wenn die Hize alle Cörper ausdehnet, und die Kälte nichts anders als der Mangel der Hize ist, so muß auch bey der Kälte nichts anders als ein Mangel der Ausdehnung sich finden, das ist, der Cörper muß sich zusammenziehen und einen engern Raum einnehmen. Dann die Feuer-Materie, welche vorhero durch die kleinste Zwischenräumchen hindurch gedrungen ist, wird nun fortgeschaffet, es müßen also die Theilgen des Cörpers selbst wieder näher zusammengebracht und mit einander vereiniget werden. Da nun nach jener Meynung die Flüßigkeit

ders, als auf seiner Oberfläche zu gefrieren, anfangen müßte, wenn es 14 bis 15 Grad nach

---

sigkeit des Waßers selbst von den Feuertheilgen herkommt, welche durch ihre verursachte Ausdehnung die Waßerkügelchen genugsam getrennt erhalten; so muß ja nachdem die Feuertheilgen fortgehen, diese Trennug aufgehoben, die Waßerkügelchen näher aneinander gebracht und mithin der Körper in einen engeren Bezirk eingeschloßen werden, als er vorhin gehabt hat. Es sollte also nach der gegenseitigen Meynung in allen Fällen gerade das Gegentheil von demjenigen erfolgen, was wir in Ansehung des Eises und seiner Ausdehnung erbliken können. Man könnte villeicht, um diese Meynung von einer kaltmachenden Materie zu bestätigen, nicht mit Unrecht, theils die erfrorne Glieder, theils aber die gefrorne Sachen, und was man bey denselben bemerket, hier anführen. Ein Glied des menschlichen Leibes, welches einen starken Frost ausgestanden hat, scheinet in der That etwas mehr als einen bloßen Mangel der Wärme zu empfinden. Man verspühret daselbst ein gewißes Juken und Stechen, weswegen man öfters wünschte, daß es erlaubt wäre, daßelbe genug zu reiben. Allein man muß diese Lust nicht selten mit vielen Schmerzen bezahlen, wenn man merket, daß man das Uebel nur ärger gemacht habe. Sollte hier nichts als ein Mangel der Feuertheilgen seyn? Wie bald müßten diese in einer warmen Stube, oder durch ein stärkeres Reiben wieder in das erstarrte Glied gebracht werden und aller Schmerz aufhören? Die Sache wird noch deutlicher, wenn man die Art und Weise betrachtet, wie man ein solches völlig erstarrtes Glied wieder zurecht zu bringen suchet. Man stekt daßelbe nemlich in ganz kaltes Waßer

meinem Thermometer kalt und diese Kälte im Steigen ist. Die Ursache ist leicht zu begreifen,

---

oder in Schnee, und sucht es durch dieses Mittel wieder in seinen vorigen Zustand zu bringen. Bestünde die Kälte in nichts anders als in einem Mangel der Wärme, so würde man ja hiedurch die Sache noch weit ärger machen und gleichsam einen Teufel mit dem andern austreiben wollen. Nimmt man hingegen an, daß die Kälte durch eine besondere Materie verursachet werde, so läßt sich diese Sache sehr artig erklären. Dann das kalte Waßer ziehet alle kaltmachende Materie an sich, welche in dem erstarrten Gliede sich befindet und darinnen bey verschiedenen Umständen ein starkes Juken verursachet, ja wenn derselben eine große Menge vorhanden ist, oder auch sonsten unvorsichtig damit zu Werke gegangen wird, die subtilesten Theilgen selbst zerreiset und endlich den Brand oder andern Schaden erzeuget. Hiedurch wird nun freylich die Ursache am allerleichtesten und natürlichsten gehoben, und mit einmal dasjenige hinweggenommen, welches sonsten das ganze Glied hätte verderben können. Man könnte noch, um dieses zu entkräften, sich darauf berufen, daß man um seinen Cörper vor der Kälte zu bewahren, nur ein jedes Glied deßelben wohl einhülle und mit Kleidern versehe. Dann es würden in diesem Falle die Feuertheilgen des Cörpers beßer zusammen gehalten, und könnten also die Glieder deßelben nicht so geschwinde verlaßen. Allein, so viel dieses für die gegenseitige Meynung beweiset, eben so viel kan es auch für diese beweisen. Dann empfinden wir nicht so viel von der Kälte, wann wir in Pelzröke oder dike Kleider gleichsam eingepaket sind, so möchte die Ursache gar leicht diese seyn, daß die kaltmachende

fen: dann weil die Entfernung der Feuer-Materie dieses Cylinders von Waßer eine Folge ist von der Entfernung der Feuer-Materie der obern Luft; so müßte er auch selbst dieser Spur genau und so wie die Glieder einer Kette folgen. Uud dieses um so mehr, da die Feuer-Materie dieses Waßers eben die Beschaffenheit

---

chende Materie nicht so schnell und nicht so häufig auf den bloßen Leib einzudringen vermögend ist, indem sie mehreren Widerstand findet. Das Verhalten, welches man mit den gefrornen Sachen beobachtet, möchte vielleicht nicht weniger diese Meynung zu bestätigen im Stande seyn. Es ist bekannt, daß solche Sachen, die eine Feuchtigkeit in sich haben, als Obst, Fleisch und Eyer, wenn man sie gefrieren und in der Wärme aufthauen läßet, verderben und unschmakhaft werden. Legt man sie aber in ein kaltes Waßer, so überfrieren sie mit einer Schale von Eis, und wenn man diese abschläget, so wird man finden, daß ihnen die Kälte nicht im geringsten geschadet und sie eben so gut geblieben sind, als sie vorhero waren, wenn sie gleich durchaus gefroren gewesen. Müßte die kaltmachende Materie nicht durch die anziehende Kraft eines andern kalten Cörpers, nemlich des Waßers herausgezogen werden, welches sich äußert, indem sich eine Schale von Eis um eine solche gefrorne Sache anleget, so würde, wo nicht ein sehr warmes, doch wenigstens ein laulichtes Waßer weit beßere Dienste hierinnen thun, und die Aufthauung geschwinder befördern können. Man kan aber hievon mit mehrerem nachsehen, was ich in meinem Versuch einer neuen und deutlichen Erklärung der Kälte und ihrer Wirkungen gesagt habe.

heit an sich hat, als die Flamme oder der Rauch, welcher allezeit in die Höhe gehet. Es würde dieses auch desto leichter angehen und geschehen können, weil der Cylinder des Waßers obenher nicht geschloßen ist; und da die Feuer-Materie auf der Oberfläche des Waßers, also das Hindernis des Glases bey ihrer Entfernung nicht zu überwinden hätte, so würde sie eben auf solche Weise wie das angezündete Pulver, welches allezeit auf der schwächsten Seite durchbricht, entwischen können. Allein indem sie sich auf der Oberfläche davon macht, so müßte sie daselbst eine gewiße Bewegung unterhalten, welche von längerer Dauer wäre als auf dem Boden des Cylinders. Müßte aber nicht sodann der Boden des Cylinders zuerst gefrieren, und das Eis, so wie die Feuer-Materie sich nach und nach loswikelte, sich schichtenweise so lange bilden, bis es endlich das oberste dieses Cilinders erreichte, so, daß wann das oberste deßelben zugefroren wäre, der ganze Cylinder zu Eis geworden seyn müßte?

Allein es ist so weit gefehlet, daß dieses geschehen sollte, daß man bey dem Versuche gerade das Gegentheil bemerket. Dann das Eis bildet sich anfangs auf der Oberfläche des Waßers von diesem Cylinder, und gehet nach und nach weiter hinunter: jedoch so, daß es nicht einmal schichtenweise entstehet, sondern sich rund herum anleget und der Mittelpunkt des Waßers das lezte ist, welches gefrieren kan.

Diese

Diese zwey Versuche, welche man, wenn es nöthig wäre, mit vielen andern bestätigen könnte, beweisen also genugsam, daß eine andere Materie hier dazu kommen müße, welche nicht allein die Feuer-Materie aus dem innersten der Waßer-Kügelchen heraustreibet, indem sie sich in die kleinsten Zwischenräumchen derselben einschleichet; sondern auch diese Kügelchen selbst durchsticht und sie gleichsam miteinander verknüpfet, damit sie das Eis bilden können. Da nun diese Verknüpfung bey ihrer ersten Wirkung eine große Stärke erfordert, welche von der Menge und von der Bewegung der Materie, welche dieselbe herfürbringt, abhänget, da auch diese Menge, ob sie gleich in einem großen Maße kräftig ist, dennoch in einem kleinen Maße nicht so wirksam ist, wo ihre Kraft sich erst vermehren muß, wenn sie ein Waßer-Kügelchen durchstechen oder zerreissen und folglich die Gefrierung bewerkstelligen solle, nicht anders als wie ein Funke, welcher erst alsdann im Stande ist, ein Holz, auf welches er fället, anzuzünden, wenn daßelbe sehr warm ist: so läßt sich daraus schließen, daß die Gefrierung des Waßers, weil sie von Zufällen abhänget, welche nicht ordentlicher Weise zutreffen, auch nicht allezeit unter einerley Grad der Kälte vorgehen könne (13).

Ich

(13) Der Herr Verfaßer äußert hier seine Gedanken und meint, man könne sich die Entstehung des Eises einiger

Ich nenne dasjenige, was diese Bildung des Eises herfürbringt, Salpeter, oder auch die Materie der Kälte, wenn man mir den Namen des Salpeters widersprechen will.

Wollte man mit den Augen auf eine merkliche Weise eine dergleichen Materie unterscheiden, so darf man nur eine Gefrierung bewerkstelligen mit gestoßenem Eis und Salz, und zwar

---

einiger maßen begreiflich vorstellen, wenn man annimmt, daß diese kaltmachende Materie (von welcher er oben behauptet hat, daß sie aus subtilen Salpeter-Spizgen bestehe) die Waßer-Kügelgen ganz durchdringe, zerreiße und hierauf gleichsam ankettele und feste halte, daß sie einen solchen dichten Cörper, als das Eis ist, bilden müßen. In der That wäre diese gegebene Erklärung villeicht nicht ungeschikt, theils die Ausdehnung des Eises, theils die Undurchsichtigkeit deßelben daraus herzuleiten, wenn es nur mit seiner angenommenen Meynung von der kaltmachenden Materie, nemlich mit den Salpeter-Spizgen seine Richtigkeit hätte, sodann aber auch wenn nur dabey deutlich erkläret werden könnte, wie die völlig zerstörte und zerrißene Figur der Waßer-Theilgen oder Kügelgen wider so plözlich hergestellet werden könne, als aus dem Eise Waßer gemacht werden kan. Nimmt man dagegen an, daß die Kälte nichts anders sey, als eine ätherische Säure, welche in der Luft die Oberhand gewonnen hat, so wird meines Erachtens alles leicht und deutlich werden. Diese spannt und ziehet die kleinesten Theilgen der Cörper zusammen, daher kommt es, daß alle Arten der Cörper durch die Kälte zusammengezogen und dichter gemachet werden. Daraus fließet die Ausdehnung

zwar so stark als es möglich ist, in einem Gefäse von Holz, von Erde oder Metal; so wird man einige Minuten hernach diese Materie aus den Schweis-Löchern hervordringen und eine Art von weißem Bart bilden sehen. Will man sagen, daß dieses keine Materie sey, welche aus dem Gefäse herauskommt, sondern die Feuchtigkeit der äußerlichen Luft, welche durch diese

---

dehnung des Eises. Denn haben die Theilgen des Waßers, wie es wegen der Flüßigkeit deßelben nothwendig seyn muß, eine runde oder kugelförmige Figur, so weiß man auch daß die Kugelfläche die kleineste ist. Werden nun diese Kügelgen von der ätherischen Säure oder Kälte recht durchdrungen, so werden sie auch stark und villeicht auch ungleich gespannet und zusammengezogen. Hiedurch werden sie nun zwar nicht zerrißen, aber ihre runde Figur wird nothwendig in eine andere Figur verändert werden müßen. Sie bekommen also größere Flächen, sie können sich folglich in mehrern Punkten berühren und stärker zusammen hängen, das ist, es kan aus Waßer Eis werden. Ihre größere Flächen, ihre veränderte Lage und noch andere Umstände, welche dabey anzumerken sind, verursachen die Ausdehnung des Eises. Erhält nun die Hize sodann über die Kälte die Oberhand, so wird diese ätherische Säure wider fortgejagt, die Spannung läßt nach und die Waßer-Theilgen werden hiedurch wieder in ihren vorigen Zustand hergestellet, das ist, sie nehmen ihre runde Figur wider an, und aus dem vorhero dichten Cörper, aus Eis wird wieder ein flüßiger, nemlich Waßer. Siehe den schon oben angeführten **Versuch einer neuen und deutlichen Erklärung der Kälte** &c.

diese gemachte Kälte angezogen wird und um das Gefäße herum gefrieret, ingleichen, daß dieser Versuch unter einer gläsernen Gloke, wohin die Feuchtigkeit nicht kommen kan (welches ich noch niemals versucht habe) sich nicht bestätige; so muß man mir doch zugeben, daß die Kälte eine unsichtbare und magnetische Materie sey, weil sie mit einer solchen anziehenden Kraft begabet ist.

Es scheinet in der That wunderbar zu seyn, das von einer solchen Menge von Naturforschern, welche eben dieser Meynung, wie der Herr Abt Nollet, zugethan sind, noch keiner die zwey Folgen ihres Sazes, wovon ich jezo geredet habe, genauer untersuchet, ungeachtet sie, weil sie der Erfahrung, wie die Bildung des Eises geschiehet, zuwider laufen, den Saz selbst völlig über einen Haufen werfen. Ferner auch, daß man den weisen Bart, welcher sich um die Gefäße, worinnen die Gefrierung geschiehet, ansezet, ganz außer Acht gelaßen, und auch in diesem leztern Fall nicht einmal daran gedacht hat, daß die Feuer-Materie der Luft, welche außerhalb diesem Gefäs ist, sich nicht entferne. Ist dieses aber nicht alles so beschaffen, daß es auf der einen Seite ihre Meynung, wie die Gefrierung vorgehe, umstoßet, indem sie hier unmöglich statt finden kan, da das Eis, welches man durch die Kunst herfürbringt, in nichts von dem natürlichen unterschieden ist; auf der andern Seite aber zum Ueberfluß beweiset, daß eine andere Materie noch hinzukomme,

me, welche die Feuer-Materie aus dem Waßser treibet, und hernach mit Macht, und wenn man es übertreiben will, mit einer gewißen Bewegung die Gefrierung bewerkstelliget. Noch wunderbarer aber scheinet es mir zu seyn, daß, da ich selbst zu Paris einigemal, und zwar im Jahr 1742 und 1743 in dem Caffee-Hause des königlichen Pallastes öffentlich; wie auch noch an andern Orten, den Versuch von der Bildung des Eises unter verschiedenen Graden der Kälte gemacht habe, woraus man deutlich genug sehen konnte, daß die Kälte eine Materie sey, der Herr Abt Nollet nichts davon solle erfahren haben.

Ich nahme zu diesem Versuche verschiedene cylindrische Gläser voll Waßers, und steckte in ein jedes derselben ein Thermometer, auf welchem der Punkt des Waßers in dem Eis mit einem Faden bezeichnet ware. Ich bedekte hierauf einen jeden von diesen Cylindern mit Karten-Papier, damit die herabfallende Kälte die Gefrierung nicht übereilen möchte. Gemeiniglich ware der Ort, wohin ich diese Cylinder sezte, um sie zu erkälten, die Mauer des Gartens, wenn das obere Thermometer, welches an derselben hienge, von 12 bis 15 Grad der Kälte anzeigte. Wann die Thermometer, welche in den Cylindern waren, ein oder zwey, zuweilen auch mehr Grade unter dem Faden, welcher den Punkt des Waßers in dem Eis bemerkte, herabfielen, ohne daß das Waßer gefroren ware, (dann es geschahe öfters, daß

einige vor dem Versuche gefroren, weil die Materie der Kälte an einem dergleichen Ort in einer starken Bewegung ware; weil ich aber eine große Anzahl solcher Cylinder hinsezte, so waren allezeit noch einige übrig, welche ich zu dem Versuch brauchen konnte) so rufte ich die Liebhaber in dem Caffee-Hause zusammen, daß sie diesen Versuch konnten machen sehen. Ich riebe zu diesem Ende zuerst das äußerste Ende eines Drats, oder eines kleinen spizigen Holzes mit einem kleinen Stükgen Eis, und mit dieser geriebenen Spize des Drats oder Holzes durfte ich nur die Oberfläche des Waßers berühren, um die Gefrierung vor jedermanns Augen zu bewerkstelligen. Oder ich machte den Versuch auch auf solche Weise, daß ich das ganze Stük Drat oder Holz mit Eis riebe, oder mit Waßer, welches mit Schnee vermischet, oder einige Augenbliche dem Frost ausgesezet ware, damit es rings herum einen leichten Ueberzug von Eis bekäme. Wann nun dieses geschehen ware, so tauchte ich daßelbe bis auf den Boden des Cylinders, und indem ich um das Thermometer damit herumfuhre, welches darinnen ware, ingleichen auch an den Seiten des Glases; so fischte ich vermittelst der Anziehung des Eises, womit mein Drat oder Holz anfangs ganz leicht überzogen ware, fast alle dasjenige heraus, welches in dem Cylinder gebildet worden und sich an meine Spize gehänget hatte, so, daß ich es hernach jedermann zeigen konnte. Der Herr Abt des

Fon-

Fontaines, nebst einem von seinen Freunden dem Herrn de Presmenil, sahen mich in meinem Hause diesen Versuch in verschiedenen Cylindern mit Waßer den 28sten des Christmonats 1742 machen. Es stunde auch auf meinem Tische ein weites Gefäse, in welchem ungefähr drey Zoll hoch Waßer ware, welches bis zu dem erforderlichen Punkt kalt und im übrigen sehr klar ware: in dieses tauchte ich vor ihren Augen eine kleine nach obiger Art zubereitete Spize ein, und da ich damit in dem Waßer herumfuhre, so zoge ich bald darauf einen Ballen von Eis heraus, der so groß ware wie ein Herren-Apfel (pomme d'api) und welcher sich um diese Spize angeleget hatte (14).

Ich mochte aber die eine oder die andere Art dieses Versuches vorgenommen haben, und das Waßer ordentlich mit Eis umziehen lassen, oder es mit meiner Spize herausfischen, so stiege das Thermometer, welches in dem Waßer stunde, augenscheinlich, so bald eine gewiße

(14) Sollte man nicht villeicht mit Recht den Unterscheid, welchen Herr Weitebrecht bey den Deslislischen Thermometern in Ansehung ihres Gefrierungs-Punktes gefunden hatte, eben dieser Ursache, d. i. dem gefrieren des Waßers unter verschiedenen Graden der Kälte zurechnen können? Man sehe nach, was Herr Prof. Winkler in seinen Anfangsgründen der Physik hievon p. 165. seqq. erzählet.

wiße Menge Kälte, welche das Eis herfürbrachte und sich an meine Spize angehänget hatte, herausgenommen wurde, und zwar so weit, bis es zu seinem bestimmten Punkte des Waßers in dem Eis gekommen ware.

Weil man also verschiedene Grade der Kälte des Waßers, vermittelst der anziehenden Kraft eines Stükleins Eis wegnehmen kan, wann gleich die außerhalb dem Gefäse befindliche Luft viel kälter ist; so erhellet zur Genüge hieraus, daß die Kälte, welche das Eis bildet, eine Materie sey. Dann wäre sie ein Nichts, oder bestünde sie in einer bloßen Beraubung der Wärme, wie Herr Abt Nollet behauptet, so könnte sie keine anziehende Kraft haben und man könnte sie also nicht fischen. Es scheinet also, daß dieser Verfasser in einem großen Irrthum sich befinde, in Ansehung der vorgegebenen Unveränderlichkeit desjenigen Grades der Kälte, welcher das Eis bildet, und in Ansehung der Ursache, welcher diese Bildung herfürbringet.

Er scheinet mir nicht weniger geirret zu haben mit noch verschiedenen andern (p. 491) in Ansehung der Kälte, welche der Salmiac dem Waßer verschaffet und (p. 533. u. f.) in Ansehung der vorgegebenen Verdikung des Waßers, ehe es gefrieret, ferner der Ursache der Ausdehnung des Eises, welche er der eingeschloßenen Luft zuschreibet, wie nicht weniger der Vermehrung seiner Undurchsichtigkeit, wann die Kälte selbst

größer

größer wird, und endlich auch des Mangels eines Geschmaks bey den kaltmachenden Theilgen ꝛc. Dann ich bin versichert, wenn ich hier alle diese verschiedene Stüke genauer untersuchen wollte, daß sie eben so viele neue Beweisthümer für meine Meynung seyn würden: weil ich aber glaube, daß ich für die Richtigkeit derselben schon genug vorgebracht habe, so will ich mich enthalten, etwas davon zu gedenken (*).

(*) Damit ich aber, mein Herr! ihre Neubegierde stille, so will ich noch folgende Anmerkung hinzusezen.

Das Waßer ist ein Element, welches aus kleinen Kügelgen bestehet; welches Guglielmini in seiner Schrift della natura de' l fiumi Cap. I. nebst verschiedenen andern, weitläufig dargethan, diese Kügelgen dehnen sich aus durch die Wärme und ziehen sich zusammen durch die Kälte bis auf einen gewißen Punkt, den ihnen die Natur selbst vorgeschrieben und bestimmet hat.

Dasjenige aber, welches ihre Ausdehnung verursachet, scheinet nichts anders zu seyn, als eine Folge von einer vermehrten und überwiegenden Feuer-Materie in der äußern Luft, welche die Kügelgen, wann sie erstlich durch ihre äußerliche Schweis-Löchlein eindringet, und sich hernach in das innerste der andern Kügelgen, durch die Schweis-Löchlein, die an dem Orte sich befinden, wo sie sich einander berühren, einschleichet, aufschwellen macht nicht anders als einen Ball, welchen man mit Luft aufbläset. Hingegen scheinet ihre Zusammenziehung von nichts anders herzukommen als von einer vermehrten

Der Herr Abt Nollet sagt noch: (p 568) Wenn gleich der ungenannte Autor eines gewiß-

---

ten und überwiegenden Frost-Materie in der Luft, welche, wenn sie sich in die Zwischenräumchen dieser Kügelgen eindringet, und die Kügelgen selbst durch ihre Menge drüket, alsdann die Feuer-Materie durch die obgemeldete Schweis-Löchlein heraustreibet, so wie man die Luft aus einem Blasebalg heraustreibet, wenn man ihn zusammendrüket.

Eine dergleichen Bewegung, welche ohne Verwirrung dieser beyden Materien und nur in denjenigen Fächern, welche einer jeden besonders und eigen sind, vorgehet, scheinet sehr natürlich und begreiflich zu seyn, und läßt sich auch sehr wohl mit allen Erscheinungen, welche uns die verschiedene Beschaffenheit des Waßers vorstellen, vereinigen. Hingegen ist die Meynung, wobey nur die Feuer-Materie allein angenommen wird, welche, wann sie vermehrt wird, und ein Uebergewicht bekommt, in der äußerlichen Luft in das Waßer eindringen, und sogleich wieder aus demselben sich entfernen solle, wann die Feuer-Materie in der äußerlichen Luft sich entfernet, lange nicht so natürlich, und kan auch auf keine Weise mit denen verschiedenen Erscheinungen des Waßers in eine Uebeinstimmung gebracht werden.

Dann die Menge dieser Materie, welche also ohne einige Hindernis in die Zwischenräumchen der Waßer-Kügelgen eindringen würde, weil sie nemlich keine Frost-Materie hätten; ja welche noch durch viel leichtere und weitere Wege, als die Schweis-Löchlein der Waßer-Kügelgen sind, wo sie sich einander berühren, sich einschleichen könnte, würde sich selbst durch ihre Geschwindigkeit und durch ihre Menge im Weg stehen, und foglich auch durch ihren Druk

gewißen Tractats, (der im Jahr 1741 bey uns zum Vorschein gekommen, und worin-

---

Druk alle Ausdehnung dieser Kügelgen selbst hindern müßen.

Auf der andern Seite bekäme die Menge der Feuer-Materie welche aus dem Waßer herausgehen sollte, durch den innerlichen Druk einer andern Materie keine Hülfe, sondern würde nur allein durch die Verminderung ihres Gewichtes und ihrer Menge in der äußerlichen Luft gleichsam herausgezogen werden müßen. Könnte also wohl z. E. diese Feuer-Materie aus dem Waßer in einer gläsernen Flasche mit einem langen Hals, wenn man um dieselbe Eis herum legte, schneller herausgetrieben werden? Könnte wohl die Menge dieser Materie, welche in dem Waßer bleiben würde, mehr verringert werden, als diejenige, welche in der über demselben befindlichen Luft ist, da die Gemeinschaft mit der besagten Luft nicht aufgehoben wird? Könnte endlich auch ein dergleichen Waßer, so wie es uns die Erfahrung täglich zeiget, erfrischet und abgekühlet werden.

Außer diesem aber läßt sich dieser Saz, wie ich schon gesagt habe, mit andern Erscheinungen, welche wir bey dem Waßer bemerken können, nicht zusammen reimen.

Die Waßer-Kügelgen ziehen sich wirlich zusammen, und verdiken sich von dem Grad der Wärme an, bey welchem sie sieden, bis zu dem Grad des Waßers in dem Eis, welches der lezte Punkt und das non plus ultra ihrer Zusammenziehung ist. Man kan dieses gar leicht mit einem Thermometer von gefärbten Waßer versuchen.

Diese Verdikung geschiehet bey diesem Thermometer von Weingeist, aber nur von dem Punkt des

nen man die Temperatur der tiefen unterirrdischen Oerter als einen dem Eise an-

noch

---

siedenden Waßers, welcher bey dem einen sowohl als bey dem andern 100 Grade ist, bis zu dem sechzigsten Grad der Wärme des Thermometers von Weingeist. Nachgehends verändert sich dieser Gang des Thermometers von Waßer, indem er sich etwas weniger zusamenziehet als vorhero, bis auf den fünfzigsten Grad, nach diesem aber verdiket er sich immer noch weniger bis auf die Nulle des mittelmäßigen; so daß die ersten zehen Grade der Wärme meines Thermometers von Weingeist, alsdann ungefähr fünf Graden des gleich eingetheilten Thermometers von Waßer, gleich kommen. Endlich bis zu dem Punkt des Waßers in dem Eis, welcher nach meinem Thermometer von Weingeist, auf zehen zwey fünftheil Grade stehet, macht das Thermometer von Waßer kaum zwey Grade, wobey es noch lange Zeit braucht, bis er dahin gelanget.

Wenn nun hierauf die Kälte sich vermehret und immer in die Zwischenräumchen des Waßers hineindringet, so scheidet es alsdann diese Kügelgen voneinander, und treibet sie so stark auf, daß, wann die Kälte nach meinem Thermometer von Weingeist um drey bis vier Grad vermehret wird, (welche Kälte sie öfters erfordern, ehe sie durchstochen werden oder zerspringen können, damit sie alsdann gleichsam angekettelt und in Eis verwandelt werden) das Waßer mehr aufschwillt und auseinander getrieben wird, als es sich bishero bey zwanzig Graden des besagten Thermometers zusammengezogen und verdiket hat. Alles dieses kan man ganz deutlich sehen, wenn man zwey dergleichen Thermometer zu Hülfe nehmen will.

Wie

noch vorziehenden Punkt angiebt) verschiedenes darwider einzuwenden suchte:
G 5 Dann

Wie soll nun dieses Aufschwellen in dem Waßer, welches geschiehet, wann die Kälte heftig wird, alleine durch die Entfernung der Feuer-Materie der äuſserlichen Luft herfürgebracht werden? Die Naturforscher, welche eben diese Meynung des Herrn Abt Nollets annehmen, sind nicht im Stande einen beständigen Grund davon anzugeben. Dann nach ihrer Meynung sollte bey einer größern Kälte, gerade das Gegentheil erfolgen, und das Waßer müßte sich, ihren Lehrsäzen zufolge, in solchem Falle auch immer mehr zusammenziehen und verdiken.

Sie werden villeicht antworten, um diese Schwierigkeit zu heben, wie sie auch wirklich thun, wenn sie das Aufschwellen des Eises erklären wollen, daß dasjenige, welches diese Aufschwellung verursachet, nichts anders als Luftbläsgen seyn, welche sich ausdehnen, indem sie sich bemühen, aus dem Waßer zu entwischen, welches so tod und ohne Bewegung ist, daß es im Begrif stehet, Eis zu werden.

Allein, man kan in diesem Waßer alsdann kein einiges Luftbläsgen wahrnehmen: es könnte daßelbe auch nicht so sehr, als es wirklich geschiehet, aufschwellen, ohne eine starke Bewegung, und also auch ohne hiedurch der Luft mehrere Gelegenheit zu verschaffen, daß sie leichter entwischen könnte. Diese unsichtbare und uneingeschloßene Luft kan also unmöglich die Ursache eines solchen Aufschwellens seyn.

Außerdem lehret uns noch die Erfahrung, welche wir durch die Luft-Thermometer gemacht haben, (diese Thermometer sehen eben so aus als die ordentliche Barometer, ausgenommen, daß die Oefnung der Flasche

Dann man wird schwerlich diese unterirrdische Oerter so bequem und so durchgängig und überall antreffen, wie das Eis oder den Schnee, und wann man sie auch überal finden sollte, wie wird man wohl können versichert seyn, daß sie alle von gleicher Temperatur sind, weil sich dieselbe, nach dem Zeugnis des Herrn *Cassini*, selbst in den Kellern des Observatorii merklich verändert. Und (p. 809) sezt er hinzu: Können wohl diejenige, welche demselben (nemlich dem Grad der Kälte, wobey das Waßer gefrieret) die Temperatur derer tiefen Keller vorziehen, mit Recht behaupten, daß man eher solche unterirrdische Oerter antreffen

---

Flasche, worinnen die Luft eingeschloßen worden, hermetisch zugeschmelzet ist,) die Erfahrung, sage ich, lehret uns, daß die Kälte an statt die eingeschloßene Luft auszudehnen, sie immer mehr zusammenziehet, je stärker sie wird. Dann die Mercur-Säule fällt alsdann in die Röhre und häufet sich in der Flasche, in welcher also die Luft eben so viel verdiket werden muß.

Da nun also diese Erfahrung selbst weiset, daß die eingeschloßene Luft sich je mehr und mehr verdike, je nachdem die Kälte zunimmt, so kan dieses also nicht die Luft seyn, die das Waßer in dem Fall, wovon hier die Rede ist, austreiben und aufschwellen macht, ist es aber nicht die Luft, so muß es nothwendig eine andere Materie seyn. Nun kan man sich aber keine andere vorstellen oder einbilden als die Kälte. So muß also die Kälte eine Materie seyn.

treffen werde, wie der unter dem Observatorio zu Paris, als in Eis verwandeltes Wasser, oder das anfängt zu gefrieren? Wann dieses so gewiß wahr wäre, als es nicht einmal wahrscheinlich ist, so dürften wir heut zu Tag nicht mehr daran zweifeln, daß diese unterirrdische Temperatur nicht beständig sey, wie sie doch sonst in der That seyn müßte, und wie man es lange Zeit geglaubet hat.

Ich antworte 1. auf die vorgegebene Unbeständigkeit des Grades der Temperatur in denen tiefen unterirrdischen Orten, welche man mir hier vorwirft, daß der Verfasser selbst seinen Einwurf an andern Orten seines Buches, wie ich sogleich zeigen will, entkräftet und widerleget.

Er sagt selbst ausdrücklich (p. 796): Würde man wohl wißen, daß es in denen tiefen Kellern und unterirrdischen Orten, weder zur Winters-Zeit wärmer, noch im Sommer kälter sey, als in allen andern Jahres-Zeiten, oder wenn sich auch einige Veränderungen äußern, daß solche dennoch sehr geringe wären, und (p. 604), die mittelmäßige Wärme, so man auf der Oberfläche des Erdbodens empfindet, wird auch in den tiefsten unterirrdischen Orten wieder verspühret. Und endlich p. 814 sezt er hinzu, daß der in denen tiefsten unterirrdischen Oertern bemerkte Punkt auf $10\frac{1}{4}$ Grad (nach dem Reaumurischen Thermometer

t(r) sich erstreke, und daß diese Methode so sicher sey, daß, wenn einmal der Liquor mit einem von diesen Punkten übereinkommt, er gewiß auch mit allen andern übereintreffe.

Man wird villeicht sagen, um einen so offenbaren Widerspruch zu entschuldigen, daß der Herr Abt Nollet in meiner kleinen Schrift gesehen habe, daß sich die Temperatur meines Thermometers nur auf tiefe unterirrdische Oerter gründe, da er hingegen zu den 10¼ Graden seines Thermometers sehr tiefe oder gar die tiefste erfordert. Wann man sich aber nur die Mühe nehmen will, auf der einen Seite meine Schrift selbst, auf der andern aber die von dem Herrn Abt Nollet, noch ehe sein Buch zum Vorschein gekommen ist, verfertigte Thermometer anzusehen: so wird man sehen, daß ich in Ansehung meines Punktes des mittelmäßigen mich nicht nur auf das Loch in der Mauer des Kellers unter dem Observatorio, sondern auf eine Erzgrube von Ardinghem, nahe bey Calais, welche 447 Schuhe tief ist, gestüzet. Diese Tiefe übertrift nun die Tiefe des Kellers des Observatorii um 363 Schuhe, und man kan noch über das in der zweyten Auflage meiner Schrift, welche sich in dem Schweizer-Mercurius vom Januarius 1747 findet, bemerken, daß ich diesem Punkt nachgehends noch einen neuen Grund verschaffet, durch die Erfahrung, welche man in den Jahren 1741 und 1742 mit einem von meinen Thermometern

ter mit der großen Abtheilung, beständig gemacht hatte, und zwar in einer großen Höle, über welcher mehr als 360 Schuhe hoch Erde oder Marmor lage, zu Salelle bey Carcassona. Man ist in diese Höle mehr als 500 Schritte weit vor sich gegangen und hat das Thermometer an verschiedenen Pläzen derselben versucht. Siehet man also nicht deutlich genug hieraus, daß ich das mittelmäßige auf meinen Thermometern nicht nur auf jenes Loch in der Mauer gegründet, sondern noch auf zwey andere viel tiefere unterirrdische Oerter. Hingegen siehet man auf alle Brettern der Thermomemeter, welche der Herr Abt Nollet mit seiner eigenen Hand bezeichnet hat, neben den zehen Graden und ein viertheil geschrieben: Temperatur der Keller des Observatorii. Beweiset dieses nicht, daß er damals die Tiefe dieser Keller, welche nur von 84 Schuhen ist, als den einigen Grund dieser Temperatur angenommen, sondern auch geglaubt hat, daß alle diese Keller einerley Temperatur zu allen Zeiten haben: da ich mich hingegen durch meine Versuche stillschweigend eingeschränkt habe auf die Temperatur des obgemeldeten Loches in der Mauer sowohl im Sommer als im Winter.

Er hat sich also selbst sein Urtheil gesprochen. Er gibt zwar vor, daß er in Ansehung dieses Loches in der Mauer bey meinen Thermometern einen Fehler von einem viertheil Grade gefunden habe, und zwar, wie er sagt, durch die richtigste Versuche: allein ich habe

alle Ursache daran zu zweifeln. Dann man hat mir diese Versuche nicht mittheilen wollen, ob ich gleich den vergangenen 30 October an die Persohn, welche darum wißen und sie selbst verwahren mußte, geschrieben und sie darum gebeten habe. Gesezt aber, daß dieser Fehler wirklich zu beweisen wäre, so würde er doch ohne Folgen seyn in Ansehung meines mittelmäßigen, da daßelbe sich auf Beobachtungen anderer viel tieferer Oerter gründet, wo die Ursache dieser vorgegebenen Veränderung nicht statt finden kan, wann anders diese Ursache natürlich seyn sollte, so wie sie villeicht nur zufällig ist, indem ich selbst einmal etwas dergleichen bey einer Ueberschwemmung des Waßers bemerket zu haben glaube. Ja was noch mehr: ich würde selbst bey ihm einen Fehler von beynahe einem Grad in Ansehung dieser Keller antreffen, weil ich nach der Ausgabe meiner Schrift, unstreitig durch Versuche gefunden habe, daß die verschiedene Pläze dieser Keller in der Temperatur bey nahe um einen Grad verschieden waren. Ja ich wollte ihn wohl bey nahe eines Fehlers von zwey Graden überweisen, wenn er die Probe mit einem von seinen Thermometern, den er selbst mit eigener Hand gezeichnet hat, und der hier in Bern sich befindet, machen müßte.

Uebrigens, weil ich sahe, daß mein Lehrgebäude alle Tage durch neue Versuche unterstüzt würde, so habe ich seit dem lezteren Monat Julius bey der Aufschrift meiner Thermometer

meter die Worte: Temperatur des Kellers des königlichen Observatorii zu Paris weggelaßen und an statt derselben Temperatur der Erdkugel hingesezet.

2. Was die Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit betrift, die Thermometer auf den Punkt des mittelmäßigen zu richten in Vergleichung mit der Bequemlichkeit oder Unbequemlichkeit sie mit dem Eis zu richten; so antworte ich, daß es nach meiner Art nur darauf ankommt, daß man ein gutes Prob-Thermometer (etalon) habe, welches auf das mittelmäßige wohl gerichtet ist. Vermittelst deßelben kan man hernach unzählige andere in einem großen Gefäse mit Waßer darauf richten, welches ich an einem hiezu tauglichen Ort gar leicht auf diesen Punkt bringe, und also nicht nöthig habe, allezeit wieder zu dem ersten unterirrdischen Ort meine Zuflucht zu nehmen. Dieses Verfahren ist so einfach und so leicht, daß es nicht die geringste Beschwerlichkeit verursachet, da man hingegen mit dem Eis weit mehr zu thun hat. Man muß erst warten, bis man dergleichen bekommt, man muß es zerstoßen, und wenn man auch alles hat, so fügt es sich doch niemals so genau an das Instrument an, als das Waßer, und man kan also daßelbe weder so genau noch so geschwinde richten, wenn man auch dem Herrn Abt Nollet zugeben wollte, welches man doch widerspricht, daß das Eis, wenn es anfangt zu schmelzen, allezeit und allenthalben einen gleichen Grad der Kälte habe.

End-

Endlich antworte ich in Ansehung der Richtigkeit der fünferley Mittel, welche der Herr Abt Nollet vorschlägt, um den Punkt der Gefrierung zu bestimmen, nemlich den Schnee, das gestoßene Eis, den Hagel, das gefrorne Waßer, und das Waßer, welches im Begrif ist zu gefrieren, daß keines von diesen Mitteln nach seinen eigenen Begriffen, welche er davon hat, sicher genug ist, indem er eines vor so sicher hält als das andere, ungeachtet in Ansehung deßen ein sehr großer Unterscheid unter ihnen sich befindet.

1. Ich halte den Schnee für das beste und villeicht für das sicherste, wenn man eine gewiße Vorsichtigkeit dabey beobachtet, auf welche ich erst den vergangenen Frühling gefallen bin. Da aber der Herr Abt Nollet einen Schnee hierzu bestimmet, welcher anfangt zu schmelzen, und ein dergleichen Zeichen des Schmelzens sehr ungewis ist, da der Schneehaufe, in welchen man das Thermometer steken muß, zwar außenher, aber nicht innen schmelzen kan, so darf man sich auf diese Bestimmung, ja selbst nicht einmal auf die Vorsichtigkeit, welche ich dabey gebrauchet habe, sicher verlaßen, weil ich nicht gewiß weiß, ob ich zu einer andern Zeit oder an einem andern Ort gleich glüklich damit seyn würde.

2. Was das gestoßene Eis betrift, so lehret die Erfahrung alle diejenige, welche daßelbe gebrauchet haben und noch zu Paris so wohl als an andern Orten gebrauchen, wenn

sie

sie ihre Thermometer in diesem Punkte miteinander vergleichen, daß man sich zum wenigsten um einen viertheil Grad dabey betrügen kan. Und wie kan dieses anders seyn, da der Herr von Reaumur zu diesem Ende ein **Eis** fordert, **welches an einem Orte stehet, wo es nicht gefrieret, auch nicht schmelzet,** und der Herr Abt Nollet hingegen befiehlet, daß man **ein Eis nehmen solle, welches anfange zu schmelzen?** Ist etwa kein Unterschied zwischen diesen zwey Arten von Eis?

3. Den Hagel habe ich zwar in Ansehung seines Grades der Kälte niemals versuchet. Allein wäre es nicht lächerlich und oft vergeblich, wenn man warten wollte, bis ein Hagel fällt, daß man denselben sammlen könne?

4. In Ansehung des **gefrornen Waßers, oder beßer, des Waßers unter dem Eis,** behaupte ich, daß man sich um mehr als zwey Grade dabey betrügen kann. Dann ich habe dieses selbst erfahren, wenn die Kälte groß ware, so daß mein Thermometer auf 16 oder 18 Graden stehet. Dann, wann man in freyer Luft auf das äußerste Ende einer Mauer, doch daß es vor dem Winde beschüzet ist, ein cylindrisches Glas voll temperirten Waßers, oben offen, im Durchschnitt von ungefähr zwey Zoll, worinnen das Waßer ungefähr fünf bis sechs Zoll hoch stehet, aussezet, und ein Thermometer, auf welchem der Punkt **des Waßers in dem Eis** mit einem Faden bemerket ware, hin-

einstekket, nachdem der Saft deßelben zuerst so erkältet worden, daß er, wenn man ihn in das Gefäs stekt, ungefähr ein paar Grade wieder hinaufsteigen muß: so wird man finden, daß ein solches Waßer viel geschwinder auf seiner Oberfläche als auf dem Boden des Gefäses erkalten wird. Es wird also, wenn das Eis anfängt di Oberfläche zu überziehen und auch dieselbe schon wirklich überzogen hat, das Thermometer, welches in dem Waßer ist, ungefähr zwey Grade über den Punkt des **Waßers in dem Eis** anzeigen. Dieses aber beweiset nun unstreitig, daß das **gefrorne Waßer** oder das **Waßer unter dem Eis** kein fester und beständiger Punkt sey.

5. Was das **Waßer betrift, welches im Begrif ist zu gefrieren**, so gibt es zweyerley Arten davon, welche mehr oder weniger in dem Grad der Kälte voneinander unterschieden seyn können. Das Waßer, welches allenthalben mit Eis umwikelt ist, das sich immer mit Verminderung des Waßers vermehret, ist ein Waßer, welches im Begrif stehet, zu gefrieren. Dennoch aber kan dieses Waßer niemals mehr Kälte erhalten, als zehen Grad und zwey fünftheile nach meiner Abtheilung, es mag auch so kalt seyn als es immer will. Das Waßer, welches in einem cylindrischen Glase, welches bedeket und in einer verschloßenen Kammer einige Stunden lang bey einer ruhigen, das ist, bey einer solchen Kälte, welche mein Thermometer auf 14 bis 15 Graden anzeigt, und die

weder

weder merklich zu- noch abnimmt, ausgesezet wird, ist nicht weniger ein Waßer, welches im Begrif ist zu gefrieren. Dann sobald das Thermometer, welches darinnen stehet, unter den Punkt des Waßers in dem Eis gefallen ist, so kan ich, wann ich will, die Gefrierung bewerkstelligen. Dem ungeachtet kann daßelbe wohl 14½ Grade der Kälte meines Thermometers ohne zu gefrieren aushalten. Da man also zwischen diesen beyden Waßern einen Unterscheid von drey und einem halben Grad der Kälte antreffen kan, so siehet man leicht, daß das **Waßer, welches gefrieren will**, kein fester Punkt sey.

6. Weil der Herr von Reaumur noch ein anderes Mittel zu der Gefrierung vorgeschlagen (S. Memoires de l'Academie 1730) deßen der Herr Abt Nollet in seinem Buche nicht gedenket, so finde vor nöthig hier davon zu reden.

Dieses Mittel bestehet darinnen, daß man eine künstliche Gefrierung bewerkstelliget, wenn man um einen blechernen Cylinder voll Wassers, deßen innerer Durchschnitt ein wenig größer seyn solle, als der Durchschnitt der Kugel des Thermometers, welchen man hineinsteket, gestoßenes Eis und Salz leget. Man läßt das Thermometer so lange darinnen, bis das Waßer des Cylinders gefroren ist, und der Saft des Instruments aufhöret herabzufallen. Wenn nun dieser Saft tiefer fällt, als der

Faden, welchen man durch die Rechnung bestimmet hat, um den Punkt der Gefrierung auf diesem Thermometer anzuzeigen, so sezt man noch Saft zu, bis er an diesen Faden reicht, oder wenn er nicht so weit herabfallen kan, so nimmt man etwas davon hinweg.

Ohne daß ich etwas von der Mühe und wenigen Sicherheit des ersten Verfahrens, die Grade des Thermometers zu bestimmen, gedenke, so finden sich noch überdas zwey Fehler dabey. Der erste bestehet darinnen, daß das Eis, welches sich um die Kugel herumbildet, sie angreift und ihr denjenigen Grad der Kälte, welchen es selbst hat, mittheilet. Da aber dieser Grad der Kälte von dem Salz abhänget, welches man unter das gestoßene Eis mischet, und von noch verschiedenen andern Umständen, so muß er auch nothwendig sehr veränderlich seyn, so daß man sich also beträchtlich und merklich genug dabey betrügen kan. Der andere Fehler bey diesem Verfahren entspringt von dem Zusezen oder Hinwegnehmen des Saftes; dann wann die Röhren dieser Thermometer, so wie der Herr von Reaumur fordert, groß sind, so kan man es nicht wohl vermeiden, wann entweder noch Saft zugesezet oder hinweggenommen wird, daß nicht etwas von dem Safte an den Seiten der Röhre, so viel ungefähr ein halber Grad betragen möchte, kleben bleiben sollte, welches nicht Zeit genug hat, sich mit dem andern zu vereinigen,

da

da es in dergleichen Fällen öfters länger als einen Tag anstehet, bis der ganze Saft wider zusammen lauft.

Weil nun also keines von diesen sechs Mitteln, wovon ich bishero geredet habe, sicher genug ist; so habe ich im Jahr 1740 den Punkt des mittelmäßigen in dem Loche der Mauer angenommen, um ein Prob-Thermometer darauf zu richten, nach demselben aber alle meine Thermometer zu verfertigen, besonders auch, weil man mit diesem Prob-Thermometer viel kürzer, bequemer und sicherer die Thermometer in dem Waßer, welches zu diesem Punkt ist zubereitet worden, richten kan. Ich habe dahero im Jahr 1741 mit Recht sagen können, daß der Punkt des mittelmäßigen dieses Loches in der Mauer in Ansehung seiner Sicherheit und Bequemlichkeit, allen übrigen noch so verschiedenen Mitteln, welche man damals hervorsuchte die Thermometer zu richten, vorzuziehen sey. Da ich aber nachgehends, nemlich im Jahr 1742, noch zu gutem Glük die Bildung des Eises und den Punkt des Waßers in dem Eis entdeket und durch die sorgfältigste und genaueste Versuche gefunden habe, daß dieser Punkt auf zehen Grad und zwey fünftheile meiner Abtheilung unter meinem angenommenen Punkt des mittelmäßigen gesezet werden müße: so bekam ich hiedurch ein sehr leichtes und sicheres Mittel ein neues Prob-Thermometer zu verfertigen, bey welchem der Keller

des Observatorii, sowohl als ein jeder anderer unterirrdischer Ort und mein erstes Prob-Thermometer selbst unnöthig und überflüßig bleibet. Es könnte also ein jeder Fremder, wenn er nur in einem Lande wohnet, wo es gefrieret, eines dergleichen, welches eben so richtig gienge, ohne ein dergleichen Hůlfsmittel zu haben, verfertigen.

Dann man darf nur zu diesem Ende ein gemeines Waßer in einem cylindrischen Glase so lange gefrieren laßen, bis sich das Eis auf allen Seiten wohl angeleget hat. Man bricht hierauf die Oberfläche dieses Eises entzwey und tauchet den ganzen Saft des Thermometers hinein. Man muß aber wohl acht haben, daß man dieses mit Eis umzogene Waßer in der Kälte erhalte und nirgend wohin seze, wo die Sonnenstrahlen auf daßelbe anprallen könnten, nicht weniger auch, daß die Kugel des Thermometers durch die Vermehrung des Eises nicht fest size, welches man auch leicht verhindern kan, wenn man nur das Thermometer von Zeit zu Zeit beweget. Ist nun der Saft des Instrumentes in diesem Waßer bis zu seinem Punkt des Gleichgewichtes gekommen, so merkt man denselben mit einer Seide und versichert sich hernach deßelben in einem andern dergleichen Waßer, wo man alsdann ganz deutlich durch das Eis hindurch sehen kan, ob die Seide gerade auf dem Punkte ist: wo nicht, so muß man sie mit einem etwas rund

zuge-

zugespizten Meßergen darauf richten. Dieser Punkt aber ist so richtig, daß, wann die Grade des Instruments so groß sind, daß die Dike der Seide nur den zwey und dreyßigsten Theil davon ausmacht, man dabey niemals einen Unterscheid, der so viel als diese Dike der Seide beträgt, wahrnehmen wird. So lange noch ein Waßer in dem Eis bleibet, es mag außen so kalt seyn, als immer will, so wird dieses Waßer immer einerley Kälte haben. Dann bringt man einige Wärme hinein, wie solches leicht geschehen kan, wann man ein Thermometer hineinsezet, welches nicht so kalt ist, so wird das Eis diesem Waßer gar bald genugsame Kälte verschaffen, um diese hineingebrachte Wärme herauszujagen; und bringt man eine Kälte hinein, wie solches durch ein kälteres Thermometer geschehen kan, so wird die Schnellkraft der Waßerkügelchen nebst der anziehenden Kraft des auf allen Seiten sich angelegten Eises gar bald im Stande seyn, diese fremde Kälte zu vertreiben.

Vermittelst dieses besondern und richtigen Punktes, kan man nun ganz leicht und ohne in tiefe unterirrdische Oerter hinabzusteigen, das mittelmäßige der Erdkugel auf einem Prob-Thermometer sehr genau bestimmen. Dann ist dieses ausgemacht, wie der Herr Abt Nollet versichert, vermuthlich zufolge einer großen Menge von Versuchen, welche er so wohl als ich in den tiefsten unterirrdischen Oer-

 tern

tern und mit sehr richtigen Instrumenten hat machen laßen, ist es ausgemacht, sage ich, daß in denselben das Reaumurische Thermometer zehen Grade und ein viertheil, welches eben so viel ist als meine Nulle, anzeiget; so darf man nur den ganzen Raum meines Thermometers, welcher zwischen den Punkten des siedenden Waßers und des Waßers in dem Eise ist, in 110 und zwey fünftheil Grade eintheilen, worauf man zehen Grade und zwey fünftheil über diesem lezteren Punkte, das mittelmäßige, wovon hier die Rede ist, gar leicht finden kan.

Ist diese Arbeit sorgfältig und richtig genug geschehen, so kan man hernach mit diesem neuen Prob-Thermometer eine Menge anderer Thermometer, so wie ich vorhin schon gesagt habe, in dem Waßer auf das mittelmäßige richten, und zwar viel geschwinder, bequemer und richtiger als mit gestoßenem Eis, oder einem andern dergleichen Mittel, welche der Herr Abt Nollet angegeben hat. Dann man thut allezeit dasjenige viel beßer, was man leicht, ohne viel Umstände und bequem verrichten kan, als was mehrere Schwierigkeiten hat, viele Umstände erfordert und unbequem ist.

Der Herr Abt Nollet hat den Vorwurf der Unbequemlichkeit der großen Thermometer des Herrn von Reaumurs ablehnen wollen, indem er sagt (p. 817) daß sie nur darzu verfertiget wären, damit man andere dar-

nach

nach einrichten können, die eben so richtig und doch zugleich viel kleiner wären als jene. Die Erfahrung hat aber zur Genüge gewiesen, daß diese kleine Thermometer mit den großen in ihrem Gleichgewichte nicht übereinstimmen, ja, daß die kleinen sich selbst untereinander nicht völlig gleich kommen.

Da mir ehemals der Herr von Cossigni, welcher eines von diesen kleinen zu Pondicheri hatte, und deßen Beobachtungen in den Schriften der Academie stehen, nicht weniger auch der Herr David, Gouverneur von Senegal, der ein anders von eben der Art hatte und deßen Beobachtungen in eben diesen Schriften zu finden sind, zu Paris die Ehre erwiesen, mich zugleich zu besuchen; so behauptete der Herr von Cossigni gegen den Herrn David, daß seine Beobachtung auf der Insul S. Louis von Senegal im Jahr 1738 nicht wahrscheinlich wäre, weil es in dieser Insul niemals so warm sey, als zu Pondicheri, und daß er zu Pondicheri sein Thermometer niemals höher gesehen habe als bey dem Punkt, welchen es zu Paris im Jahr 1738 angezeiget hätte. Er habe es zwar 1737 drey Grade höher beobachtet zu Pondicheri, allein dieses sey während seiner Abwesenheit geschehen, wo er es einem Mönche anvertrauet habe, um die Beobachtungen darauf zu machen. Dann dieser Mönch habe es außen vor ein Fenster, welches in dem untersten Stokwerk wäre, gestellet,

let, da er es selbst allezeit in einem obern Stokwerk, wo keine Sonne hingekommen, beobachtet habe. Er zweifelte also nicht, daß diese drey Grade, welche das Thermometer höher angezeiget, dem verschiedenen Plaz der Aussezung zuzuschreiben seyn.

Der Herr David antwortet ihm, daß er das seinige allezeit in einem obern Stokwerke, wo keine Sonne zukommen konnte, beobachtet habe. Wenn er aber nur die Beobachtung dieses einigen Tages, im Jahr 1738, in seinem Register, welches er darüber gehalten, aufgezeichnet hätte, die eine so außerordentliche Wärme (eine Wärme, die auf meinem Thermometer 29 und ein viertheil Grad ausmacht) angezeiget; so würde er selbst geglaubt haben, daß er sich um zehen Grade betrogen habe. Allein sein Register beweise, daß viele vorhergehende und nachfolgende Tage wenig davon unterschieden seyn, und zu dem besagten Punkte gleichsam stufenweise hinaufsteigen, dahero er auch von der Richtigkeit seiner Beobachtung überzeuget sey. Weil nun der eine sowohl als der andere ihre Thermometer zerbrochen hatten, so konnte ich auch nicht wohl entdeken, ob die Sache ihre vollkommene Richtigkeit habe. Dennoch aber ist es sehr wahrscheinlich, daß das Thermometer des Herrn de Cossigni eine etwas zu starke, und des Herrn David seines, eine etwas zu schwache Abtheilung der Grade hatte.

Man

Man erinnere sich noch, daß der Herr Abt Nollet die innere Weite von keinem seiner Thermometer gemeßen, bis ich im Jahr 1741 meine Art des Meßens offenbaret habe, welche er nachgehends scheinet angenommen zu haben. Dann er konnte sich der Art des Herrn von Reaumur hiezu keinesweges bedienen, weil man sie bey solchen Thermometern, als die seinige sind, keinesweges gebrauchen kan. Daher beschwerten sich auch die Glasblaser, welche ihm und mir die Röhren verkauften, daß ich viel mehrere Schwierigkeiten machte und länger brauchte, als der Herr Abt Nollet, dieselbe auszusuchen, weil ich keine andere kaufen wollte, als solche, die eine wo nicht völlig, doch beynahe gleiche Weite haben, und sie öfters in ihrer Gegenwart gemeßen hatte, da er hingegen, wie sie sagen, sie nur mit den Händen befühlte und sie nach dem Augenschein beurtheilte, welches viel geschwinder geschehen wäre. Da nun die Anzahl der Thermometer, welche er vor dieser Zeit in der Welt ausgestreuet hat, sehr groß ist, so kan er auch vor keines einigen Richtigkeit stehen. Dann gesezt, daß sie auch untereinander bey dem Punkte des Eises, nach seiner Art, welche aber doch, wie ich obenher schon gezeiget habe, von der Art des Herrn von Reaumurs unterschieden seyn muß, übereinkommen: so ist dieses noch lange nicht genug, weil man noch einen entfernten Punkt brauchet, bey welchem sie übereinstimmen müßen, um die Anzahl der

Grade,

Grade, welche zwischen dem einen sowohl als dem andern seyn müßen, bestimmen zu können. Ja was noch mehr: die Eintheilung der Grade des ganzen Instruments muß nach der gefundenen Weite deßelben vorgenommen werden. Nun habe ich aber weder damals noch seit der Zeit einen von seinen Thermometern gesehen, bey welchem er die gefundene Weite scheinet angezeiget, und sich folglich die Mühe genommen zu haben, ihre Weite zu erforschen, noch vielweniger aber, wo er dieser Weite zu folge die Eintheilung selbst vorgenommen hätte; daher können auch diese Thermometer nicht richtig und genau seyn.

Er sagt (p. 484), **daß die erstere Thermometer, welche nach den Grundsäzen des Herrn von Reaumurs sind verfertiget worden, die Hize des kochenden Waßers nicht ausstehen können, weil man zu viel Luft herausgezogen.** Ich machte die erste zu Paris im Jahr 1740 bey dem Herrn Auzou, welche diese Hize ausstunden, und bis dahin ware es, so wie andere, ein allgemeines Vorurtheil bey den Naturforschern, daß der Weingeist die Hize des siedenden Waßers nicht aushalten könne. Folglich hat der Herr Abt Nollet meine Art nur erst seit dieser Zeit, nemlich im Jahr 1741, erlernen können. Also haben alle die Thermometer, welche aus der Hand des Herrn Abt Nollets gekommen und vor dieser Zeit bis zu dem Punkte des siedenden Waßers

sers verfertiget worden sind, diesen Punkt nicht anzeigen können, weil sie ihn nach seiner eigenen Aussage nicht aushalten konnten. Und da ferner alle diejenige, welche er gemacht hat, ohne sie bis auf das siedende Waßer zu richten, nach denen andern, oder nach den Prob-Thermometern des Herrn von Reaumurs, gemacht worden sind, so haben sie alle einerley Fehler gehabt. Hat aber nun diese nicht geringe Menge von Thermometern, welche schon im Jahr 1741, auf einige tausend gerechnet wurde, den Grad des siedenden Waßers nicht anzeigen können, wie kann er denn vorgeben, (p. 814) daß alle **nach des Herrn von Reaumurs Grundsäzen verfertigte Thermometer den Grad der Wärme des kochenden Waßers auf 80 Graden anzeigen?**

Er mag bey dieser Gelegenheit nicht einmal auf diejenige Stelle meiner Schrift vom Jahr 1741, welche ihm dieses widerspricht, antworten, indem ich daselbst behaupte, daß dieser Punkt auf 105 Grade und einen halben gesezet werden müße; noch vielweniger auf die drey Artikel des 399sten Briefes, in den **Anmerkungen über die neuern Schriften** sich einlaßen, wo ich gezeiget habe, daß die erstern Thermometer des Herrn von Reaumur 105 und einen halben Grad in dem siedenden Waßer haben sollten, diejenige, welche eine mit seinem großen Thermometer des Observatorii übereinkommende Abtheilung haben 110 Grad

und

und ein viertheil, und diejenige, die so abgetheilt sind, wie diese, welche man in dem 395sten Brief für die beste hält, und vermuthlich von dem Herrn Nollet verfertiget werden, 115 Grade und einen halben anzeigen müßen. Wäre dann ein Irrthum, von 25 ja wohl gar von 35 Graden in Ansehung dieses Punktes, der noch überdas in den Jahren 1741 und 1742 öffentlich behauptet worden, nicht eine Sache, welche im Stande ist, eine Lehrart über einen Haufen zu werfen, von welcher man doch behauptet, daß sie so sicher sey, daß, wie es (p. 418) heißt, **wenn einmal der Liquor mit einem von diesen Punkten überein kommt, er sodenn auch gewiß mit allen andern übereinstimmet?**

Allein weil es dem Herrn Abt Nollet unmöglich ware, eine so offenbare Sache zu läugnen, hätte es ihm nicht weit beßer angestanden, wann er bey dieser Gelegenheit frey heraus bekannt hätte? Unsre erste Thermometer konnten den Punkt des siedenden Waßers auf ihrem achtzigsten Grade nicht anzeigen, weil sie ihn nicht einmal aushalten konnten, seitdeme man aber das Mittel gefunden hat, sie dahin zu bringen, indem man ihnen Luft genug verschaffet, so darf man sie nur einen Augenblik aufmachen, damit sie also hinreichende Luft bekommen und sie nachgehends hermetisch zuschmelzen, wo sie sodann in dem siedenden Waßer ungefähr 110 Grade bemerken. Es würde

de gewiß jedermann dem Herrn Abt Nollet verbunden gewesen seyn, wenn er ihn wieder aus dem Irrthum gezogen hätte, in welchen er ihn selbst durch sein Vorgeben mit den achzig Graden gestürzet hat, als wodurch nothwendig die ganze Verfertigung dieses Thermometers ungewiß, ja einem, der sich darauf verlaßen wollte, unmöglich werden muß.

Und da der Herr Abt Nollet (p. 810) sagt: weil der Grad der Hize des Waßers, welches man aufsieden läßt, stärker oder schwächer werde, nach dem verschiedenen Stand des Barometers, so zweifle er nicht; es werde der Herr *Delisle* diese Beobachtung nicht aus den Augen sezen, um den Punkt der Nulle auf seinen Thermometern zu bestimmen; so muß man sich billig verwundern, daß er selbst bey dieser Gelegenheit keinen gewißen Stand des Barometers angezeiget und bestimmet hat, bey welchem er den Punkt des siedenden Waßers auf seinen nach den Grundsäzen des Herrn von Reaumurs verfertigten Thermometern bezeichnet. Er hat zwar dieses gethan und (p. 483) einen Stand des Barometers auf 27 Zoll 6 Linien bestimmet, für gewiße aus Queksilber verfertigte Thermometer, welche er, wie er sagt, mit einer langen *Scala* versiehet: aber muß es einem nicht noch wunderbarer vorkommen, daß er in Ansehung der andern wißentlich und mit Vorbedacht nichts gemeldet hat. Ist er nicht,

nicht, da er einige tausend solcher Thermometer in die Welt ausgestreuet hat, für welche er stehen muß, verbunden, eine solche öffentliche Nachricht davon zu geben, besonders, da er es selbst, so wie es auch in der That ist, für unumgänglich nöthig hält, damit man wiße, worauf man sich bey einer solchen Sache zu verlaßen habe.

Das ist aber nicht die einige Nachläßigkeit, welche man in Ansehung dieser Sache dem Herrn Abt Nollet vorwerfen kan. Dann ob er gleich gar wohl eingesehen hat, wie nothwendig ein gewißer Punkt des Barometers festgestellet werden müße, wie unentbehrlich es sey, daß denen Thermometern von Weingeist, ehe man die Versuche in dem siedenden Waßer damit anstellet, Luft genug gelaßen werde und das Waßer selbst sehr stark koche: so hat er dennoch von einer andern hiezu erforderlichen Sache kein Wort gemeldet, nemlich, daß man den ganzen Saft dieser Thermometer in das siedende Waßer tauchen, oder daß wenigstens die Blasen dieses Waßers, den Punkt, welchen man bemerken will, anspühlen müßen. Dann sind die Thermometer groß und sie werden nicht bis zu dem mittelmäßigen in das Waßer gesteket; so kan man sich in Ansehung dieses Punktes des siedenden Waßers, besonders im Winter, um sieben oder acht Grade betrügen. Es ist die Nachläßigkeit in diesem Stüke eben so wichtig, als in dem vorhergehenden.

Da er noch überdas sehr wohl eingesehen hat (p. 816), wie nöthig es sey von den grossen Kugeln der Reaumurischen Thermometer abzuweichen, folglich auch von dem kleinen Maß, womit die innere Weite derselben erforschet wird, eben sowohl als von der Ausrechnung, wodurch man die Ausdehnung des Saftes zu bestimmen bemühet ware, weil solches mit einem vermischten und aus Waßer und Weingeist bestehenden Saft unmöglich richtig genug geschehen, noch mit seinen übrigen Thermometern in eine Uebereinstimmung gebracht werden kan: da er ferner (p. 815.) die Unbequemlichkeit bemerket, welche diese Thermometer deswegen an sich haben, weil man den vierten Theil des Waßers damit vermischet: warum hat er denn nicht bey dieser Gelegenheit gerade heraus gesagt, daß es fernerhin nicht mehr nöthig sey, sich deßelben bey Verfertigung dieser Thermometer zu bedienen.

Dann dieser vierte Theil Waßer tauget zu nichts weiter als nur das Gleichgewicht des Instrumentes beträchtlich zu hindern, den Gang deßelben bey einer sehr großen Kälte in Unordnung zu bringen und wohl gar zu verursachen, daß der Saft gefrieret, ohne auf der andern Seite diesem Instrumente, zu einer Ersezung dieses Schadens, den geringsten Vortheil zu schaffen.

Muß man also nicht schließen, daß der Herr Abt Nollet, weil er eine so nothwendige Verbeße-

beßerung nicht angezeiget, und die, wie oben bereits ist gezeiget worden, ausgelaßene Stüke aus den Augen gesezet, ob er gleich ihre Nothwendigkeit sehr wohl eingesehen hat, das Reaumurische Thermometer als eine alte Mode ansehe, welche durch eine andere, nach einer gewissen bestimmten Zeit, verdränget werden muß, und bey welcher es sich nicht schiket Verbeßerungen anzubringen, welche im Stande wäre sie zu erneueren und zu verewigen.

Dannoch aber dünket es mich, da viele Leute an die Abtheilung dieses Thermometers gewöhnet und damit auch versehen sind, daß es gut wäre, wenn man es im Gebrauch erhalten könnte. Es ist dieses auch gar nicht schwer, wenn man nur auf die Verbeßerungen acht haben will, wovon ich vorhero geredet habe. Dann unterläßt man diesem Instument den vierten Theil Waßer beyzumischen, sezt seine Nulle auf den Punkt des Waßers in dem Eis und den Punkt des siedenden Waßers auf 110 Grade, wenn das Barometer auf 27 Zoll und sechs Linien stehet, so wird die Abtheilung dieses Thermometers ungefähr unter denen, die schon gemacht sind, die Mittelstraße beobachten und das Instrument selbst würde richtig hergestellet und leicht zu machen seyn.

Bishero habe ich die Ehre gehabt, Mein Herr, Ihnen zu zeigen, wie die verschiedene Punkte des Thermometers richtig und leicht kön-

können gefunden werden, wobey ich zugleich Gelegenheit gefunden, von der Entstehung des Eises und der Natur der Kälte zu reden, welches ich, wie glaube, deutlich genug erkläret habe. Nun ist nur noch übrig, daß ich etwas von der Einrichtung oder von der Ordnung der Grade des Thermometers gedenke. Dann ein anderes ist die richtige Abtheilung der Grade dieses Instrumentes, und ein anderes die wohl oder übel getroffene Einrichtung dieser Abtheilung, weil das Instrument richtig aber doch übel eingerichtet, und schön eingerichtet, dabey aber unrichtig seyn kan.

Das Thermometer ist nach meinen Begriffen ein Instrument, welches bestimmet ist, die Grade der Wärme und Kälte anzuzeigen. Dann ich glaube, daß ich mich hier der Sprache des gemeinen Mannes bedienen darf, ohne die physicalischere Ausdrücke des Herrn Abt Nollets zu gebrauchen (p. 607), weil auf diese Art keine Kälte in der Natur wäre, und dasjenige, was alle Völker, so die Welt seit ihrem Anfange bewohnen, Kälte genennet und damit ein von der Wärme verschiedenes Wesen bezeichnet haben, in dieser erhabenen Sprache nichts anders als die Abnahme einiger Grade der Wärme seyn würde.

Der Herr Abt Nollet gründet zwar seine Art zu reden auf das Ansehen aller Naturforscher (p. 492) den Herrn Muschenbroeck und

Herrn de la Hire ausgenommen, (p. 543 seqq.) von welchen doch wie er sagt, Herr Muschenbroek zugibt, daß die Kälte kein besonderes Wesen, sondern nur eine Beraubung der Wärme sey, ob er gleich davor halte, daß die Ursache des Gefrierens für eine Materie geachtet werden könne.

Allein bey allen denen Naturforschern, welche selbst Thermometer verfertiget oder nur davon geschrieben haben, finde ich nur drey oder viere, nemlich die Herren Halley, Boyle, Sgravesende und Fowler, welche gut gefunden haben, den Anfang ihrer Abtheilung der Grade des Thermometers, so wie es seyn sollte, zu machen. Ich sage nicht, wie es seyn sollte, nach den materialischen Begriffen der Wärme und der Kälte, die ich annehme, sondern nur, wie es seyn sollte, nach den Folgen dieses Sazes, nach welchem man nur die Wärme für ein materialisches Element auf der Erde hält, hingegen aus der Kälte ein nichts oder eine blose Beraubung der Wärme machen will. Alle übrige Naturforscher, deren eine große Anzahl sind, scheinen sich in diesem Falle von den natürlichen Folgen ihres angenommenen Sazes entfernet zu haben.

Es ware auch in der That denen geschicktesten unter ihnen unmöglich, den Anfang oder das Ende ihrer Wärme zu bestimmen, um entweder bey dem einen oder bey dem

andern

andern die Abtheilung des Thermometers anzufangen. Der Herr Abt Nollet scheinet selbst diese Unmöglichkeit (p. 609) einzugestehen. Hingegen ware es ihnen leicht, das Mittel zwischen diesen beyden zu erfahren, weil man nach dem Zeugnis des Herrn Abt Nollets (p. 604) **die mittelmäßige Wärme, so man an der Oberfläche des Erdbodens empfindet, auch in denen tieffsten unterirrdischen Orten wieder verspühret.** Es scheinet also, daß sie zu diesem Anfang ihrer Abtheilung keinen andern Punkt in ihrer angenommenen Meynung finden konnten als diese mitlere Wärme, welche man auf der ganzen Erde antrift. Dann weil diese bekannt ist und das Mittel hält zwischen zwey unausmeßlichen Größen, so ware hier auch der Punkt des Gleichgewichtes, welcher alleine genau die Menge der Grade der geringeren oder größeren Wärme ihrer Abtheilung anzeigen oder den Anfang derselben bestimmen konnte.

Dieser Anfang würde um so vielmehr an seinem rechten Plaz gemacht worden seyn, weil er sodann mit der Empfindung und denen Begriffen, welche der gemeine Mann von der Wärme und Kälte hat, die man in den gemäßigten Weltgegenden empfindet, würde übereingestimmet haben, und für welche man doch allerdings einige Achtung hätte haben sollen, weil eben der gemeine Mann die meiste Thermometer kaufet. Man hätte in solchem Fall

die Grade, auf der rechten Seite des Bret-leins, auf welchem das Instrument angeheftet ist, die Grade der Vermehrung und der Verminderung der Wärme, die auf der linken Seite aber die Grade der Wärme und der Kälte nennen und also der Achtung gemäs, welche man der Sprache der Herren Naturforscher und des gemeinen Manns schuldig ist, reden können.

Allein fast alle diese Herren, welche selbst Thermometer gemacht oder ihre Verfertigung gezeiget haben, wollten es beßer machen, und zwar, wann man es sagen darf, ohne den geringsten wahrscheinlichen Grund zu haben. Ihre eigene Uneinigkeit in diesem Anfange der Abtheilung kan schon einigen Beweis hievon geben. Dann Fahrenheit, welcher, wie man weiß, dem Boerhave folgte, bildete sich ein, daß er den Anfang der Wärme auf dem Erdboden gefunden und sezte ihn auf den Punkt, der mit Salmiac herfürgebrachten Gefrierung, welche nach meinem Thermometer 25 Grade und ein viertheil Kälte ausmacht. Herr Amontons hat die Freyheit gelaßen, diesen Anfang bis auf die Nulle seines Thermometers herabzusezen, welche mit 278 und drey viertheil Graden der Kälte des meinigen übereinstimmt. Herr von Reaumur hat die Abtheilung des seinigen ungefähr bey zehen und drey viertheil Graden des meinigen angefangen, und die obern Grade, die Grade der Verdünnung,

und die untern die Grade der Verdikung genennet (*), gleich als ob alle irrdische Corper allezeit durch die Kälte verdiket und durch die Wärme verdünnet werden müßten. Ich glaube, das Thermometer, welches von der Art der Nolletischen ware, kan das Gegentheil hievon darthun, da es im Jahr 1737 durch den 43sten Grad der Kälte nach meinem Thermometer zu Tornea so sehr verdünnet wurde, daß es davon geborsten ist. Der Herr de l'Isle hingegen, gleich als ob man für natürlich halten könnte, daß man allezeit in jedem Jahre und in den gemäßigten Weltgegenden, dreymal mehr Verdünnung als Verdikung in der Luft oder in andern Dingen verspührte, hat die Abtheilung seines Thermometers bey dem Punkte des siedenden Waßers herabwärts zu zählen angefangen und seine Grade, Grade der Verdikung genennet. Herr Haubskée hat eben dieses gethan, doch hat er seine Grade nicht eher herabwärts zu zählen angefangen, als bey dem siebenzehenden Grade und drey viertheil der Wärme meines Thermometers. Herr Newton fangt beynahe bey eben diesem Punkte an wie der Herr von Reaumur, doch sezt er ohne Grund voraus, daß der Punkt der Gefrierung das gemeinschaftliche Mittel sey der Wär-

(*) Man kan hievon die kleine Schrift p. 10 nachsehen, welche den Titel hat e Explication des principes etablis par Mr. de Reaumur, pour la construction des Thermometres &c.

me und der Kälte auf dem ganzen Erdboden. Dieser Saz ist so ungegründet, daß, wann er seine Richtigkeit hätte, die Helfte der Oberfläche unsrer Erde ein halbes Jahr hindurch wohl 100 Schuhe tief gefroren seyn müßte, wie solches gar leicht kan gezeiget werden. Man kan unmöglich, um diese wunderliche und einander entgegenlaufende Einrichtung zu entschuldigen, sagen, daß es leichter sey die Grade des Instrumentes von einem bestimmten und leicht zu findenden Punkte an abzutheilen, und hernach diese Eintheilung auf dieser oder jener Seite fortzusezen. Dann es ist wohl kein großer Unterscheid darinnen zu bemerken, man mag diese oder jene Art erwählen, und überdas soll man sich auch allezeit in der Benennung und Ordnung der Grade des Thermometers, wie bey allen andern Sachen, nach der Gewohnheit und nach der Vernunft richten. Dann weil die Vernunft, wenn man auch nur das einige Element der Wärme annehmen will, uns schon sagt und befiehlt, daß wir die Grade des Thermometers, **Grade der Wärme** nennen, und die Theilung derselben bey dem mitleren Punkt dieses einigen Elements auf dem ganzen Erdboden anfangen sollen; weil ferner, wenn man annimmt, daß die Kälte und die Wärme zwey verschiedene Elemente sind, die Gewohnheit und die Vernunft nothwendig erheischen, das man die Grade des einen und des andern **Grade der Wärme** und **Grade der Kälte** heiße, die Vernunft auch erfordert, daß man die Abtheilung

an=

anfange bey dem mittelsten Punkt der Wirkungen des einen sowohl als des andern auf dem ganzen Erdboden, welches eben der Punkt ist wie bey der ersteren Meynung; so glaube ich, daß diese leztere Art die Grade zu benennen und zu zählen, welche ich daher auch angenommen habe, die natürlichste und vernünftigste ist.

Dieses habe ich dahero auch zuerst für meine Schuldigkeit erachtet, im Jahr 1740 mit meinen Thermometern vorzunehmen, indem ich zu diesem Ende den Punkt des Loches in der Mauer des Kellers des Observatorii erwählte, mit dem Entschluß, ihn nachgehends ein wenig höher oder niedriger zu sezen, wenn man nach genugsamen Versuchen, welche auf das sorgfältigste und mit guten Instrumenten in den tiefsten unterirrdischen Oertern gemacht worden sind, Ursache finden würde, eine solche Verbesserung vorzunehmen. Allein, da ich diesen Punkt zu Ardingheim bey Calais und nachgehends zu Salelle bey Carcassona bewährt gefunden und bis jezo noch nichts sicherers entdeket habe, so habe ich geglaubt Grund genug zu haben, diesen Punkt, so wie ich seit einiger Zeit auf meinen Thermometern gethan habe, das mittelmäßige der Erdkugel, nennen zu können. Er würde aber dennoch eine Verbeßerung leiden müßen, wenn man Ursache hiezu finden sollte, durch eine größere Anzahl von Versuchen, welche man mit der gehörigen Aufmerksamkeit und mit guten Instrumenten gemacht hätte.

In diesem Fall aber halte ich dafür, daß diese Verbeßerung sich niemals weiter, als auf einen viertheil Grad über oder unter das besagte mittelmäßige erstreken würde, ja was noch mehr: die verbeßerte Thermometer würden mit den vorhergehenden gar leicht in eine Uebereinstimmung zu bringen seyn, weil die Richtigkeit der leztern durch zwey feste Punkte bestimmet ist, nemlich durch das siedende Waßer und durch das Waßer in dem Eis. Wenn es also z. E. nöthig wäre, den Punkt des mittelmäßigen ungefähr den zehenden Theil eines Grades höher zu sezen, so müßte man alsdann den Ganzen Raum zwischen dem siedenden Wasser und dem Waßer in dem Eis in 110 und einen halben Grad theilen, damit man also beständig die Nulle auf dem Punkte des mittelmäßigen behielte, die 100 Grade aber von der Nulle an bis zu dem Punkte des siedenden Waßers, so wie es die Einrichtung des Instrumentes zu erfordern scheinet.

Ich habe die Ehre auf das vollkommenste zu seyn.

Mein Herr

Dero gehorsamster und ergebenster
Diener

der Verfaßer der Methode eines Universal-Thermometers.

Erklä-

Erklärung der Verbeßerungs-Tabellen, von den Wirkungen der Wärme und der Kälte in dem Barometer. Durch eben diesen Verfaßer (15).

Ich seze voraus, daß die Barometer, welche man beobachten will, wohl beschaffen seyn, und ein Thermometer von Weingeist, welches nach meiner Art eingetheilet ist, zur Seite haben.

Ich habe geglaubet, daß ich bey dem Punkte des mittelmäßigen der Erdkugel den Anfang mit der Verbeßerung der Wirkungen der Wär-

(15) Diese kleine Abhandlung nebst der darauf folgenden Tabelle und Berechnung dienet für diejenige, welche solche Beobachtungen mit ihrem Barometer anzustellen Lust haben, die von der Wärme und Kälte der Luft unabhängig sind und durch dieselbe nicht verändert werden. Das Barometer ist zwar von dem Thermometer verschieden, und soll nur die Schwere der Luft anzeigen, dannoch aber findet sich bey demselben etwas dem Thermometer ähnliches, nemlich, daß der Mercurius in der Röhre deßelben etwas ausgedehnet oder zusammengezogen wird, wenn eine Veränderung in Ansehung der Wärme oder der Kälte der Luft vorgehet, so, daß daßelbe entweder höher oder tiefer stehet, als es vermöge der eigentlichen und bestimmten Schwere der Luft seyn sollte. Dieser Unrichtigkeit soll nun die hinten beygefügte

Wärme und der Kälte in dem Barometer machen müße; weil dieser Punkt mir die richtigen Gränzen von dem einen sowohl als von dem andern zu seyn scheinet, so wie ich vorhero gezeiget habe.

Weil der Unterscheid, wenn der Mercur des Barometers einen Zoll höher oder niedriger stehet, in Ansehung der Wirkung, welche die Kälte oder die Wärme darauf thun können, nur sehr geringe ist, das Barometer auf dem Erdboden auch nicht wohl höher als 29 Zoll, auch nicht tiefer als 14 Zoll gesehen werden kan, so habe ich meine Berechnungen blos auf diesen Raum eingeschränket und für jeden Zoll eine Verbeßerungs-Tabelle gemacht, so wie

---

fügte Tabelle abhelfen, indem sie zeiget, wie viel man, je nachdem das Thermometer Wärme oder Kälte anzeiget, von dem jedesmaligen Stand des Barometers abzuziehen oder zu demselben noch hinzuzusezen habe, folglich wie viel man ihm nehmen oder geben müße, das durch die Wärme oder Kälte der Luft demselben zugesezet oder entzogen worden ist. Hierzu aber ist, wie der Herr Verfaßer selbst erinnert, ein Thermometer unentbehrlich, welches nach seiner Art verfertiget worden ist, da die Tabelle blos auf daßelbe gerichtet ist und sich beziehet? sodann aber auch, daß das Barometer nicht nur gut, sondern auch die ganze Säule des Mercurs in Zolle und Linien abgetheilet werde und zwar von demjenigen Punkte an, wo der Mercur in der Röhre mit dem Mercur in dem Kölblein in gleicher Linie stehet.

wie sich mein Thermometer von fünf zu fünf Graden erhöhet oder erniedriget. Auf diese Art ist es demjenigen, welcher die Beobachtung anstellet, sehr leicht alle die übrige Fälle, wenn es nöthig seyn sollte, zu bestimmen.

Diese Berechnungen aber sind gegründet,

1) auf die Erfahrung, welche ich mit einer ungefähr mittelmäßigen Verdikung des Mercurs in einem Thermometer gemacht habe, dessen Kugel 12 bis 13 Linien im Durchschnitt, die Röhre aber ungefähr 12 Zoll in der Länge hatte. Dieses Thermometer ware auf meine zwey Punkte des siedenden Waßers und des mittelmäßigen gerichtet. Da ich hierauf die ganze Massa des Mercurs bey dem Punkte deß siedenden Waßers in 7400 Theile oder Grade abgetheilet hatte, so fande ich 7300 solcher Theile bey dem Punkte des mittelmäßigen.

2) Ich habe bey diesen Berechnungen acht gehabt auf den verschiedenen Gang eines Thermometers von Mercur und eines Thermometers von Weingeist, weil der Mercur sich gewißer maßen in der Kälte mehr verdiket als der Weingeist. Weil ich aber oben von dieser Verschiedenheit schon Meldung gethan habe, so will ich hier nichts weiters davon gedenken.

Damit ich aber auch ein Exempel von der Art, wie ich diese Tabellen berechnet habe, gebe,

be, so kan man dieses merken. Zuerst habe ich die Quecksilber-Säule allein betrachtet, welche über die Waßerebene (niveau) Linie des Barometers, die beynahe ganz unten ist, hinaufsteiget, sowohl als die ganze Massa des Mercurs in dem erstgemeldeten Thermometer, und gefunden, daß es gut wäre, um das Barometer genau auf oben besagte waßerebene Linie richten zu können, wenn es auf einem kleinen Absaz, welchen man erhöhen und erniedrigen könnte, ruhen würde. Dann wann der Mercur in der Röhre herabfällt, so steiget der in der Flasche, und wenn der Mercur in der Röhre steigt, so fällt der, so in der Flasche ist. Will man also das Barometer genau auf die waßerebene Linie sezen, so muß nothwendig eines von beyden entweder die Scala oder das Barometer beweglich seyn (16).

Hierauf sezte ich voraus, daß das Barometer in einer Luft sich befindet, wo das Thermometer auf dem mittelmäßigen stehet, und daß die Quecksilber-Säule sich auf 29 Zoll erhalte, welche über die waßerebene Linie 348 Linien

(16) Es ist zwar gut, wenn eines von diesen beyden beweglich ist, um das Barometer sogleich wieder auf die waßerebene Linie richten zu können. Doch ist es auch entbehrlich, wenn man das Verhältnis des Kölbgens zu der Röhre des Barometers weiß. Dann ist z. E. die Fläche des Kölbgens zu der Röhre

Linien ausmachen, und sagte: wenn diese Säule von 348 Linien, ganz in das siedende Waßer gestekt und so lange darinnen gelaßen würde, daß sie ihren Grad der Hize erlangen könnte, so würde sie alsdann (wenigstens würde nicht viel daran fehlen), eben diese scheinbare Ausdehnung in Ansehung ihrer Massa haben, als in dem obgemeldeten Thermometer von Mercur. Ist nun dieses Thermometer bey dem mittelmäßigen auf 7300 und in dem siedenden Waßer auf 7400 Graden gewesen; so würde diese Säule in eben dem Waßer 352 Linien 8 Punkte 26 Minuten, weniger $\frac{3}{73}$ Minuten, welche ich aber fahren laße, hoch seyn, weil dieses das gleiche Verhältnis ist.

Da mir nun dieses 4 Linien, 8 Punkte 26 Minuten für die 100 Grade der Ausdehnung meines Thermometers von Mercur, welche ich von dem mittelmäßigen bis zu dem siedenden Waßer zähle, gibt, so bekomme ich also auch für die erstern 25 Grade der Wärme meines Thermometers von Weingeist 16 Punk-

re wie 6 zu 1, so werden in der Röhre 6 Linien fallen oder der Mercurius so viel tiefer stehen müssen, bis die waßerebene Linie eine Linie höher zu stehen kommt u. s. w. Es laßt sich also mit leichter Mühe die Ausrechnung selbst in diesem Falle jederzeit machen.

Punkten, 56 Minuten, 6 Secunden, weil diese mit den 30 ersteren meines gleich eingetheilten Thermometers von Weingeist übereinkommen.

Dieses Verfahren habe ich beobachtet um die Verbeßerung zu bestimmen bey dem ersteren Fall der ersten Tabelle, welche mir hernach gedienet hat, alle übrige Fälle dieser Tabelle zu bestimmen.

Was die andere Tabelle anbetrift, wo ich das Barometer auf 28 Zoll angenommen habe, welche 336 Linien machen, und wo also die Massa des Mercurs um 12 Linien verringert worden ist, so hat die Scala auch gehörig verändert werden müßen, so, daß die Verbesserung des ersten Falls der 25 Grade der Wärme meines Thermometers von Weingeist nur 16 Punkte, 20 Minuten und 40 Secunden beträgt u. s. f.

Von dem Barometer, was sowohl die Verfertigung als auch den Gebrauch deßelben betrift.

Das Barometer hat seinen Namen von βάρος die Schwere und μέτρον das Maß, und ist nichts anders als eine von Luft leere gläserne Röhre, welche an dem einen Ende zugeschmolzen ist, und eine Quecksilber-Säule in sich hält, welche in Ansehung ihrer Schwere das Gleichgewicht hält mit der Atmosphäre, hiedurch aber geschikt gemachet wird, daß man die Schwere der Luft damit meßen kan.

Man hat die Entdekung oder Erfindung deßelben einem Versuche zu danken, welchen der Mathematicus des Großherzogs von Toscana Toricelli im Jahr 1643 gemacht hat, und welcher ein Jahr hernach von dem Herrn Pascal nachgemacht worden, der in einem Alter von drey und zwanzig Jahren seine neue Versuche über den luftleeren Raum herausgabe. Es scheinet zwar, daß Toricelli einen

Vorgänger an dem Descartes in der sinnreichen Erklärung des Barometers gehabt habe: allein die Versuche, welche Toricelli angestellet, haben ihn in Ansehung dieser Materie so berühmt gemacht, daß er allezeit vor den Erfinder ist gehalten worden. Man kan hievon mit mehrerem des Herrn Montucla Histoire des Mathem. Tome II. p. 282. nachsehen.

Man hat verschiedene Arten von Barometern gemacht, mit einem Rad, gebogene, doppelte, conische; allein wenn das einfache Barometer gut gemacht ist, so ist es unstreitig das beste und sicherste, nach dem einmüthigen Geständnis der geschicktesten Naturlehrer. Eben daher glaube ich, daß meine Schuldigkeit erfordere, nur von diesem allein in gegenwärtiger Abhandlung zu reden. Die Schriftsteller, welche man nachlesen kan, wenn man umständlichere Nachrichten von den Barometern zu haben verlanget, sind Mariotte in seinem Essai sur la nature de l'air: Muschenbroek in seinem Essai de Physique, die Encyclopedie Tome II pag. 77. und Nollet Leçons de Physique (*).

Unter allen Schriften aber, welche über diese Materie zu Vorschein gekommen sind, kenne

(*) Unter den Deutschen handelt insonderheit von dem Barometer und deßen Einrichtung und Arten, Wolf im 2. Theil der Versuche im 3. Capitel und Leupold im 2. und 3. Cap. des 2. Theils seines Theatri staticae universalis.

kenne ich keine, welche vollständiger, sinnreicher und beßer abgefaßet wäre, als eine geschriebene und noch ungedrukte Abhandlung eines Bürgers von Genf I. A. de Luc über die Atmosphäre und die Barometer. Diese würde mir im Jahr 1762 auf Befehl der Academie zugestellet, um sie zu untersuchen. Alle bey Versuchen nothwendige und nur immer mögliche Scharfsinnigkeit und Richtigkeit ist hier mit so vielem Verstand und Einsicht verbunden worden, als man wünschen kan und als erfordert wird, die artigsten Folgen daraus herzuleiten. Ich will hier nur einen kleinen Abris und Vorschmak geben, das umständliche, die Beweise, die Versuche und Erklärungen aber, wird man in dem Buche selbst, welches bereits unter der Preße ist, nachsehen müßen.

Ob gleich verschiedene Barometer auf einerley Art verfertiget worden sind, so halten sie sich doch nicht in einerley Höhe, woferne man nicht das Quecksilber in der Röhre selbst hat sieden laßen. Die Luft, welche sich an den Seiten der Röhre angeleget, und welche aus dem Quecksilber heraussteiget, verursachet eine beträchtliche Ungleichheit, welche nach Masgebung der Witterungen, der Oerter und anderer Umstände sich verändert. Dann die Wärme wirket auf die Luft, welche man in dem Quecksilber gelaßen hat, und bringet auch geringere oder größere Ungleichheiten herfür. Daher siehet man öfters, daß einige Barometer, die von der Luft nicht wohl gereiniget

sind, wegen der Hize hinaufsteigen, da unterdeßen andere herabfallen.

Wenn man das Quecksilber will sieden lassen, so muß man die Röhre also füllen, daß, wenn das zugeschmolzene Ende derselben unten stehet, oben noch ein Raum von ungefähr zwey Zoll leer bleibe, weil sonst bey dem Aufwallen etwas von dem Quecksilber herauslaufen würde. Hierauf muß man das Ende der Röhre nach und nach denen Kohlen näher bringen. Wann das Quecksilber sich zu erhizen anfangt, so erscheinen die Seiten der Röhre ganz voll von Luftbläsgen, welche, wenn sie sich hernach vereinigen, groß genug werden um in die Höge hinauf zu steigen. Allein sie verschwinden fast gänzlich wieder, wenn sie an den Ort kommen, der noch nicht erhizet ist, und man kommt nur nach einer öftern und häufig geschehenen Aufsteigung derselben damit zu Stande, daß sie sich völlig aus dem Quecksilber herausbegeben. Wenn das Aufwallen anfangt, so scheinet das Quecksilber in einer lebhaften Bewegung, und es möchte das Ansehen haben, daß es die Röhre zerbrechen werde: allein man muß dieses Sieden in der ganzen Länge der Röhre zu unterhalten suchen, indem man sie nach und nach völlig in die Flamme bringet. Man bemerket auch bisweilen dabey, daß Wasserbläsgen mit der Luft in der Gestalt eines Schaums aufsteigen, wie auch daß die inwendige Seite einiger Röhren dunkel wird, andere aber viel heller werden.

Mit

Mit den Barometern, welche unten ein Kölblein haben und welche bishero gebräuchlich waren, ist es fast unmöglich die Wirkung der Wärme zu meßen und von der Wirkung der Schwere der Luft abzusondern. Daher ist der Herr de Luc bewogen worden, die Kölblein völlig abzuschaffen, wie wir gleich hernach sagen werden.

Die andere Unbequemlichkeit der Kölblein ist die Figur, welche die Oberfläche des Quecksilbers darinnen annimmt, die bald rund ausgebogen (convexe) bald rund ausgehöhlt (concave) ist, nach der Figur des Kölbleins und der Beschaffenheit des Glases, welches auf das Quecksilber wirket. Diese Unrichtigkeit machet, daß man die Oberfläche des Quecksilbers sehr schwer bestimmen kan, welche sich noch über dieses verändert, je nachdem das Kölblein mehr oder weniger angefüllet ist, woraus hernachmalen in Ansehung der Höhe des Quecksilbers Ungleichheiten entstehen, welche man nicht in die Rechnung zu bringen im Stande ist.

Die dritte Unbequemlichkeit der Kölblein bey den Barometern ist der höhere oder niedrigere Stand des Quecksilbers in dem Kölblein. Wenn diese Veränderung nicht merklich seyn solle, so muß das Kölblein von einem sehr viel größeren Diameter seyn als die Röhre; allein der gröste Theil der Barometer hat diesen Fehler an sich. Diejenige, welche dieselbe verfertigen, verkaufen öffentlich solche Barometer theuer genug, welche sie für sehr gut ausge-

ben, ungeachtet in dem Kölblein mit genauer Noth die Oberfläche von Quecksilber 7 bis 8 Linien breit ist. Daher sinkt diese Oberfläche beträchtlich, wenn das Quecksilber in der Röhre steiget und der Gang des Barometers wird viel geringer. Ja wenn auch diese Kölblein noch so breit und weit sind, so bleibet doch noch ein Theil von dieser Unbequemlichkeit übrig. Will man dieser bey den gemeinen Barometern abhelfen, so muß man auf daß Quecksilber des Kölbleins einen kleinen leichten Cörper legen, deßen oberste Spize auf eine besonders dazu gemachte Abtheilung weiset und dadurch die Bewegung des Quecksilbers in dem Kölblein anzeiget, welche unter einem bestimmten und angemerkten Grad vorgehet. Dieses sezet oder rechnet man hernach zu der Höhe des Quecksilbers in der Röhre noch über diese Linie, um die Entfernung der beyden Oberflächen zu finden, welches die verlangte Größe und die wahre Höhe des Barometers ist.

Zu dem, was ich schon gesagt habe, will ich nur noch hinzu sezen, daß das Quecksilber, welches man hiezu gebrauchen will, sehr rein und aus dem Zinnober abgetrieben seyn muß. Die Röhre selbst muß inwendig mit rectificirtem Weingeist wohl gereiniget und mit einem von Leder gemachten Stempel sauber ausgepuzt werden, um die Luft herauszubringen, welche sich an den Seiten des Glases anhänget: hierauf muß sie bey dem Feuer getroknet und erwärmet werden, ehe man das Quecksilber hinein

einbringt. Ein Barometer, welches mit solcher Behutsamkeit gemacht worden, darf nicht leuchtend seyn, dann ich halte für ausgemacht und gewiß, daß etwas weniges Luft erfordert werde, wenn das elektrische Licht zum Vorschein kommen solle. Herr Wilson, ein berühmter Naturforscher in London, hat mir Versuche gezeiget, welche offenbar gegen die gemeine Meynung beweisen, daß ein vortrefliches Barometer, welches nicht leuchtend ist, leuchtend werden kan, wenn man nur einen kleinen Theil Luft hineinläßet.

In einem Barometer, welches man erst hat sieden laßen, bleibet das Quecksilber anfänglich noch viel über der Höhe stehen, in welcher es die Schwere der Atmosphäre erhalten kan, und dieses geschiehet durch die Anziehende Kraft des Glases. Diese Anhängung aber läßet nach, so bald man das Barometer geschüttelt und die Säule hiedurch herunter gebracht hat, weil ein wenig Luft aus dem Quecksilber heraussteiget, und je mehr das Quecksilber herab fället, desto mehr Luft macht sich daraus los: daher man auch genöthiget ist, die Barometer von Zeit zu Zeit von neuem sieden zu laßen.

Die Röhren, deren innere Weite oder Diameter zu klein sind, laßen das Quecksilber nicht so hoch steigen als die andere. Wenn der obere Theil der Röhre weiter ist, als der übrige Theil der Länge derselben, so steiget das Quecksilber darinnen auch höher. Wenn die obere Fläche des Quecksilbers den Gipfel der Röhre bis auf

2 oder 3 Linien nahe kommt, so steiget das Quecksilber eine halbe Linie höher, ohne daß die Schwere der Luft einigen Theil daran hat. Es ist dieses nichts, als eine Wirkung der anziehenden Kraft des Glases, welche man sorgfältig vermeiden, und eben daher zwey Zoll in der Röhre über der Quecksilber-Säule frey und leer laßen muß.

Aus diesen und noch viel andern Gründen, welche die Erfahrung dem Herrn de Luc an die Hand gegeben hat, schließet er, daß ein gutes Barometer aus einer einigen Röhre bestehen muß, welche an ihrem Ende gekrümmet und in Ansehung beyder Aerme der Röhre von gleicher Weite seyn solle. Man wird in seinem Werke eine umständlichere Nachricht antreffen von den Mitteln, wie und auf was für Art und Weise man dazu gelangen könne, und es ist uns genug, daß wir hier die wichtigste Regeln der Behutsamkeit angezeiget haben, welche erfordert werden, wenn man ein vortrefliches Barometer verfertigen und erhalten will.

Zu einem also verfertigten Barometer werden zwey Scalae oder Maaßstäbe erfordert, zu einem jeden Arm der Röhre einer. Die Eintheilung für den längern Arm derselben ist so eingerichtet, daß sie hinauf steiget, die andere aber daß sie herabzählet. Die eine sowohl als die andere fangen von einem bestimmten Punkte, an, den man nach Belieben gegen die Mitte der Röhre sezen kan. Will man nun die Höhe des Barometers wißen, so muß man die

zwey Zahlen zählen, um die Entfernung der beyden Oberflächen zu erhalten.

Man muß dahero wohl darauf sehen, daß die Röhre eines Barometers von gleichem Diameter sey: das wesentlichste Stük aber bestehet darinnen, daß alle Abtheilungen, welche bey dem großen und kleinen Arm der Röhre einander gerade gegenüber stehen, von gleicher Größe seyen. Ich muß aber hiebey noch melden, wie es Herr de Luc machet, um eine kleine Röhre für die große zu suchen.

Nachdem er eine große Röhre ausgesuchet, so sezet er den Punkt der Nulle auf 22 Zoll von dem obersten Ende an gerechnet. Er bringt in die Röhre ein kleines Zäpfgen von Gork, welches an einem Bindfaden angemacht ist, damit er es zurücke ziehen könne. Dieses Zäpfgen stoßet er mit einem eisernen Drat fort, bis zu dem Punkt, der zu der Nulle bestimmet ist Hierauf gießt er an dem entgegen gesezten Ende der Röhre zwey oder mehr Theile Quecksilber von gleichem und bekanntem Gewichte hinein, so daß sie in der Röhre einen Raum von 8 Zollen einnehmen können. Er beobachtet sodann, ob ein jeder besonders hineingebrachter Theil einerley Raum einnehme, und wenn dieses nicht ist, so bemerket er die Verschiedenheiten, welche nicht groß seyn können, wenn die Röhre wohl ausgesucht ist. Er suchet hernach eine andere Röhre, wo eine gleiche Menge Quecksilber eine gleiche Länge ausmachet. Damit er aber dieses leichter erhalten möge, so bedienet

er sich langer Röhren, in welche er ein Zäpfgen von Gork steket, welches er mit einem eisernen Drat hinabstoßet, und vermittelst eines subtilen Bindfadens wieder zurück ziehet, bis er einen Punkt gefunden, wo die ganze Massa des Queksilbers, welches dem Zäpfgen nachlauft die gehörige Länge einnimmt. Wenn er diesen Punkt für das ganze gefunden, so meßet er die Theile besonders, und fähret mit dieser Verrichtung fort, bis er einen Theil der Röhre gefunden hat, wo alles gleich ist mit derjenigen, welche den großen Arm des Barometers ausmachen und mit ihr übereinstimmen solle. Hierauf schneidet man die Röhre ab bey den zwey äussersten Enden der Queksilber-Säule welche dazu gedienet hat sie zu meßen, wenn es aber einige Ungleichheiten gibt, so schneidet man sie dergestalt ab, daß die mit einander zutreffende Diameter in den zwey Aermen gleich werden.

Das Barometer, welches mit einer krumm gebogenen Röhre nach der bereits gemeldeten Art gemacht worden, muß zur Hälfte in ein tännenes Brettlein eingefüget werden. Man macht zu diesem Ende eine viereckigte Rinne mit einem Leisten-Hobel, damit das Papier, mit welchem es überzogen werden solle, und die Theilung, welche auf demselben bemerket wird, unmittelbar an die Röhre sich anlege. Auf diese Rinne leget man nun dieses Papier, bestreichet daßelbe mit Leim und sezet die Röhre auf dieses Papier, so wird daßelbe in die Fuge oder

Rinne

Rinne hineingedruckt, und ligt sodann genau an der Röhre an.

Das Barometer, welches man bey sich tragen kan und welches der Herr de Luc beschreibet, hat zwey Aerme, der eine ist 34 Zoll und der andere 8 Zoll lang. Es ist in zwey Stüke getheilt, welche mit einander Gemeinschaft haben vermitelst eines Hahnen, der bestimmet ist, das Queksilber in dem Barometer zu erhalten, wenn man es von einem Ort zu dem andern tragen will. Der Hahn ist von Elfenbein, der Schlüßel aber ist von dem dichtesten und sehr leicht zusammen zu drückenden Gork gemacht. Dieser wird rings herum mit einer subtilen Feile rund gemacht und der Diameter deßelben ist eine Linie größer als das Loch, in welches er hineingehen soll. Mitten durch den Gork gehet ein sehr sauberes Loch, durch welches das Quekſilber durchkommen kan. Es läßt sich dieses Loch erstlich durch einen Bohrer, hernach durch eine runde Feile machen, inwendig aber wird es hernach mit einem kleinem Stük von einer Schreibfederröhre versehen. Diese Federröhre zeiget sich, wenn man will, den zwey Löchern gerade gegenüber, welche man in dem Gehäus des Hahnen angebracht hat, damit man die Gemeinschaft zwischen den zwey Röhren des Barometers eröfnen kan. Will man dieselbe aber verhindern oder versperren, so drehet man den Schlüßel des Hahnen um, wo sodann der Gork die zwey Röhren genau verschließet, wovon die eine alles Quekſilber in

sich

sich faßet, und die andere daßelbe erst während dem Versuche erhält. Wenn man die zwey gläserne Röhren in das Gehäus des Hahnen hinein steken will, so muß man sie mit einer Blase überziehen, welche mit Hausenblasen angeleimet worden, hiedurch paßen sie genau auf einander, und laßen kein Quecksilber durchlaufen.

Dieser Barometer, welche man so einrichten will, daß man sie allenthalben mit sich hintragen kan, erfordern eine ganz ungemein große Vorsichtigkeit, wie solches der Herr de Luc in seiner Schrift umständlich beschrieben hat und wovon wir jezt etwas angezeiget haben. Sie laßen auch mit der Zeit Luft hinein, und müßen von Zeit zu Zeit mit solchen Barometern, die ruhig an einem Orte stehen bleiben, verglichen werden; ja öfters ist man sogar genöthiget das Quecksilber von neuem zu sieden.

Es muß auch dabey beobachtet werden, daß man die Barometer recht gerade hänge, sie vor der Sonne bewahre, und ein Thermometer darneben habe, deßen Kugel nicht größer sey als die Röhre des Barometers. Endlich hat der Herr de Luc auch gefunden, daß es möglich sey, wenn man mit gehöriger Vorsicht zu Werke gienge, alle Arten von Höhen, große oder kleine, ohne sich um mehr als 4 oder 5 Schuhe zu irren, zu meßen, welches er durch mehr als vierhundert Versuche erfahren, welche er längs dem Berge Saleve bey Genf auf einer Höhe von 2936 Schuhen angestellet hat.

Die Vermehrung, welche die Wärme in den zwey Quecksilber-Säulen herfürbringt, möchte auf einen Raum von 28 Zollen ungefähr 6 Linien betragen, von dem Froste an bis zum siedenden Waßer, denen Versuchen des Herrn de Luc zufolge. Daraus hat er geschloßen, daß man für jeden Grad des Reaumurischen Thermometers, die Höhen der Berge, welche man durch Beyhülfe des Barometers gefunden, um $\frac{1}{215}$ verbeßern müße, wie wir hernach sagen wollen.

Wenn man Höhen, welche man mit dem Barometer auf dem Berge und unten an dem Berge gemeßen hat, miteinander vergleichen will, so muß man den Grad des Thermometers an beyden Orten genau wißen und die Verbesserung auf eine mittlere Höhe sezen. Dann man erfähret nicht nur bey diesen Versuchen sehr verschiedene Grade der Wärme in der Höhe und in der Tiefe, sondern es gibt auch Umstände, welche schwer in die Rechnung zu bringen sind. Oft steiget das Barometer, welches oben auf dem Berge ist, da hingegen das in der Tiefe fällt, und dieses nur durch eine Seitenausdehnung der Luft, welche derjenigen gleich ist, welche bey dem Aufgange der Sonne gemeiniglich den Ostwind herfürbringet, die aber in der obern Gegend der Atmosphäre nicht so empfunden wird. Gewiße Winde, dergleichen auch der Ostwind ist, welcher des Morgens wehet, machen daß das Barometer fallen muß: nur gegen den fünften Theil des Ta-

ges,

ges, von dem Aufgang der Sonne an zu rechnen hat Herr de Luc gefunden, daß die Folgen der Vergleichung der Barometer auf dem Berge und in der Ebene regelmäßiger und beständiger gewesen sind.

Zuweilen muß man auch die Oberfläche des Quecksilbers mit einem Schwamm reinigen, und damit das schmuzige Häutgen und den Staub, welcher darauf fällt und sich anhänget, hinwegnehmen.

Die Barometer, deren man sich auf dem königlichen Observatorio in Engelland bedienet, haben über der Theilung, welche oben an der Röhre ist, ein Vergrößerunsglas: mit demselben kan man sehr leicht die Höhe des Barometers bis auf ein Zehentheil einer Linie beobachten, ja man kan wohl gar bis auf die Hunderttheile einer Linie schäzen. Wenn man künftig die Kölblein an den Barometern völlig unterdrüken wird, so dürfte es nöthig seyn, zwey dergleichen Vergrößerungs gläser zu haben, nemlich auf jeder Scala eines.

Ob man aber gleich die Veränderungen eines guten Barometers auf einige Hunderttheile einer Linie schäzen kan, so darf man doch nicht hoffen, sich von den eigentlichen Höhen beßer und näher als des zehenden Theils einer Linie zu versichern. Die beste Barometer werden selbst um etwas dergleichen von einander abgehen, da es viel zu schwer und zu selten ist Röhren von einer völlig gleichen Weite zu bekommen.

Die Veränderung des Barometers in dem königlichen Collegium zu Paris hat, wie es der Herr de l'Isle beobachtet, seit 1747 bis 1759 ungefähr zwey Zoll zwey Linien betragen: dann den 8. November 1753 stunde es auf 26 Z, 6 L, 6, und den 25. November 1748 auf 28 Z, 8 L, 4. Der Herr de Luc hat diese Veränderung zu Genf nur 20 Linien befunden und sie ist noch geringer auf den hohen Bergen und unter der heißen Zone.

Das Barometer beweiset und meßet nichts anders als die Schwere der Luft: unterdeßen siehet doch jedermann auf die Höhe des Barometers, wenn er schönes Wetter oder Regen vorher sagen will. Es ist aber dieses ein sehr ungewißes Zeichen, ob es gleich zuweilen dennoch einschlägt und zutrift, weil die Luft nicht so stark druket, wann sie durch den Wind beweget wird, oder mit Dünsten beladen und zum Regen geneigt ist, und weil ihre Schnellkraft durch die Feuchtigkeit vermindert wird. Die Dünste, womit die Atmosphäre so oft angefüllet und beschweret ist, sind, wie Herr de Luc behauptet, kleine Cörpergen, die aus Waßer und Feuer bestehen und folglich leichter sind als die Luft. Daher schließt er daß die Menge der Dünste in der Luft die Säule der Atmosphäre leichter machen und also die Ursache werden muß, daß das Barometer falle.

Die Höhen des Barometers zeigen Veränderungen an in der astronomischen Refraction: in Ansehung dieses Umständes aber,

sagt

sagt Herr de Luc, wäre es nöthig auf zwey verschiedene Ursachen seine Gedanken zu richten, nemlich auf die Höhe der Oerter, welche macht, daß das Barometer fällt, und auf das Daseyn der Dünste, welche eben diese Wirkung auf das Barometer haben, aber villeicht nicht auf die astronomische Refraction. Es ist dieses eine sehr küzliche Frage, welche man villeicht wird entscheiden können, wenn man diese Versuche mit eben so viel Verstand und Geschiklichkeit fortsezet, als Herr de Luc gethan hat. Insonderheit wird es wichtig seyn, wenn man in der untern Gegend der Atmosphäre die Wahrnehmung widerholet, weil es scheinet, daß diese allein die Veränderung der Refraction bestimme. Die Gegend, in welcher sich die Lufterscheinungen zeigen, hat keinen so grossen Einfluß in dieselbe, ob sie gleich nicht weniger andern Abwechselungen von Ausdehnung und dichter werden, welches in der untern Gegend nicht statt findet, ausgesezet ist.

Eines von den schönsten und nüzlichsten Dingen, wozu man das Barometer gebrauchen kan, ist, die Höhen der Berge und die Verschiedenheiten der Ebenen damit zu meßen. Da aber dieses zugleich eine sehr küzliche Sache ist, welche die gröste Vollkommenheit erfordert, so müßen wir hier einen etwas umständlicheren Begrif von den Mitteln geben, wodurch man dazu gelanget, und zwar so wie sie Herr de Luc angewendet hat, mit einem Erfolg, welcher die Richtigkeit seiner Theorie zur Genüge bestätiget.

Ehe

Ehe ich aber die sinnreiche Regel, welche aus seinen Versuchen entspringet, erkläre; will ich vorhero noch ein Wort von dem Geseze der verschiedenen Dichtigkeit der Luft sagen, welches von dem Herrn Mariotte und dem Herrn Boyle erfunden worden und von welchem die ganze Theorie des Barometers abhänget.

Man kan durch Versuche beweisen, daß das Volumen der Luft sich allezeit in einem umgekehrten Verhältnis zu dem Gewichte oder Schwere, welche sie zusammen drukt, verhalte. Ich nehme eine Barometer-Röhre, welche oben verschloßen ist, doch aber so, daß man sie wieder öfnen könne: ich fülle sie mit Quecksilber, und wenn ich sie in ein Gefäs voll Quecksilber umkehre, so bleibt die Quecksilber-Säule in der Röhre auf 28 Zollen stehen; vorausgesezt aber, daß der leere Theil der Röhre über dem Quecksilber zwey Zoll ausmache. Das unterste Ende der Röhre, welches in dem Quecksilber stekt, halte ich mit dem Finger zu, und öfne dagegen den obern Theil der Röhre, um Luft hinein zu laßen, welche in ihrem natürlichen und durch die Schwere der Atmosphäre zusammengedrukten Zustand, diesen Raum von zwey Zollen einnehmen wird. Alsdann verschließe ich wieder den obern Theil, und öfne den untern Theil der Röhre, welcher in dem Quecksilber stehet, von neuem, worauf die zwey Zoll der Luft sich ausdehnen und machen, daß das Quecksilber in der Röhre $6\frac{1}{2}$ Zoll herunter fällt, das ist, so weit, daß die noch übrige $21\frac{1}{2}$ Zoll,

wenn sie mit den zwey ausgedehnten und ausgebreiteten Zollen der Luft auf einen Raum von $8\frac{1}{2}$ Zollen zusammen gehalten werden, in dem Gleichgewichte mit einer Säule der Atmosphäre, die 28 Zollen gleich ist, stehen. In diesem Zustand wird die in dem Barometer enthaltene Luft nur durch eine Kraft, welche $6\frac{1}{2}$ Zollen des Queksilbers gleich ist, zusammengedrukt. Dann weil die ganze Säule der Atmosphäre nur 28 Zollen des Quecksilbers gleich ist, und $21\frac{1}{2}$ derselben in dem Barometer bleiben, um sich der Schwere der Atmosphäre zu widersezen, so bleiben in der Atmosphäre zu einem Aequivalent nur $6\frac{1}{2}$ Zolle um auf die Luft zu wirken, welche den übrigen Raum des Barometers anfüllet. Dieser Druk von $6\frac{1}{2}$ ist kleiner als derjenige von 28, so wie das Volumen von zwey Zollen Luft geringer ist, als das von $8\frac{1}{2}$, welche es in dem neuen Zustand einnimmt; denn $8\frac{1}{2} : 2 :: 28 : 6\frac{1}{2}$, zum wenigsten beträgt es ungefähr so viel, dann ich habe die Brüche in der Rechnung weggeworfen. Also hat die Erfahrung allezeit bewiesen, daß die Dichtigkeit der Luft in der Tiefe, so wie oben auf dem Gipfel der höchsten Berge, in einem gleichen Verhältnis mit der Kraft stehe, welche sie zusammendruckt.

In der vorhergehenden Rechnung habe ich vorausgesezt, daß man durch die Erfahrung gefunden, daß das Quecksilber $6\frac{1}{2}$ Zoll durch die Ausdehnung der zwey Zoll Luft herabfalle: weil man aber vielleicht begierig seyn könnte, à priori

oder

oder durch Schlüße dieses herauszubringen, so will ich hier die Methode dazu angeben, zumalen da man sie bey andern Zahlen und in andern Fällen gar wohl und gut gebrauchen kan. Wir wollen den Raum, welchen das Quecksilber herabfallen solle, x nennen, so daß das Volumen der ausgedehnten Luft sey $2 + x$ an statt 2, und die Luft-Säule, welche auf diese Luft druken wird, sey gleiches Innhalts mit x an statt 28 Zoll: Soll nun die Dichtigkeit der Luft ein gleiches Verhältnis haben mit der Kraft, welche sie zusammen drukt, so muß man diese Proportion haben $2 + x : 2 :: 28 : x$, das ist, $2x + xx = 56$; wenn man nun diese Gleichung auf die gemeine Art auflöset, so findet man $x = \sqrt{(57)} - 1 = 6,55 = 6^{Z}\ 6^{L}\ \frac{6}{10}$. Dieses ist auch die Größe oder der Raum, welchen man wirklich durch die Erfahrung heraus bringt.

Der Herr Bouguer hat diese Regel bis zu einer Höhe von 2484 Toisen richtig befunden, wo das Barometer nur 15 Zoll und 11 Linien hoch stunde, und man hat niemals Versuche in einer größern Höhe angestellet. **Ich habe**, sagt er in den Mem. Acad. 1753. p. 516, **allezeit gefunden, daß die Elasticitäten von einerley Massa der Luft auf das genaueste sich nach dem Verhältnis ihrer Dichtigkeiten richteten.** Wenn also gleich diese Regel nicht über eine gewiße und bestimmte Zusammendrükung richtig wäre, so ist sie es doch wenigstens in allen Wahrnehmungen, welche man mit den Barometern anstellen kan.

Weil die Dichtigkeit der Luft der Schwere proportionirt ist, welche dieselbe zusammen drukt, so entspringt daraus eine geometrische Progression in den Höhen des Barometers. Dieses will ich auf eine deutlichere und überzeugendere Weise darthun, als es, wie mich dünket, der meiste Theil unserer Schriftsteller bishero gethan hat.

Lehrsaz. In einer jeden geometrischen Progreßion sind die Glieder gleich ihren Differenzen. Dann eine jede geometrische Progreßon kan unter diese Formul gebracht werden: a, a^2, a^3, a^4, &c. Die Differenz zwischen den Gliedern a^4 und a^3, ist zu dem Glied a^3 wie die Differenz zwischen den Gliedern a^2 und a zu a ist, oder $a^4 - a^3 : a^3 :: a^2 - a : a$; dann das Produkt der äußersten eben sowohl als das Produkt der mittleren ist $a^5 - a^4$. Also siehet man, daß in einer jeden geometrischen Progreßion die Glieder ihren Differenzen proportionirt sind, und daß, wenn man eine Reihe von Gliedern findet, welche allezeit und durchgehends ihren Differenzen proportionirt sind, diese Glieder eine geometrische Progreßion ausmachen werden.

Wir wollen die Höhe einer Luft-Säule in gleiche Theil theilen, so daß die Vertical Linie in einer arithmetischen Progreßion getheilt sey, so hat der Theil oder die Schichte der Luft, welche in jener von diesen Eintheilungen enthalten ist, alsdann eine solche Dichtigkeit, welche der Schwere der obern Säule, womit dieselbe beschwert ist, proportionirt heißet, ihre Massa ist

eben-

ebenfalls proportionirt zu dieser Dichtigkeit. Dann das Voluminen ist einerley, weil wir angenommen haben, daß alle Theile gleich seyen. Ist aber das Voluminen einerley, so ist die Maßa und die Schwere proportionirt mit der Dichtigkeit. Die Massa dieser Schichte der Luft ist die Differenz zwischen der ganzen Säule, von welcher sie das äußerste Theil ausmacht, und zwischen der obern Säule, womit dieselbe beschweret ist. Nun ist aber diese Massa proportionirt zu der obern Säule; folglich ist auch die Differenz dieser Säulen proportionirt zu der obern Säule, dieses heißet, die Vertical-Säule ist in Theile abgetheilet, deren Differenzen zu den obern Theilen proportionirt sind. Es nehmen also diese obere Theile in einer geometrischen Progreßion zu, wenn man gegen die Erde zu in einer arithmetischen Progreßion herab gehet.

Die Höhe des Quecksilbers in dem Barometer ist nun in einem sehr genauen Verhältnis mit dem Druk der Luft; folglich muß sich die Höhe des Barometers in einer geometrischen Progreßion vermindern, wenn es sich in einer arithmetischen Progreßion oder nach gleichen Graden erhebet.

Die Tabellen der Logarithmen, welche jedermann in Händen hat, sind nichts anders als eine Reihe von Zahlen in einer arithmetischen Progreßion, welche mit andern Zahlen übereinkommen in einer geometrischen Progreßion. Wenn also in den gemeinen Tabellen die Zahlen den Stand des Barometers bemerken, so

müßen die Logarithmen die Höhen anzeigen; dann die Höhen des Barometers sind in einer geometrischen Progreßion, da hingegen die Höhen in der arithmetischen Progreßion sind.

Herr Bouguer bemerkte wirklich, daß, wenn man die Höhen des Barometers in Linien ausdrukte und die Höhen der Berge in Toisen, so gabe die Differenz der Logarithmen von den Höhen des Barometers den verhältnismäßigen Zwischenraum in der Vertical-Linie oder die Differenz in der Höhe der beyden Oerter, wo diese Höhen des Barometers beobachtet worden sind. Nur hat er zu Peru wahrgenommen, daß man diese Höhe noch um ein dreyßigtheilgen vermehren und die gemeinen Logarithmen nur von fünf Zahlen gebrauchen müße.

Was aber am merkwürdigsten ist, wie Herr Bouguer sagt, und was Gelegenheit zu einer neuen Frage gibt, welche wir hauptsächlich zu erläutern suchen wollen, ist dieses, daß diese Methode, so allgemein man sie auch zu gebrauchen suchet, unten an den Cordillerischen Gebirgen nicht angewendet werden kan, so wenig als auf allen andern Bergen der heißen Zone. Ja wir können noch hinzusezen, daß sie noch weniger in Europa statt findet, wie dieses alle Naturlehrer erfahren und eingesehen haben, welche diese Materie sorgfältig untersucht haben. Verschiedene derselben haben deswegen einige andere Methoden an statt derjenigen ausfündig zu machen gesucht, welche auf die Eigenschaften der Logarithmen gegründet ist. Diese Metho-

den

den sind bekannt und sie können auch den Vortheil haben, daß sie für gewiße Gegenden und Berge, deren Höhe gewiße Gränzen hat, sich schiken; allein sie nehmen alle an, daß die Ausdehnung der Luft in verschiedenen Höhen nicht nach einer geometrischen Progreßion erfolgen; ob es gleich gewiß und durch eine unendliche Menge von Versuchen ausgemacht ist, welche auf dem Gipfel der höchsten Berge der Welt, sowohl als an dem Ufer des Meeres und in der heißen Zone so wie in den gemäßigten Zonen, angestellet und gemachet worden sind: daß die Elasticitäten einer jeden Maßa von Luft in dem genauesten Verhältnis stehen mit ihren verschiedenen Graden der Verdikung. Siehe Mem. Acad. 1753. p. 520.

Daher glaubte Herr Bouguer in der That einen vollen Widerspruch zwischen beyden Gesezen, ohngeachtet eines ganz natürlich aus dem andern folget, zu finden. Muschenbroek in in seinem Essai de Physique §. 1421 schiene auch der Meynung zu seyn, daß die Verdünnerungen der Luft an hohen Oertern größer wären als sie nach der Regel des Mariotte seyn sollten. Er berufet sich auf die Versuche des Herrn Cassini, Scheuchzers und Plantade, welche auf dem Canigou auf dem Moufflet und auf dem Bartholomäi-Berge gemacht worden, und welche man vermittelst des Barometers um 271, 254 und 178 Toisen niedriger gefunden als sie nach der genauesten Ausmeßung des Herrn Cassini sind. Es mag ein anderer Naturlehrer unter-

suchen, woher diese Verschiedenheit in der Regel und in den Maasen komme, wenn er die Umstände dieser Wahrnehmungen genau betrachtet: ich werde mich nur damit begnügen, daß ich mit dem Herrn de Luc sage, daß mehr als vier hundert Wahrnehmungen, welche um Genf und Turin herum angestellet worden, die genaue Richtigkeit der Regel bezeigen können, woferne man nur diejenige gehörige Vorsicht gebrauchet, welche man bishero nicht gebrauchet hat, da man sie für überflüßig gehalten.

Die Herrn Cassini und Bouguer haben in den Mem. Acad. 1733 und 1753 diesen Unterscheid zwischen den großen und kleinen Höhen zu erklären gesuchet. Herr Bouguer nahme verschiedene Spannungen an in der elastischen Kraft der verschiedenen Theile der Luft, und er gibt sogar die krumme Linie dieser Elasticitäten an, welche vermuthlich nichts anders bedeuten solle, als die krumme Linie der Fehler, welche er bey seinen verschiedenen Abmeßungen begangen hat. Ich will mich aber in diese Untersuchungen nicht weiter einlaßen, da die Bemühungen des Herrn de Luc sie überflüßig machen: ich komme vielmehr auf die Regel, welche er durch seine Rechnungen und Versuche herausgebracht hat.

Regel. Die Differenz der Logarithmen von zwey Höhen des Barometers, welche nach Linien gezählet worden, gibt die Differenz der Höhen zweyer Pläze oder Oerter in Toisen, wenn die Logarithmen samt der Caracteristischen nur aus

fünf

fünf Zahlen bestehet und das Thermometer $16\frac{3}{4}$ Grade über dem Frierpunkt stehet. Bey einer andern Witterung, muß man für jeden Grad des Reaumurischen Thermometers $\frac{1}{215}$ von der gefundenen Höhe abziehen, wenn neinlich das Thermometer unter $16\frac{3}{4}$ Graden stehet, hingegen muß man $\frac{1}{215}$ noch zusezen für jeden Grad des Thermometers, wenn es über $16\frac{3}{4}$ stehet.

Exempel. Wenn das Thermometer auf $8\frac{1}{2}$ Grad stunde, so ware die Höhe des Barometers zu oberst auf dem Thurn St. Petri in Genf 321 Linien und 18, und unten bey dem Thurn 323, 87. Wenn ich nun die Operation recht genau machen will, so nehme ich 6 Zahlen in den Logarithmen, die lezte Zahl aber soll nur die Zehentheile der Toisen anzeigen: die gefundene Differenz wird hernach mit 6 multipliciret, damit man die Schuhe heraus bekommt.

Logarithmus von 323,87	-	-	25104,1
Logarithmus von 321,18	-	-	25067,7

Die Differenz der Höhe in Toisen und Zehentheilgen der Toisen macht also - 36,4

Werden diese mit 6 multiplicirt, damit man die Schuhe und die Zehentheilgen der Schuhe bekomme, so gibt es - 218,4

Wenn ich das Thermometer auf $8\frac{1}{2}$ gefunden habe, das ist $8\frac{1}{4}$ unter dem bestimmten Punkt von $16\frac{3}{4}$ so multiplicire ich $\frac{1}{215}$ mit $8\frac{1}{4}$ oder $\frac{33}{4}$, welches $\frac{33}{860}$ gibt, diese ferner mit der gefundenen Höhe 218,4 multipliciret, geben $\frac{7207{,}2}{860}$, oder 8 Schuhe $\frac{4}{10}$, welche man von der gefundenen Höhe 218,4 abziehen muß, so wird man 210

 Schuhe

Schuhe für die wahre Höhe des St. Petri Thurns bekommen, welche, wie man durch genaue Abmeßungen gefunden hat, nicht über 5 Zoll von der wirklichen Höhe deßelben abweichet, welches in der That fast eine unverhofte und kaum begreifliche Richtigkeit ist. Nach eben dieser Regel hat Herr de Luc auch durch sein Barometer gefunden, daß sein Zimmer in Genf 1176 Schuh hoch über der Meeres-Linie bey Genua stehe, wo er auch dergleichen Wahrnehmungen gemachet hat, und daß Turin 734 Schuhe höher sey als die Meeres-Linie bey Genua.

Die vorhero gemeldete Verbeßerung kan auch durch Logarithmen und zwar auf folgende Weise gemacht werden:

Logarithmus von 215 - - -	2,332438
Complementum oder Logar. von $\frac{1}{215}$	7,667562
Logar. von $8\frac{1}{4}$ oder von $\frac{33}{4}$ - -	0,916454
Logar. der Höhe von 218,4 -	2,339253
Summa der 3 Logar. oder Logar. von 8 S. 4	0,923269

Dieses ist die Verbeßerung, welche von dem Thermometer abhänget, und welche man von der gefundenen Höhe abziehen muß, weil das Thermometer unter $16\frac{3}{4}$ Graden stehet. Damit ich aber der Rechnung in gemeinen Fällen überhoben seyn möchte, so habe ich nachfolgende Tabelle gemacht, wo man die Verbeßerung der Höhen nur in Toisen angezeiget findet und zwar von fünf zu fünf Graden des Reaumurischen Thermometers.

Da

Da aber diese Tabelle nur für diejenige bestimmet ist, welche keine genaue Rechnung anstellen wollen, so habe ich mich begnüget nur die einfachesten Brüche, welche der Regel am nächsten kommen, herzusezen.

	Grade des Thermom.	Verbeßerungen der nach der vorhergehenden Regel gefundenen Höhen.
Grade der Wärme.	30	Sezet $\frac{1}{16}$ oder eine Toise noch zu - 16
	25	Sezet $\frac{1}{26}$ oder eine Toise noch zu - 26
	20	Sezet $\frac{1}{66}$ oder eine Toise zu - 66
	15	Ziehet $\frac{1}{123}$ oder eine Toise ab von 123
	10	Ziehet $\frac{1}{32}$ oder eine Toise ab von - 32
	5	Ziehet $\frac{1}{18}$ oder eine Toise ab von - 18
	0	
Grade der Kälte.	0	Ziehet $\frac{1}{13}$ oder eine Toise ab von - 13
	5	Ziehet $\frac{1}{10}$ oder eine Toise ab von - 10
	10	Ziehet $\frac{1}{8}$ oder eine Toise ab von - 8
	15	Ziehet $\frac{1}{7}$ oder eine Toise ab von - 7

Man kan auch allenfalls der Logarithmen gar entbehren, wenn man die Höhe eines Berges finden will, woferne man nur eine bestimmte Anzahl von Toisen durch die abwechselnde Höhe des Barometers dividiret, wie ich sogleich dieses zeigen will.

Die Differenzen in einer geometrischen Progreßion sind den Gliedern der Progreßion selbst proportionirt. Die Differenzen der Höhen des Barometers sind also denen Höhen des Barometers selbst proportionirt, wenn man annimmt, daß man sich allezeit gleich stark über

die

die Waßerfläche erhöhe. Ich nehme an, daß man sich 75 Schuh über den Ort, wo das Barometer auf 28 Zollen stehet, erhebe, und eine Veränderung von einer Linie daran bemerke, so wird man hingegen nur eine Veränderung von einer halben Linie finden, wenn man 75 Schuhe noch höher über einen Berg, auf welchem das Barometer nur 14 Zoll hoch stehen würde, hinauf stiege. An statt aber daß man immer 75 Schuhe höher steige, so wollen wir annehmen, daß man Lust habe, so weit hinauf zu steigen, bis das Barometer eine Veränderung von einer Linie zeiget. In diesem Fall wird man 150 Schuh noch über den Berg hinauf steigen müssen, wo das Barometer auf 14 Zoll stünde. Mithin ist die Differenz der Perpendicular-Höhe, welche der Veränderung von einer Linie in dem Barometer gleich ist, doppelt, wenn die Höhe des Barometers um die Hälfte kleiner ist, und ist allezeit in einem umgekehrten Verhältnis mit der Höhe des Barometers. Man muß also hiezu eine bestimmte Zahl haben, welche, wenn sie durch die Höhe des Barometers dividiret wird, die Differenz der Perpendicular-Höhe, welche für die Veränderung von einer Linie sich schicket, angeben wird. Es sey x diese Anzahl der Toisen, $\frac{x}{28}$ solle die Differenz der Höhe seyn, wenn das Barometer auf 28 Zollen stehet und $\frac{x}{14}$ wird die Differenz der Höhe bey 14 Zollen des Barometers seyn. Diese zwey Größen verhalten sich unter einander, wie sich 14 zu 28 verhält, das ist, sie stehen in einem um-

gekehr=

gekehrten Verhältnis mit den Höhen des Barometers. Die Zahl x, wie solche durch verschiedene Versuche des Herrn de Luc gefunden worden, betrift nach seinem Angeben 26094 Schuhe, dieses ist auch die Höhe der Atmosphäre bis zu dem Punkt, wo das Barometer nur eine Linie hoch stehen würde. Wenn man diese Zahl mit 28 Zollen oder vielmehr mit 336 Linien dividiret, so ergeben sich 78 Schuhe, und dieses ist auch die Größe der Höhe, welche mit der Veränderung einer Linie in dem Barometer übereinkommt, wenn er ungefähr bey 28 Zoll hoch stehet, und wenn das Thermometer auf $16\frac{1}{4}$ Grade über dem Gefrierpunkt nach der Eintheilung des Herrn von Reaumur sich befindet.

Man kan also die Höhe, welche einer Linie des Barometers gleich ist, finden, wenn er auf 28 Z. 1 L., 28 Z. 2. L. 28 Z. 3 L. stehet, indem man 26094 Schuhe mit 337, 338, 339 L. &c. dividiret; so wird die Summa von allen diesen Höhen, ohne Beyhülfe der Logarithmen, die Höhe geben, welche der Veränderung von verschiedenen Linien oder verschiedenen Zollen des Barometers gemäs ist und gleich kommt. Wenn man aber diese Operation machen will, so muß man sie von einer Linie des Barometers zu der andern machen, weil diese Regel nur alsdann genau zutrift, wenn man einen sehr kleinen Zwischenraum annimmt. Wollte man noch genauer und sorgfältiger verfahren, so müßte man nur halbe Linien nehmen und die Hälfte der Zahl

26094 mit der Höhe des Barometers dividiren. Hingegen muß man sich wohl hüten, daß man glaube, wenn man die Veränderung, die auf eine Linie trift, viermal nehme, man habe sodann die Veränderung für 4 Linien.

Der Einfluß der Wärme ist bey diesen Arten von Operationen so groß, besonders bey der Meeres-Linie, daß man anstatt 75 Schuhen nur 56 oder gar bis auf 86 finden könnte, nach Beschaffenheit der Witterung, in welcher man diesen Versuch gemacht hat. Die Zahl 26094 welche wir gebraucht und angegeben haben, sezet allezeit voraus, daß das Reaumurische Thermometer auf $16\frac{3}{4}$ Graden über dem Gefrierpunkt stehe; wogegen es nur 25275 ausmacht für die Temperatur der Keller des Observatorii, welche ungefähr bey 10 Graden des Thermometers zutrift.

Regel. Wenn man wißen will, was für eine Differenz die Veränderung einer Linie in der Höhe des Barometers anzeige, in Ansehung der Höhe der beobachteten Oerter; so muß man 25275 Schuhe dividiren mit der Anzahl der Linien, welche das Barometer anzeiget, wenn nemlich das Thermometer alsdann zehen Grade über dem Gefrierpunkt stehet. Man muß 24668 dividiren, wenn das Thermometer nur fünf Grade darüber ist; 25882, wenn das Thermometer 15 Grade über dem Gefrierpunkte sich befindet; 26489, wenn es auf 20 Graden ist; 27096, wenn es auf 25 Graden stünde: hiedurch wird man allezeit die Anzahl der Schuhe erfah-

erfahren, welche auf die Veränderung einer Linie in der Höhe des Barometers treffen. Wenn man die Veränderung verschiedener Linien beobachtet hat, so muß man diese Rechnung für jede Linie besonders machen und die Resultata sodann zusammenzählen.

Exempel. Ich will annehmen, daß man an dem Fluß eines Berges die Höhe des Barometers 348 Linien bemerket habe, und höher hinauf 345, bey dem Stand des Thermometers auf $16\frac{1}{4}$ Graden; alsdann dividire ich die Zahl 26094 mit 345, so habe ich 75 S. 40; hernach mit 346, so habe ich 75, 19; endlich mit 347, so finde ich 74, 98. Diese drey Höhen zusammen genommen, geben die ganze Höhe, welche drey Linien gleichkommt, nemlich 226 Schuhe oder 38 Toisen. Man würde eben dieses heraus bekommen, wenn man den Logarithmus von 345, oder 25378 von dem Logarithmus von 348, welcher 25416 ist, abzöge. Die Differenz ist ebenfalls 38 Toisen.

Vermittelst dieser Regel kan man die Logarithmus-Tabellen entbehren, aber sie wird sehr weitläufig, wenn die Differenzen des Barometers beträchtlich sind. Der Herr de la Condamine fande auf einem der Cordillerischen Berge, daß die Höhe des Barometers nur 189 anstatt 348 Linien betruge. Da hier eine Differenz von 159 Linien ware, so hätte man 159 mal dividiren und alle Quotienten oder 159 Zwischenräume zusammen zählen müssen, um die ganze und völlige Höhe zu erhalten

ten, wo man hingegen dieselbe durch eine einige Subtraction erhält, wenn man den Logarithmus von 189 von dem Logarithmus von 348 abziehet, und 2651 Toisen erhält, welches die völlige Distanz der beyden Oe er ist. Wenn man 159 mal dividiren wollte, so würde man finden, daß man zu der lezten Linie, das ist, auf dem Gipfel des Berges 138 Schuh der Höhe brauchet zu einer einigen Linie des Barometers, an statt der 75, welche man unten an dem Berge nöthig hatte.

Die Meßkünstler werden leicht einsehen, daß die Größe von 25275 Schuhen der logarithmische Subtangens ist, deßen abgezogene Zahlen die Höhen anzeigen müßen, indem die Ordinaten die verhältnismäßige Diken der Atmosphäre zu diesen verschiedenen Höhen angeben. Dieser Subtangens ist auch dem Produkt der Höhe des Barometers aus 10832 gleich, welches die Dichtigkeit des Quecksilbers ist, wenn die Dichtigkeit der Luft für eine Einheit angenommen worden. Endlich zeiget eben diese Zahl die Höhe, bis zu welcher man hinauf steigen müßte, wenn das Barometer nur noch eine Linie hoch stehen sollte: eine Höhe, welche man beynahe für die Höhe der Atmosphäre selbst halten kan, welche nach dieser Rechnung nicht mehr als ungefähr 4200 Toisen betragen würde.

Auszug aus einem Briefe/ der von dem Erfinder der Methode ein Universal-Thermometer zu verfertigen an ein Mitglied der Academie der Wißenschaften nach Rochelle den 7. October 1758 geschrieben worden, um daselbst den Grad des Mittelmäßigen unserer Erd-kugel zu bestimmen. (*)

Der Grad des Mittelmäßigen auf meinem Thermometer ist von mir anfänglich im October 1740 bestimmet worden und zwar so, wie ich denselben in einem Mauer-loch

(*) Weil wegen starken Abgang dieser Schrift nun bereits die dritte Auflage veranstaltet worden, so hat man für dienlich erachtet bey derselben noch diesen gegenwärtigen Zusaz zu machen, welcher allem Ansehen nach bey dieser Materie nicht überflüßig seyn wird. Dann es erläutert derselbe nicht nur manche von dem Verfasser im vorhergehenden vorgetragene Säze, sondern enthält auch noch fernere Versuche die er mit den Thermometern angestellet hat und gibt Gelegenheit und Anweisung wie künftig noch meh-

loch in den Kellern des königlichen Observatoriums zu Paris beobachtete und worinnen der Herr de la Hire, mit dem alten Thermometer des Observatoriums öftere Versuche angestellet und solches allezeit darinnen auf 48 Graden stehend gefunden hatte; wo hingegen ich solches den 10 Jenner 1742 nur auf 47 Grad bemerken konnte.

Indeßen behauptete man nicht nur durchgängig, daß diese Temperatur unveränderlich sey, sondern sie schiene mir selbst so zu seyn und außerdem noch ein richtiges Mittel zwischen Frost und Kälte zu halten. Ja ich habe noch überdieß durch einen Versuch, welchen ich im Jahr 1741 zu Ardingheim bey Calais in einem Gang einer alten Mine 447 Fuß tief unter der Erde mit zweyen von meinen Thermometern anstellen laßen, gefunden, daß sie auf eben diesem Punkte geblieben sind, so wie sich dieses auch in einer sehr tiefen unterirrdischen Höhle zu Sa-

---

mehrere sollen gemacht werden. Die Hypothesen welche er bey dieser Gelegenheit auch an den Tag zu legen gesucht hatte, wenn sie gleich bey dem ersten Anblick verwegen zu seyn scheinen, verdienen doch einige Untersuchung. Wir verhoffen also durch diesen Zusaz, der eigentlich zu dieser Materie gehöret, darneben aber so selten ist, daß er in sehr wenigen Händen sich befindet, indem der Verfasser solchen auf seine eigene Kosten druken laßen und die wenige Exemplare nur seinen besten Freunden ausgetheilet hat, den Liebhabern einen wahren Dienst erwiesen zu haben. Der Uebersezer.

Salelle bey Carcaßone eben so zeigte. Ohngeachtet aber dieser Grad des Mittelmäßigen fast allgemein gebilliget und angenommen worden, so sind mir doch in Ansehung deßelben noch einige Zweifel übrig geblieben, theils weil ich bey den Versuchen zu Ardingheim und zu Salelle nicht selbst zugegen ware, theils weil ich an andern Orten noch viele dergleichen habe machen laßen, welche nicht damit übereingestimmet haben.

Weil ich nun weiß, daß man die Ursache gehörig kennen muß, wenn man von den Wirkungen ein richtiges Urtheil fällen will; so habe ich zu diesem Ende so viele Versuche in Ansehung der Wärme und der Kälte gemacht, als es mir möglich gewesen ist, nur damit ich ihre Natur und Beschaffenheit recht einsehen lernte.

Durch diese Versuche aber bin ich von folgenden Stüken mit großer Wahrscheinlichkeit überzeuget worden.

Daß die Wärme und Kälte zwey subtile Materien sind, welche einander in der Atmosphäre der Luft entgegen gesezt sind, gleichen Fall haben und also täglich eines der vornehmsten Spiele der Natur auf der Erde machen.

Daß beyde, nämlich die Wärme und die Kälte, alle flüßige Cörper sehr geschwind, die dichte und irrdische Cörper aber sehr langsam durchdringen, das ist bis sie in dem innersten dieser sowohl als jener durchaus ihr vollkommenes Gleichgewicht mit der Schwere ihrer äußerlichen Materie erhalten haben.

Daß, wenn man nicht sowohl auf ihr besonderes Uebergewicht welches sie jeden Tag zeigen, als vielmehr auf dasjenige, welches in vielen Tagen bemerket wird, sehen wollte, sie wechselsweise eine nach der andern ohngefähr sechs Monate auf der Erde in verschiedenen Graden der Temperatur die Oberhand oder das Uebergewicht bekommen.

Daß sie sich vermöge dieses Uebergewichts beynahe 80 Fuß tief unter die Erde, etwas mehr oder weniger nach Beschaffenheit des Bodens welchen sie antrefen, allgemach hineinziehen, villeicht nicht sowohl gerade zu als vielmehr vermittelst der Wäßergänge, welche sie wohl 2400 Fuß weit bringen und leiten könnten, woferne wir einem Versuche Glauben beymeßen dürfen, welcher bey Genf mit dem Waßer eines 130 Fuß tiefen Brunnens gemacht worden und von welchem man behauptet, daß er von dem Arüe Fluß, welcher beynahe 400 Toisen weit davon entfernet ist, sein Waßer erhalte, welcher Versuch vor weniger Zeit seine Bestätigung erhalten zu haben scheinet durch dasjenige was man zu Lion bey einem eben so tiefen Brunnen bemerket hat.

Ich hatte diese Versuche zu Paris im Jahr 1740 angefangen und bis 1744 fortgesezet, als ich in der Zwerchgaße (ruë traversiere) nahe bey dem königlichen Pallast wohnte. In einer von meinen Kammern, welche ich bewohnte, wurde kein Feuer gemacht und eben so wenig geschahe solches über und unter mir, nur ware sie

sie mit doppelten Fenstern wohl verwahret. Der obere und untere Stubenboden ware wohl gefüttert. Die Mauren derselben waren von Quatersteinen zwey Fuß dick aufgeführet und hier ware es, wo ich zu Versuchen ohngefähr 20 von meinen recht gut miteinander übereinstimmenden Thermometern bereit hielte.

Einige von diesen Thermometern und zwar in der Entfernung von zwey zu zwey Zoll, hiengen an dem Durchschnitt der Mauer andere an der Mauer in dem Zimmer selbst, noch andere in der freyen Luft in gerader Linie mit der äußeren Mauer; alle aber hatten gleiche Kugeln, gleiche Bretter und gleich guten Weingeist. Diese leztere hatte ich in die Mitte der Creuzstöcke einen über den andern jeden einen Fuß weit von dem andern entfernet aufgehänget. Ueber diesen Creuzstöcken aber ware ein zwey Fuß weit herfürspringendes Karnies, welches verursachete, daß die untere Thermometer, wenn die eine oder die andere Materie schnell zunahme, allezeit mehr Kälte oder Wärme anzeigten, als die obere, weil das Karnies diese leztere mehr als die andere vor dem Herabfallen der einen oder der andern Materie bedekte, welche durch das Karnies nicht so leicht und so geschwind durchdringen konnten.

Wenn die Sonne bereis aufgehen wollte, so ware der stärkere Fall der Kälte sehr merklich und man sahe also, daß die Sonnenstrahlen, welche durch die obere Atmosphäre durchdrangen durch ihren Druk die Kälte aus derselben auf die

Erde herabzufallen nöthigten. Wenn sich sodann die Sonne so weit über den Horizont erhoben hatte, daß ihre Strahlen kräftig auf die Erde fallen konnten, so fienge die Kälte wider an sich in die Höhe zu begeben und die Wärme dagegen herabzufallen, welches bis ungefähr um 3 Uhr Nachmittags fortdaurte.

Unterdeßen geschahe es zu weilen des Morgens und bey heiterm Wetter daß Nord Ost Winde entstunden, welche die Kälte in der Luft im Ueberfluß herbey führten, wo sodann die Kälte, an statt sich zu vermindern, den ganzen Tag über durch ihr Herabfallen sich vermehrte und die ganze Nacht hindurch noch stark zuzunehmen fortfuhre. Wenn aber keine neu herbeygebrachte Kälte in der Atmosphäre zu finden ware, so spielte die gewöhnliche Kälte allezeit so wie ich bereits gesagt habe, nämlich daß sie des Nachmittags um drey Uhr anfienge zuzunehmen, und bis des andern Morgens frühe darinnen fortfuhre.

Wenn warme Winde entstunden, so verhielten sich die Thermometer welche unter dem Karnies hiengen, auf gleiche und vorangezeigte Weise. Die untere zeigten allezeit mehr Wärme an als die obere, je nachdem die Veränderung und das Wachsthum der Wärme schneller ware oder nicht.

Was die Thermometer anbetrift, die in der Kammer aufgehänget waren, wenn von außen schnell eine große Wärme entstunde, welche die in freyer Luft hängende Thermometer

ter bis auf 17 oder 18 Grad über Tempere hinauftriebe, so zeigten diese nur 5 oder 6 Grad an und schienen sich erst lange hernach zu bewegen. Den Tag darauf zeigten die aussen hängende Thermometer 17 Grad Wärme, die innere aber 9 oder 10. Den dritten Tag stunden jene auf 18 oder 19, diese aber auf 12. Am vierten Tag zeigten die äußere 17 oder 18 die innere aber 13 oder 14. Und so sahe man diese ganze Zeit über das Zunehmen der Wärme, vermittelst der Thermometer, welche an dem Durchschnitt oder der Dike der Mauer hiengen, wie solche durch die Mauern gedrungen und der Unterscheid, welcher sich dabey von zwey zu zwey Zollen äußerte, betruge öfters mehr als einen Grad.

In Ansehung der Kälte verhielte es sich eben so und zu weilen noch merklicher. Dann wann ich eine Menge Becher oder länglicht runde Gefäße mit Waßer in das Zimmer gebracht, worinnen sich Thermometer befanden, an welchen ich die Grade mit Seidenfaden bemerkte, damit ich den Grad der Kälte wahrnehmen könnte, welcher hinlänglich ware das Eis zu bilden, ingleichen auch wie diese Bildung geschehe, (mit welcher Entdekung ich auch A. 1742. nach vieler vergeblicher Arbeit und Mühe zu Stande gekommen bin) so zeigte sich dieser Grad der Kälte in dieser Kammer A. 1741. 1742 und 1743 erst viele Stunden nachher, wenn das Thauwetter eingefallen ware und es außen stark zu thauen fortfuhre, wo-

raus man augenscheinlich sehen konnte, daß ein starker Theil der kaltmachenden Materie, welche in dem obern Zimmer und deßen Boden sich befunden, sich mit einem Theil von derjenigen vereiniget hatte, welche in die vordere Mauern eingedrungen ware, ferner daß sie ganz langsam in die Kammer einzudringen fortgefahren und darinnen zugenommen habe, bis ihrer so viel geworden, als zu diesem Ende erforderlich gewesen ist. Folglich muß es sich eben so in der Tiefe der Erde, ja wohl noch stärker in Betracht der Dichtigkeit der Masse, wiewohl bey einem geringeren Grad der Kälte verhalten.

Die Veränderungen des Thermometers von einem äußersten Ende zu dem anderen seiner Bewegung in der Luft sind also weit größer und schneller außerhalb eines Gebäudes als innerhalb demselben und merklicher in dem obern Stokwerk eines Hauses als in dem unteren, in dem unteren Stokwerk aber merklicher als in einem Keller. Hieraus folget nun, daß man, je tiefer man unter die Erde kommt, auch desto weniger Veränderung an dem Thermometer bemerken wird und daß es langsamer zugehe und mehr Zeit erfordert werde, bis dasselbe von einem äußersten Ende zu dem andern seiner jährlichen Bewegung gelange und komme: ja daß folglich die äußerste Wärme, so weit sie nämlich in die Erde eindringen kan, nicht eher dahin kommen kan, als nachdem sie sechs Monate in der obern Luft das Uebergewicht

wicht erhalten hat. Und eben so verhält es sich mit der Kälte. Was die Wärme betrift, so gehet dieses ohngefähr bis auf das Ende des Septembers; in Ansehung der Kälte aber bis auf das Ende des Merzens. Eben dieses ist es auch was ich vermuthe in dem Keller des königlichen Observatoriums zu Paris erfahren zu haben und welches sich, wenn es wirklich so ist, bestättigen wird wenn man ein ganzes Jahr lang alle Monate genaue Beobachtungen anstellen wird, welche nun der Herr **** mit einigen Thermometern, die ich ihm nächster Tagen zu diesem Ende überschiken werde, übernehmen will.

Da nun also das wirkliche Daseyn und das Spiel dieser beyden Materien der Wärme und der Kälte zur Genüge bewiesen ist durch diejenige Versuche sowohl welche ich jezt angeführet habe, als auch durch eine Menge anderer, welche in meinen Schriften von den Thermometern befindlich sind, da ferner die Sonne die am meisten wirkende Ursache zu seyn scheinet, welche sowohl die eine als die andere Materie herabfallen machet: da endlich die Winde, welche sie öfters herbey führen, sie auch in die Tiefe bringen können: so müßen wir auch noch die Lage, die Gegend und die Beschafenheit des Bodes erwegen, wohin diese beyde Materien fallen, damit Sie, mein Herr! desto besser diejenige Pläze und Gegenden aussuchen mögen, wenn Sie die Versuche machen wollen, welche ich Ihnen vorzuschlagen gedenke.

Was die Lage betrift, so ist es ganz gewis und sicher daß diejenige Climate, welche zwischen den beyden Wendezirkeln liegen, viel wärmer sind als die so nahe bey den Polen sind, und daß, so wie man bey gleichem Grad der Breite über die Waßerebene des Meers höher hinauf kommt, es mag nun unter der Linie, oder in diesen Ländern oder vielleicht nahe bey den Polen seyn, man allezeit mehrere und größere Kälte empfinde, bis auf 3000 Toisen in der Höhe unter der Linie und ungefähr eben so viel in unsern Climaten, hingegen aber etwas weniger villeicht in den kalten Climaten, wie solches alles durch die Beobachtungen der Mathematiker und der Reisenden bestättiget wird.

Die Nachbarschaft der Schneegebürge, wenn noch überdieß gewiße Winde dazu kommen, kan, wie zum Exempel zu Quito geschiehet, gar wohl Kälte herfürbringen: allein es scheint solches hier dennoch in keine besondere Betrachtung zu kommen, wenn man zum Exempel nach derjenigen Kälte urtheilen soll, welche man unten an den hohen Alpen in dem Walliser oder in dem Oberland oder in Italien empfindet, welches solche Länder sind, wo es im Sommer viel wärmer ist als in Quito, obgleich das Clima derselben, nach der Breite zu urtheilen, viel kälter ist. Folglich muß die Temperatur des Boden von Quito, welches unter der Linie lieget, hauptsächlich davon herkommen, daß diese Gegend so hoch über dem Mee-

re

re ist, wodurch es der obern Atmosphäre und der Kälte in derselben näher ist, folglich auch weniger Wärme empfindet als es ohne diese Umstände erhalten würde.

In Ansehung der Gegend, beweiset die Gegend der höchsten Alpen welche ich auf dem höchsten Gipfel derselben perpendicular über dem Meer ohngefähr 2700 überhaupt aber alle mehr als 2000 Toisen hoch gefunden habe und die man zu allen Zeiten beständig von dieser Seite bis unten an ihren Fuß, den man nicht einmal von hier aus wahrnehmen kan, beeiset siehet, zur Genüge, daß die Gegend welcher sie ausgesezt sind einen großen Einfluß hat auf die größere oder geringere Kälte, welche die Länder annehmen. Dann der Schnee oder das Eis schmelzet auf denselben im Sommer auf der Seite des Walliserlandes, welche gegen Mittag lieget, einige hundert Toisen höher als auf dieser Seite, die gegen Mitternacht ist.

In Betrachtung des Bodens scheinet es richtig genug zu seyn, daß der eine mehr Wärme annehmen kan als der andere, weil es verschiedene Länder gibt, wo der sandige Boden brennend heiß ist. Allein hier ist nur davon die die Frage, ob diese warme Boden dem Eindringen der Wärme nicht mehr wiederstehen als die andere und sie nicht auch länger bey sich behalten, wenn sie einmal davon durchdrungen sind: wohingegen die andere, die leichter davon durchdrungen worden und in welche sich also auch die Wärme tiefer hineinziehen und aus-

brei-

breiten auch einen größeren Raum einnehmen kan, nicht auf ihrer Oberfläche brennen, weil die Wärme geringer ist, ohngeachtet sie ein gleiches Volumen ausgemacht hat. Was indessen die äußerste Tiefe ist, bis zu welcher die Wärme und die Kälte in einem Jahr eindringen kan, so muß dieselbe einerley seyn, indem weder mehr noch weniger Wärme oder Kälte auf 100 Quadrat Toisen heisen Sandboden als auf 100 Quadrat Toisen gemeinen Boden fällt, wenn sie eine gleiche Lage und Gegend haben.

Es ist also allerdings wahrscheinlich, daß die Sonnenstrahlen die Materie der Wärme mit sich führen, welche sie erhalten, wenn sie durch den Dunstkreis der Luft durchdringen, worinnen sich diese sowohl als die Materie der Kälte allenthalben in Menge antrefen läßt, und daß eben diese Strahlen sie sodann ablegen und durch ihren Druk auf die Erde hindruken. Dann ich kan mich nicht bereden, daß diese Materie der Wärme von der Sonne selbst herkommen sollte, weil sie in solchem Fall selbst sich sehr verzehren müßte, oder daß diese Materie sich von ihren Strahlen losmachen könnte, weil sie auf solche Weise zu ihrem eigenen Wesen gehörte. Indeßen wißen wir doch gewiß, daß sie sich davon losmacht, weil sie die Erde und alle undurchsichtige Cörper durchdringet, welche von den Sonnenstrahlen nicht durchdrungen, sondern davon nur zurükgeworfen werden, ohne die Wärme wider bey sich zu haben,

es

es müßte denn nur in einer sehr kleinen oder geringen Entfernung seyn: nur diesen Fall will ich ausnehmen, wenn man die ganze Kraft dieser Strahlen anwendet, welche sehr beträchtlich ist, um zu verhüten, daß sich die Wärme nicht davon losmachen möge, wie solches bey dem Versuche mit den Hohlspiegeln zu geschehen pfleget. Allein wenn die Strahlen der Sonne völlig frey sind und keine Hindernis finden, so macht sich die Materie der Wärme ohnfehlbar davon los, weil sie alle undurchsichtige Cörper, wie ich schon gemeldet habe, durchdringet, in welche das Licht nicht eindringen kan. Außer diesem siehet man ja auch, daß die Sonnenstrahlen, die auf unsren Erdboden durch den Mond zurükgeworfen werden, keine Wärme bey sich haben, ob sie gleich in dem Brennpunkt eines convexen Glases einen sehr hellen Schein und Glanz machen.

Ja was noch mehr: wenn die Sonnen-Strahlen die Wärme auf der Erde herfürbrächten, so würde daraus nothwendig folgen, weil doch gewiße Länder vor andern mit einer zu dieser Herfürbringung geschikten Materie mehr versehen sind, daß man unter dem Polarcirkel brennende Sandwüsten und unter der Linie in tief liegenden Gründen Eisgegenden so wie in der Tartarey finden müßte, wovon man aber noch nicht das geringste gesehen und gehöret hat. Indeßen finden sich dennoch Länder und Gegenden die zufälliger Weise kälter oder wärmer sind. Weil aber diese Zufälle selten

sind,

sind, so glaube ich daß es nicht schwehr fallen wird sie zu entdeken und bey den Versuchen welche ich Ihnen vorschlage zu vermeiden. Dann wenn sie Ihre Aufmerksamkeit und Scharfsinnigkeit dabey gehörig gebrauchen und anwenden wollen, so wird es Ihnen nicht viele Mühe kosten diesen Schwierigkeiten auszuweichen und die gehörige Maasregeln dagegen zu nehmen.

Jezt aber, mein Herr! muß ich die Frage von der Lage wider vor mich nehmen, um zu bestimmen, wo dann auf der Oberfläche der Erde das Mittelmäßige (Tempere) der ganzen Erdkugel anzutrefen sey, damit man etwas gewißes in Ansehung der Versuche festsezen könne, welche man anstellen kan um solches entdeken und auf dem Thermometer richtig bemerken zu können.

Wenn ein unveränderlicher und beständiger Grad ich will nicht sagen von dem Mittelmäßigen der ganzen Erdkugel, sondern nur von der Temperatur eines jeden Clima, allenthalben, so wie verschiedene Naturlehrer solches für wahrscheinlich gehalten und angenommen haben, 80 oder hundert Fuß tief unter der Erde angetrofen würde und wenn ferner derjenige Grad der mittleren Temperaturen der verschiedenen Climate, welcher zwischen diesem Grad und dem mittemäßigen der ganzen Erdkugel (*) ist, auch nicht über 80 oder 100 Fuß

(*) Siehe die Figur, welche hinten beygefügt ist.

Fuß noch tiefer als jener gefunden würde: so hätte man noch wohl hoffen können: 160 oder 200 Fuß tief unter der Erde das Mittelmäßige (Tempere) der ganzen Erdkugel zu finden. Ich selbst, ob ich gleich ein Gefangener bin, würde es gar leicht gefunden haben, weil an dem Ort meines Aufenthalts ein ohngefähr 160 königlich französische Schuh tiefer und in einen Felsen gegrabener Brunnen ist, über welchen ein bombenfestes Gewölbe sich findet das mit vieler Erde überschüttet und darüber noch ein großes Gebäude aufgeführet worden ist, so daß man diesen Brunnen eben so ansehen kan als wenn er 200 Fuß tief wäre. Allein man kan nichts wenigers als das Mittelmäßige der Erdkugel antrefen und alles was man darinnen zu finden hoffen kan, ist ungefähr der Grad der Temperatur in diesem Clima. Uebrigens stöhren oder hindern die Wasseradern oder Gänge, die man bey dergleichen Fällen fast allenthalben findet, gar sehr die Theorie solcher Versuche, insonderheit aber, wenn sie stark sind (*) wodurch man eben in die Noth

(*) Da diese Waßeradern wirklich die Erde mit sehr leichter Mühe durchdringen, so bringen sie die Wärme und Kälte, welche sie mit sich führen, auch viel geschwinder in dieselbe und breiten sie darinnen aus als sie sonst dahin kommen würde. Dann wann die Wärme oder die Kälte kein solches Beförderungsmittel hat, so kan sie nicht tiefer in die Erde eindringen

Nothwendigkeit versezet wird mehrere Versuche und zwar an verschiedenen Orten zu machen und hernach das Mittel aus den Veränderungen, welche sich zeigen und offenbaren, herauszuziehen und zu nehmen.

Es muß also nach meinen Gedanken das mittelmäßige der ganzen Erdkugel eine Wirkung seyn, die auf der ganzen Erde zwischen der Wärme und Kälte innenstehet, oder welches einerley ist, die mittlere Wirkung der warmen und kalten Temperaturen der verschiedenen Climate der ganzen Erde. Dann weil sie unter der Erde schon von der Schöpfung der Welt an ihre Grade der Wärme und der Kälte einander mitgetheilet haben, so mußte nach einer so langen Zeit, vermöge des unwidersprechlichen Gesezes des Gleichgewichts der beyden Materien in dem innwendigen der Erde in einer gewißen Tiefe, die aber mehr beträgt, als ich geglaubt hatte, ein mittler und beständiger Grad daher entstanden seyn. Da man aber

dringen als höchstens 80 oder 100 Fuß und dieses erst alsdann, wenn sie sechs Monate lang in der obern Luft das Uebergewicht gehabt hat. Wenn sie aber durch dieses Beförderugsmittel fortgeführet wird, welches, wie ich annehmen will, fünfzigmal geschwinder und stärker eindringet und sich beständig ausbreitet; so folget hieraus, daß die äußerste und stärkste dieser Ausbreitung nach sechs Monaten sich wohl bis auf 5000 Fuß tief unter der Erde und noch wohl darüber, wenn diese Waßeradern oder Quellen stärker sind, erstreken könne.

aber wegen der erstaunenden Tiefe, zu welcher man hinabsteigen müßte, wenn man ihn mit gehöriger Sicherheit und Richtigkeit finden wollte, auch selbst in dem temperirtesten Clima nicht dazu gelangen kan: so muß man solches freylich auf eine ganz andere Weise anfangen und durch Versuche, welche man auf der Erde in dem temperirtesten Clima und in solchen Tiefen, die man leicht antrift, anstellet, ihn zu entdeken suchen, wenn man von denen sich ergebenden Veränderungen und Abweichungen das Mittel nimmt. Wo aber dieses temperirteste Clima sey, dieses muß ich nun etwas genauer untersuchen.

Die Erde ist eine nach meinen Gedanken vollkommen sphärische Kugel, weil das Barometer in seinem mittleren Stand die Waßerlinie aller Meere mit 28 Zoll 1 Linie ohngefähr anzeiget. Die königliche Academie der Wissenschaften zu Paris behauptet in der Schrift Connoissance des tems eben so wie ich, daß sie sphärisch sey oder daß wenn ja noch einige Verschiedenheit dabey angetrofen werden sollte, solche nur so klein und geringe wäre, daß sie nicht verdiente in Betrachtung gezogen zu werden.

Wenn wir also die Hypothese der neuern Naturlehrer annehmen wollten, welche meynen daß die Kälte nichts wirkliches sondern nur ein Mangel der Wärme sey und wenn also auf der Erde nichs anders als mehr oder weniger Wärme gewesen wäre, welche durch das mehrere oder wenigere Herabfallen der Son-

nenstrahlen verursachet worden, so hätte sich das mittelmäßige, von welchem hier die Rede ist, bey dem sechzigsten Grade der Breite der Erdkugel müßen antrefen laßen, weil daselbst gerade die Hälfte der Sonnenstrahlen fällt die unter dem Aequator herabfallen, wenn wir voraus sezen daß die Sonne auf beyde Halbkugeln gleiche Wirkung äußere. Da es aber durch die Erfahrung bewiesen genug ist, daß daselbst viel Kälte herabfalle, welche die Wärme vertreibet; so ist man wohl genöthiget eine andere Hypothese zu suchen, welche diesen Erfahrungen nicht widerspricht, sondern damit aufs möglichste übereinkommt.

Wenn es also bewiesen genug ist, daß die Wärme und Kälte zwey einander entgegen gesezte wirkliche Materien auf der Erden sind, so scheinet es auch, daß ihre Menge, welche in der ganzen Atmosphäre der Luft sowohl als in der Erde selbst ausgebreitet ist, einander gleich seyn müßte, weil sie von der Sündfluth an bis auf den heutigen Tag ohne einige merkliche Veränderung sich auf der Erde beständig hin und wider bewegen und das Gleichgewicht gegen einander halten, woraus ihre Gleichheit allerdings bewiesen werden kan. Siehet man nicht auch in der That, wenn man auf die Jahreszeiten einige Jahre lang an einerley Orten acht haben will, daß sie immer einerley sind? Müßte nicht, da eine Materie der andern gerade entgegen gesezt ist, die stärkere nach einer gewißen Zeit die schwächere vertrieben haben,

ben, woferne die Kraft und der Widerstand dieser lezteren nicht für sich selbst jener gleich gewesen wäre? Da also diese beyde Materien auf der Erdkugel in gleicher Menge vorhanden sind, auch gleiche Kräfte und natürliche Stärke haben, da ferner das Spiel oder die Bewegung der einen sowohl als der andern durch die Sonne und durch die Winde, hauptsächlich aber durch die Sonne herfürgebracht und gewirket wird, so scheinet es daß das mitelmäßige der Erdkugel bey dem 45 Grad ihrer Breite seyn sollte, weil hier die Mitte des Spiels beyder vorbesagter Materien ist, zwischen den Polen nämlich und dem Aequator, wenn nur die Sonne in ihrem jährlichen Laufe sich eben so viele Tage und Stunden auf der Seite unserer Halbkugel aufhielte als auf der andern Seite, indem sie acht und ohngefähr einen viertel Tag länger auf dieser Seite bleibet als auf jener. Und wenn sie auch gleich auf dieser lezteren Halbkugel näher bey der Erde ist, so ist es dennoch darum nicht wärmer, weil sie alsdann nicht mehrere Strahlen auf die Erde wirft und ihre Wärme auch nicht von ihr selbst herkommt, wie ich schon oben gezeiget habe. Es wird also durch diese Nähe dasjenige nicht ersezet, was sie auf dieser Seite durch ihren längeren Aufenthalt mehr herfürbringet und wirket.

Dieses wird auch bestättiget durch das was die Fregatten Maria und der Adler im Jahr 1739 erfahren haben, welche gegen den Süderpol

derpol zu in der Breite von 49 Graden im November mitten auf dem Meer Eis angetroffen und zwar da die Sonne auf dieser Seite am höchsten stunde, welches eine Erfahrung ist, die wir auf unserer Halbkugel in gleichem Grade niemals gehabt haben. Hiezu kommt noch, daß die Versuche mit der Wärme und Kälte zu Lima, wenn sie mit denen, die man zu Carthagena, Panama und hauptsächlich zu Pondicheri, angestellet hat, weil Pondicheri und Lima vollkommen unter einerley Breite und Lage dißeits und jenseits des Aequators sich befinden, vergleichen werden, ganz deutlich erweisen, daß unsere Halbkugel wärmer ist als die andere.

Wenn ich also diese acht und ohngefähr einen viertel Tag, wo die Sonne auf unsre Halbkugel mehr wirket als auf die andere mit in Betrachtung ziehe, so halte ich dafür, ob ich gleich nicht im Stande bin eine genaue Rechnung hierüber zu geben und anzustellen, daß man das mittelmäßige der Erdkugel auf dieser Seite bey 46 Graden 8 Minuten der Breite, auf der andern Seite aber bey 43 Graden 52 Minuten suchen müße. Hiedurch findet man daß die zwey Bogen der kalten Climate, wenn sie zusammengenommen werden in der Anzahl der Grade den Bogen der warmen Climate gleich sind. Indeßen bleiben doch ihre Oberflächen sehr ungleich, weil die warme Climate zwey und ein halbmal so viel Oberfläche enthalten als die zwey kalte Climate haben: so daß also

die

die Quantität der Kälte, welche von den beyden Graden der Temperatur an bis zu den Polen hin sich findet, durch die Wirkung der Sonne in ein zwey und ein halbmal engeres Volumen in den kalten Climaten zusammengedruket wird als die gleiche Quantität der Materie der Wärme in den warmen Climaten ist. Daher ist auch das außerordentliche Herabfallen der Kälte auf die Erde in den kalten Climaten das durch die sehr schief auffallenden Sonnenstrahlen und durch die Beyhülfe der Winde verursacht worden, oft zwey und ein halbmal beträchtlicher und stärker als das ausserordentliche Herabfallen der Wärme in den warmen Climaten. Dieses wird auch so genau bestättiget durch die thermometrische Wahrnehmungen, welche in dem einen sowohl als in dem andern gemacht worden.

Es fiele mir noch dieses ein, daß die Kälte auf der Erde sich immer vermehre, je weiter man über die Meeres Höhe hinaufgehet, wie solches die Erfahrungen deutlich bezeugen. Daher glaube ich daß man besonders bey der Meeres Höhe, sich müße angelegen seyn laßen das mittelmäßige der Erdkugel zu suchen, weil solche in allem Betracht ein mittlerer Grad zu seyn schiene. Dann da die Aushölungen der Erde unter dem Waßer vermuthlich größer sind als die Erhöhung aller Länder über dem Waßer zusammengenommen, dieses aber wider dadurch ersezet wird, daß die Kälte und

die Wärme gar leicht hindurch dringen können, so schiene mir die Meeres Höhe das richtigste Mittel zu seyn, welches man für die mittlere Wirkung der Wärme und Kälte auf der ganzen Erdkugel ansehen und annehmen könnte. Und eben daher glaubte ich daß Rochelle und ihre umliegende Gegend zu den thermometrischen Versuchen der Lage nach der beste Plaz von der ganzen Welt sey.

Dieses, mein Herr! sind die Beweggründe, welche mich ermuntert haben dieses Schreiben an Sie ergehen zu laßen, wodurch ich die Ehre habe Ihnen vorzuschlagen, zu Rochelle oder in der umliegenden Gegend entweder selbst oder durch andere geschikte Personen welche Lust dazu haben ein ganzes Jahr hindurch alle Monate die Versuche machen zu laßen, die man daselbst mit Thermometern von meiner Erfindung zu machen Gelegenheit hat. Ich bin willig und bereit Ihnen eine hinlängliche Anzahl derselben nebst einem Exemplar meiner gedrukten Abhandlungen von den Thermometern zu überschiken wenn Sie meinen gemeldeten Vorschlag anzunehmen belieben.

Es laßen sich diese Versuche auf verschiedene Weise anstellen und machen. Erstlich nach der alten Gewohnheit, wenn man alle Tage Morgens und Abends sein Thermometer, welches immer an einer Stelle hänget, beobachtet, die Beobachtungen fleißig aufschreibet, zu Ende des Jahres zusammen zählet und

die mittlere Zahl herausnimmt, welche sodann die Temperatur des Clima eines solchen Ortes anzeiget und bestimmet. Allein diese Art scheinet mir sehr mühsam und in dieser Absicht villeicht einem Fehler leicht unterworfen zu seyn. Ja sie ist wirklich fehlerhaft in einem andern Umstand der noch unbekannt ist, den man aber leicht wird entdeken können, so bald man die Versuche wird gemacht haben, welche man zu diesem Ende nothwendig anstellen muß.

Wenn es vollkommen ausgemacht und richtig wäre, daß das Steigen und Fallen des Liquors in einem Thermometer der Quantität des Wachsthums der Wärme und Kälte, das in der Luft vorgehet, vollkommen gemäß wäre; so könnte man in solchem Fall die mittlere Summe aller thermometrischen Beobachtungen von einem oder mehreren Jahren nehmen, wodurch man den wahren Punkt der Temperatur des Clima eines Ortes erhalten würde. Da aber das Steigen und Fallen des Liquors ungleich seyn und derselbe sich villeicht bey dem äußersten Grad einer dergleichen Quantität von Kälte verhältnismäßig mehr verdiken kan, als er sich bey dem äußersten Grad einer gleichen Quantität Wärme ausdehnet, so folget daraus, daß die mittlere Summe, welche man von solchen Beobachtungen herausziehet nothwendig falsch seyn müße, wie ich Ihnen gleich ein Beyspiel von zweyerley Arten meiner Thermometer vorlegen will, um solches begreiflich zu machen.

Einige meiner Thermometer sind von Weingeist, andere aber von Quecksilber gemacht; beyde Arten aber sind von dem Mittelmäßigen an bis zu dem siedenden Waßer in 100 Grade eingetheilet. Damit ich nun diejenige, welche mit Quecksilber gefüllet sind, mit den andern in eine Uebereinstimmung bringen möchte, so habe ich angefangen sie vollkommen gleich auf einer Skala zu theilen die nebenzu stehet und außer dieser Skala habe ich noch eine andere gezeichnet, nach einer Progreßions Regel, die oben schon gemeldet worden und welche sich auf der andern Seite der Thermometer Röhre befindet: wodurch also dieses Thermometer vollkommen mit dem Thermometer von Weingeist übereinstimmet. Allein außer diesem nicht: dann wenn es in gleiche Theile eingetheilet ist, und mein Thermometer von Weingeist zeigt 25 Grad Wärme an, so steht das Thermometer von Quecksilber auf 30: desgleichen wenn das von Weingeist 25 Grad Kälte zeigt, so stehet das Thermometer von Quecksilber auf 33 $\frac{1}{3}$ Grad. Hieraus ist also offenbar, daß wenn man die mittlere Summeo von den zusammen gezählten Beobachtungen der Wärme und der Kälte nehmen wollte, die einen oder die andern und villeicht gar beyde falsch seyn müßen, weil es noch nicht entschieden und ausgemacht ist, daß das Steigen und Fallen des Weingeistes in vollkommen gleicher Verhältnis mit dem Zunehmen der Wärme und der Kälte stehe; ob ich gleich so viel weiß und überzeugt davon bin, daß

das-

daßelbe viel genauer ist als das Steigen und Fallen des Quecksilbers und wenigstens die Abweichung deßelben nicht sehr beträchtlich ist.

Eben so wenig, ja in dieser Absicht, wovon hier die Rede ist, noch viel weniger kan man sich auf diejenige Beobachtungen verlaßen, die mit den alten Thermometern des Herrn von Reaumurs gemacht worden, wie ich solches oben schon hinlänglich bewiesen habe. Ja wenn man auch dergleichen neue und so gut als möglich verfertigte hätte, so würde man doch allezeit mit diesen Instrumenten eben sowohl als mit den meinigen einem kleinen Irrthum so lange ausgesezt seyn, bis man durch richtige und genaue Beobachtungen von dem wahren Punkt der Temperatur des Ortes versichert ist. Dann man wird erst alsdann an einem solchen Orte sehen können, ob der Liquor des Thermometers während eines oder mehrerer Jahre, sich eben so viele Grade in ihrer ganzen Summe genommen unter einem dergleichen Punkt verdikt, als er sich ausgedehnet hat über demselben, wenn man widerum die ganze Summe der Grade welche über diesem Punkte gewesen sind, zusammen nimmt, wie solches nothwendig seyn muß: folglich wird man erst alsdann sagen können ob das Steigen und Fallen des Liquors in dem Thermometer richtig ist.

Wenn man nun aber die Temperatur des Ortes zu Rochelle genau und bequem bestim-

men will, weil ich doch glaube und dafür halte daß hier keine andere als die Temperatur der Erdkugel zn finden sey, welches mir eben nicht schwer seyn wird wahrscheinlich zu machen; so muß man sehen, ob man nicht in der Stadt oder in der umliegenden Gegend tüchtige Brunnen, die ein süßes Waßer führen (denn das süße Waßer nimmt allezeit genau die Temperatur von dem Orte an wo es ist) oder unterirrdische Höhlen oder Gewölber finden könne, die wenigstens vierzig Fuß tief unter der Erde sind, damit die Veränderungen des Thermometers, die man ein ganzes Jahr hindurch verspühret, so klein werden als es nur möglich ist und also die mittlere Summe, welche man nöthig hat herauszuziehen um das mittelmäßige zu bestimmen, desto weniger dem Irrthum und Fehler ausgesezt sey, von welchem ich jezt Meldung gethan habe.

Wenn der Ort zu den Beobachtungen ein Gewölbe oder der gleichen unter der Erde ist, so müßen Sie mein Herr unmaßgeblich die Lage und Gegend von außen untersuchen und in dem Ort selbst so wenig oder kurz als es möglich ist, bleiben, damit Ihr Aufenthalt daselbst mit dem Licht nicht zu viel Wärme verursache. Dieses vorausgesezt können Sie sodann zwey von meinen Thermometern an verschiedenen Pläzen jedoch in gleicher Höhe an Nägel aufhängen, nachdem Sie zuvor dieselbe sechs oder siebenfach mit Tuch oder Leinwand umwikelt haben, jedoch nur so hoch an dem Thermome-

mometer hinauf, als Sie ungefähr glauben, daß der Liquor daselbst werde stehen bleiben. Solches ist deßwegen nöthig, damit nicht, wenn Sie den Tag darauf mit dem Lichte dazu kommen und den Grad beobachten, die Wärme des Lichts nebst der Wärme Ihres Athems und Leibes durch das Tuch und Glas hindurchdringen und den Liquor in dem Thermometer in die Höhe treiben könne, ehe Sie Ihre Beobachtungen zu Ende gebracht haben. Dann man muß nun in der Nähe beobachten, schreiben und die Beobachtung nochmals wiederholen, welches allerdings einige Zeit erfordert, besonders wenn mehrere Thermometer daselbst aufgehänget sind. Noch beßer ist es wenn man im Anfang außer den schon gemeldeten zweyen noch zwey andere Thermometer einen über den andern jedoch in einiger Entfernung aufhänget und sie eben so wie jene umwikelt, damit man die Temperatur dieses Gewölbes auf allen Seiten gehörig erforsche. Nach Verfluß eines Monates aber wird nichts weiter nöthig seyn als daß man nur die Beobachtung mit einem einigen Thermometer anstelle und widerhole, welches man den Abend zuvor an den bestimmten und dazu auserseheuen Plaz bringen läßt.

Haben Sie aber noch außerdem tiefe Brunnen in Rochelle oder in der umliegenden Gegend, welche ein gutes reines Waßer haben, welches nicht viel Salpeter führet, so können Sie Sich auch derselben gar füglich zu diesen gemeldeten

Ver-

Versuchen bedienen, wenn Sie in Ihrer Gegenwart einen großen Eimer voll Waßer herausziehen laßen. In diesen müßen Sie das Thermometer sogleich ganz blos und ohne sein Brett hineintauchen, und nachdem man es oben mit einem offenen Knoten versehen, vermittelst einer durchgestekten Ruthe hinein hängen. In diesem Waßer aber muß es so lange als es nöthig ist, erhalten werden, (sieben oder acht Minuten werden für kleine, fünfzehen Minuten aber für große Kugeln hinlänglich seyn) damit es darinnen seinen Gleichgewichtspunkt erreichen könne. Es muß aber diese Beobachtung zu derjenigen Zeit des Tages angestellet werden, die der Temperatur am nächsten kommt, damit das Waßer in dem Eimer die seinige länger erhalte. Wenn nun ihre Beobachtung nach Anzeige der Seidenfaden auf dem Thermometer (hinter welche man einen Bart von einer sehr weisen Feder hält um desto genauer sehen zu können) gemacht und auch aufgeschrieben worden, so gießen Sie das Waßer aus diesem Eimer in ein anderes Gefäs, in welches Sie das Thermometer sodann hängen, damit es unterdeßen ohngefähr die Temperatur des Versuches beybehalte, bis man einen andern Eimer voll Waßer aus dem Brunnen herausgezogen, in welchem Sie von neuem das Thermometer prüfen müßen. Weil nun der Liquor in demselben fast in einem Augenblik zu seinem gehörigen Stand eilet, so wird diese zweyte Beobachtung schneller von statten gehen und

die

die Sache zuverläßiger machen. Zu noch grössserer Sicherheit könnten Sie auch noch den dritten Eimer voll Waßer herausziehen laßen mit eben der gebrauchten Vorsichtigkeit in Ansehung des Thermometers und also noch das dritte mal die Beobachtung damit anstellen.

Indeßen könnte man diese Beobachtung noch auf eine andere und villeicht bequemere Art anstellen, die auch derjenigen Schwierigkeit weniger ausgesezt ist, welche sich dabey findet, daß der Eimer in der obern Luft über dem Brunnen so lange bleiben muß: wenn man sich mit einem Thermometer versehen wollte, der in einem Futteral mit zwey Flügeln die auf und zugeschloßen werden können, befindlich wäre. Es müßte aber dieses Futteral nicht von Holz seyn, wie ich Ihnen dergleichen zu überschiken gedenke, sondern von Zinn oder weißen Blech oder von einer andern Materie die das Waßer aushält, die Grade könnten darauf gestochen und schwarz eingelaßen werden, und an dem obern Flügel müßte ein Ausschnitt einige Grade über und unter dem Punkt des Mittelmäßigen angebracht und ein Glas dafür eingesezt werden durch welches man den Stand des Liquors sehen könnte, ohne das Futteral zu öfnen. Man könnte auch über dieses Futteral noch ein hölzernes machen oder es in einen wollenen Sack hineinsteken, deßen Boden mit einem breiten schweren Teller versehen seyn müßte, damit das Instrument aufrecht stehen bleibe. Hierauf

auf läßt man daßelbe bis auf den Grund des Brunnens an einem Seil hinab und so lange daselbst, als erfordert wird daß der Liquor sein gehöriges Gleichgewicht erlangen kan und zieht es sodann wieder herauf. Man nimmt alsdann die Deke womit es umhüllet ist sogleich hinweg und beobachtet den Grad des Liquors durch das Glas. Ist aber die Deke sehr dick, so hat man in diesem Fall gar wohl Zeit das Instrument in ein nahe gelegenes Zimmer zu bringen, es daselbst erst von seiner Deke zu befreyen und zu beobachten, ehe der Liquor die geringste Veränderung leiden und anzeigen kan.

Es ist also nöthig, mein Herr, in Ihrer Stadt oder in der umliegenden Gegend unterirrdische Gewölber oder Brunnen zu suchen die wenigstens vierzig Fuß tief unter der Erde sind: ja es ist noch über das nöthig daß der Grund dieser Tiefe nicht über 80 oder 100 Fuß hoch über der Meeres Fläche sey. Wenn Sie nun meinen Vorschlag anzunehmen belieben, so will ich Ihnen, so bald ich die Ehre haben werde Ihre Antwort zu erhalten, die bestimmte Thermometer übersenden rc.

N. S.

Es scheinet mir auch nicht undienlich zu seyn wenn Sie, mein Herr, woferne es anders möglich ist, in Ihrem Hafen einen bequemen und hinlänglich tiefen Ort finden könnten der bey der Ebbe niemals troken gelegt wird und

alle

alle Wochen einmal an einerley Plaz ein Thermometer in einem zinnernen Futteral dahin hängten, welches man eine Stunde nach der Fluth wieder heraus nehmen möchte, um daßelbe zu beobachten. Dann wann man diese Beobachtungen ein ganzes Jahr hindurch fortsezte, so könnte man alsdann das Mittel davon nehmen um die Temperatur von Rochelle zu bestimmen, wo nicht ganz genau, doch zimlich nahe und wenn sodann auch die Frage von der Gleichheit des Steigens und Fallens des Liquors dadurch entschieden wird, so würden diese Beobachtungen leicht so verbeßert werden können als es nöthig ist, wenn sie genau heissen sollen.

Man müßte aber zum voraus untersuchen, wenn die Luft in der Temperatur des Morgens und des Abends sehr verschieden wäre, ob eine dergleichen Veränderung an einem solchen Plaz des Waßers eine beträchtliche Wirkung äußere. Wann dieses wäre, so müßte man in solchem Fall zu der Beobachtung die mittlere Temperatur des Waßers welche es bey Tag hat, nehmen, nur scheinet mir solches sehr schwer zu seyn, da ich niemals die Probe davon gemacht habe.

Man müßte noch überdieß durch einen andern Versuch, den ich niemals gemacht habe, sich belehren, ob das Meerwaßer genau die Temperatur des Ortes hat, wo es ist, gleichwie man solches an dem gemeinen Waßer findet, oder wie groß der Unterschied davon ist.

Wenn

Wenn man aber diesen Versuch richtig machen will, so muß man zwey gläserne Cylinder von gleicher Größe nehmen, den einen davon mit Meerwaßer und den andern mit süßem Waßer anfüllen und in jeden eines von meinen Thermometern hineinsteken. Diese Cylinder könnte man an einem Orte, wo die Temperatur der Luft sich nicht sehr verändert, gleich hoch aufhängen, die ganze Nacht über daselbst laßen und den andern Tag durch das Glas und Waßer die Thermometer beobachten, hernach könnte man die Thermometer in den Cylindern verwechseln und wider beobachten und endlich die Cylinder selbst ihre Stellen vertauschen laßen.

Anhang

zu Erläuterung einiger Fragen, welche in dem Briefe und in der hinten beygefügten Figur vorkommen.

Was wir Sonnenstrahlen nennen, kommt nicht von der Sonne selbst, das ist, durch eine Materie welche sie eigenthümlich hat, her und welche sie bis zu uns bringet: sondern nur durch einen Schein, welchen sie herfürbringt: und durch eine Bewegung welche sie der Materie mittheilet, die das Licht machet, womit die ganze Welt erfüllet ist. Dann weil die Materie so nahe beysammen ist und durch die Sonne angestoßen wird, so schikt sie uns ihr eigenes

eigenes Licht in gerader Linie von der Sonne zu und auf eine solche Weise die Strahlen zu werfen scheinet wenn die Sonne leuchtet.

Es muß also diese Materie welche das Licht machet außerordentlich subtil seyn und ihre kleine Theilgen müßen einen eigenen Schein oder Glanz vermittelst einer gewißen Bewegung bekommen können: sie müßen auch sehr hart und elastisch seyn und sich untereinander forttreiben und anstoßen können wie ein Haufe von Kugeln wenn sie einander berühren, wodurch es geschiehet, daß der Glanz und das Bild der entfernten Gegenstände sich mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in unsren Augen merken und fühlen läßet. Dieses hat auch Herr Huygens in seinem Tractat von dem Lichte so schön und deutlich bewiesen, daß es scheinet, man könne es sich unmöglich anders vorstellen.

Diese Materie also, welche man Aether nennet, wird leuchtend auf der Erde, so wie die Atmosphäre der Luft, die sich mit der Erde umdrehet, wider bey dem Anblik der Sonne in die helle Gegend kommt, welches den Morgen ausmacht. Wann aber gegen Abend die Sonne nicht mehr über dem Horizon ist wegen dem Umlauf der Erde, so nimmt dieser Glanz nach und nach ab und verschwindet endlich ganz und gar.

Indeßen können wir uns alsdann diesen Schein in dem Aether der zunächst um uns herum ist, vermittelst des Feuers welches wir an-

zünden, verschaffen und dieses beweiset also, daß die Materie dieses Scheins, den wir bey Tage genießen, sich um uns herum befinde und zum leuchten derselben nichts anders erfordert werde als der Anblik eines hellleuchtenden Cörpers.

Da nun die Atmosphäre unsrer Luft, die ganze Quantität von Aether, welche sie faßen kan, auch enthält, da ferner diese Materie durch ihre sich fortpflanzende Gemeinschaft mit der Sonne allen möglichen Schein und Glanz erlanget hat; so folget daraus, daß, es mag sich nun die Erde der Sonne nähern oder sich von derselben entfernen wiewohl nicht weiter als daß dieser Grad des Scheins dabey bestehen kan, der Schein dieser Materie immer gleich seyn müße: ausgenommen in solchen Fällen, wenn einige undurchsichtige Cörper dazwischen kommen, welches aber nur Zwischenzufälle sind die wieder vergehen.

Wir bemerken außer diesem auf unsrer Halbkugel daß wir in dem Winter Solstitium und wenn die Sonne uns am nächsten ist, nicht heller sehen als in dem Sommer Solstitium, wo sie am weitesten von uns entfernet ist. Hieraus scheinet zu erhellen, daß man eben diese Klarheit in allen Planeten haben müße, dann es finden sich auf diese Weise eine gleiche Anzahl eben so hellleuchtender Lichter daselbst, und man hat Ursache zu glauben, daß die Kraft der Sonne hinlänglich ist diesen Grad des Leuchtens zu unterhalten und bis zu den entferntesten

sten Planeten ihres Systems fortzupflanzen. Daher kommt es auch wenn wir die einen oder die andern dieser Planeten mit Fernröhren beobachten, daß sie uns alle gleich hell zu seyn scheinen.

So wie wir aber angenommen haben, daß in der Atmosphäre der Luft und in der Erde selbst zwey gleiche Quantitäten der Wärme und der Kälte gefunden werden, die durch ihre Vermischung das Mittelmäßige ausmachen; eben so haben wir auch Grund eine gleiche Quantität dieser beyden Materien in den Planeten jedoch nach dem Verhältnis ihrer Größe und eben so auch das Waßer anzunehmen, dergestalt, daß es daselbst weder kälter noch wärmer ist als auf unsrer Erde und daß man daselbst vermuthlich eben dergleichen Waßer hat.

Was die Schwere betrift, wovon in der Figur etwas gedacht wird, so muß sie auf allen Planeten unstreitig auf einerley Art herfürgebracht werden. Was aber die Ursache davon sey welche sie herfürbringt, darüber haben sich schon sehr viele müde gearbeitet und allerley Gründe herfürgesucht. Da mir wenigstens diese noch kein Genüge gethan haben, so habe ich es nicht für unschiklich gehalten meine Muthmaßungen darüber vorzulegen und zu diesem Ende zwey Hypothesen zur Wahl anzuführen, welche beyde senkrecht auf die Erde wirken, die eine durch die Attraction die andere durch den Druk.

Die Hypothese durch die Attraction bestehet in einem Kern A, so wie man ihn in der Figur siehet, welcher sich nach meinen Gedanken in dem Mittelpunkt der Erde befindet, und eine magnetische Materie wie selbst ein Magnet ausfließen läßt, die sich sehr weit ja über die ganze Atmosphäre der Luft, welche sie völlig umgiebet, ausbreitet von dannen aber vollkommen senkrecht auf die Erde herabfällt, die sie überall schnell bis zu ihrem Kern durchdringet und also alle irrdische Cörper mit sich fortreiset.

Wenn man zu dem einen oder zu dem andern Erdpole kommen könnte, so würde man sich gar leicht überzeugen können, ob diese Hypothese wahr oder falsch ist. Dann weil dieser Ausfluß senkrecht wieder in die Erde hineingeht, so muß sie nothwendig an andern Orten auf eine entgegen gesezte Weise herausgehen und zwar so, wie es bey dem Magnet geschiehet. Ich kan mir aber in diesem Fall keine andere Auswege einbilden und vorstellen als bey den zwey Erdpolen, und villeicht ist es diese Materie, wenn sie so bey den Polen herausgehet wie ein Strahl und sich sehr weit ausbreitet, welche die Polen in Ordnung hält und hiedurch die Erde nöthiget immer auf das genaueste einerley Stand in Absicht auf die Weltpolen zu erhalten, ohngeachtet dieser Stand oder Lage in Ansehung der Sonne in der excentrischen Laufbahn sich verändert, welche die Erde jährlich um dieses Gestirn herum durchwan-

wandert, welche Bewegung mir fast unmöglich zu seyn scheinet, wo man nicht eine gewiße Kraft annimmt, die im Stande ist ihre Achse immer in einerley Richtung zu erhalten.

Uebrigens läßt sich auch die immer zunehmende Geschwindigkeit des Fallens der Cörper und die Vermehrung ihrer Schwere aus dieser Hypothese sehr gut erklären. Dann weil die Canäle und Gänge des Ausflußes nothwendig in der Erde bis zu dem Kern hin immer enger werden, so muß diese magnetische Materie sie auch geschwinder durchdringen, so wie sie hinabfällt, wodurch auch die Geschwindigkeit der fallenden Cörper zunehmen und die Schwere sich vermehren muß.

Was die Hypothese durch den Druk betrift, so muß man mir zugestehen, daß nach den Gesezen der Bewegung die Schwere unter dem Aequator sehr stark sich vermindern sollte wegen der Centerfliehenden Kraft, weil die Erdkugel sich täglich um ihre Achse herumdrehet und folglich diese Kraft unter dem Aequator am stärksten seyn, sich aber immer mehr vermindern muß, so wie man den Polen näher kommt, wo sie endlich ganz verschwindet. Wir sehen aber im Gegentheil durch das Barometer, daß die Schwere der Luft unter dem Aequator und unter dem Polarcirkel bey der Meereshöhe fast einerley ist; folglich schließe ich, muß auf der Erde eine der Centerfliehenden Kraft entgegen gesezte aber gleich starke Kraft sich finden, welche jene unter dem Aequator

 wie-

wieder vernichtet und eben so bis zu den beyden Polen ihre Wirkung äußert.

Diese Kraft kan nun keine andere seyn als der Druk des Aethers, in welchem unsre Erdkugel sich herum beweget und welcher im Gegensaz die Wirkung der Centerfliehenden Kraft aufhebet. Dann dieser Druk des Aethers offenbaret sich durch die Veränderung des Barometers von dem einen äußersten Ende seiner Bewegung zu dem andern, indem sie unter dem Aequator beynahe Null sind, hernach aber immer mehr zunehmen, je näher man zu den Polen kommt: welches von nichts anders hergeleitet werden kan, als weil daselbst die Luft durch diesen Druk nicht so stark zusammen gepreßet ist und sich also mehr ausbreiten kan als unter dem Aequator.

Kan nun der Druk des Aethers eine solche Wirkung herfürbringen, so scheint es daß er auch senkrecht auf die ganze Erdkugel sich äussern könne, wodurch also die Cörper gerade zu dem Mittelpunkt der Erde hingetrieben würden und da sie alle Augenblike bey ihrem Fall neue Stöße bekommen auch in dem Fallen eine immer mehrere Geschwindigkeit erhalten müßten.

Nach-

Nachricht
von dem
Universal-Thermometer,
welches
von Weingeist, der das Pulver anzündet, gemacht ist und von dem mittelmäßigen der Erdkugel bis zu dem heftig siedenden Waßer hundert Grade anzeigen muß, wenn es bey dem Stand des Barometers auf 27. königlichen Zollen und 9. Linien bis zu diesem Punkte eingetauchet worden ist, wie solches verfertiget und verkauft wird

von

Georg Friederich Brander
Mechanicus in Augsburg.

Man nennet dasjenige Instrument ein Thermometer, welches uns durch sein Steigen und Fallen die Abwechselungen der Wärme und der Kälte in der Luft, in welcher wir leben, anzeigen kan. Es bestehet gemeiniglich aus einer gläsernen Röhre, an deren Ende eine Kugel angeschmelzet worden, wel-

welche mit Weingeist oder mit Quecksilber angefüllet ist. Die Länge der Röhre ist in gewiße Grade abgetheilet, damit man den Unterscheid des Fallens und des Steigens, so wie sich derselbe zu verschiedenen Zeiten äußert, ohne Mühe bemerken oder nach Belieben aufzeichnen kan. Drebbel ist zwar der erste Erfinder dieses Instrumentes, doch weil daßelbe, so wie er es angegeben, gar zu vielen Fehlern und Unvollkommenheiten unterworfen ware, so hat die florentinische Academie es zu verbeßern gesucht. Da aber dieses beynahe eben so viele Mängel an sich hat und besonders auch dieses daran auszusezen ist, daß es fast unmöglich ist, zwey oder mehrere Wettergläser von dieser Art zu verfertigen, die in allen Veränderungen genau miteinander zutreffen, so stehet es heut zu Tage in keiner Achtung mehr. Es beschäftigten sich nachhero verschiedene gelehrte und wizige Köpfe damit, um sichere Grundsäze und Regeln ausfündig zu machen, wodurch man in den Stand gesezet werden möchte richtige nnd mit einander übereinstimmende Thermometer zu verfertigen. Fahrenheit ware der erste in Deutschland, welcher dieses versuchte. Er ware auch in der That mit einigen, sehr glüklich, hingegen fehlte es dennoch bey andern in Ansehung dieser Gleichheit des Ganges. Newton in Engelland machte ein Thermometer von Leinöl, Reaumur verfertigte es von Weingeist, mit welchem er anfangs Waßer vermischte, nachhero aber da er merkte, daß das Waßer verursachte, daß

der Weingeist in der Röhre gefrore, daßelbe unterließe. De l'Isle gebrauchte Quecksilber hiezu, so wie hingegen von Fowlers deßen Thermometer in Engelland in den meisten Gewächshäusern gewöhnlich ist, Weingeist genommen worden. De Hales, welcher mit seinen Thermometern so schöne Beobachtungen angestellet, theils in Ansehung der Wärme, welche zu dem Wachsthum der Pflanzen erfordert wird, theils welche in den thierischen Cörpern in dem Blute anzutreffen ist, nahme zu der Verfertigung des seinigen Weingeist, da hingegen Christin sein neues Lionisches Thermometer mit Quecksilber gefüllet. Dieses sind die bekanntesten Arten von Wettergläsern, mit welchen alle nur etwas wichtige Beobachtungen sind angestellet worden. So viel man sich aber von diesen Bemühungen so vieler großer Männer versprechen möchte, so wenig ist doch dadurch ausgerichtet worden. Nicht zwar als ob diese Instrumente so sehr vielen Fehlern unterworfen wären, ob es gleich von einigen nicht völlig geläugnet werden kan, sondern nur deswegen weil eine jede Art derselben ihre eigene Abtheilung der Grade hat und ein solcher, welcher nur ein Fahrenheitisches Thermometer besizet, die Beobachtung welche nach einem Reaumurischen ist angegeben worden, nicht verstehen oder vergleichen kan. Es wäre also nothwendig, um die Wärme oder Kälte an unterschiedenen Orten vergleichen zu können, daß man mit allen diesen verschiedenen Thermometern selbst versehen

wåre. Wie viele haben aber wohl Gelegenheit hiezu? Es ist dahero die Erfindung eines Univer=sal=Thermometers, als eine Folge unsrer beson=ders in der Naturlehre sich immer mehr auf=klårenden Zeiten, mit allem Danke zu erken=nen, indem dadurch bewerkstelliget wird, daß nicht nur alle künftige Verwirrung der Natur=forscher in Bestimmung der Wårme und der Kålte aufhören, sondern auch alle vergangene Undeutlichkeit dadurch auf einmal verschwinden und in das schönste Licht gesetzet werden kan. Denn der Erfinder dieses Instrumentes hat sich nicht nur bemühet solche Thermometer zu ver=fertigen, die keinen Unterscheid unter sich selbst aufweisen könnten, sondern er hat auch durch viele angestellte Versuche, Mühe und Arbeit endlich die Art gefunden, wodurch es möglich sey, andere Arten der Thermometer mit dem seinigen in eine Uebereinstimmung zu bringen. Damit er die erstere Absicht, nemlich mit ein=ander selbst übereinstimmende Wettergläser zu machen, erreichen möchte, hat er alle die Röh=ren in Ansehung ihrer innerlichen Weite genau zu erforschen gesucht und nur solche gebraucht, welche in einer gleichen Weite fortlaufen. Er hat ferner die Ausdehnung des Weingeistes unter=suchet, und dadurch ist er auch in den Stand gesezet worden, das richtige Verhåltnis der Ku=gel zu der inneren Weite der Röhre zu bestim=men. Da er hierinnen glüklich gewesen, so muste er noch zwey feste und bestimmte Punkte haben, damit er den Raum, der sich zwischen

bey=

beyden befindet, auch in eine gewiße und bestimmte Anzahl der Grade abtheilen könnte. Der Punkt des siedenden Waßers, wenn die nöthige Sorgfalt angewendet wird, ware feste und beständig genug; hingegen lehreten ihn seine angestellte Versuche, daß es mit dem Punkte des gefrierenden Waßers oder des Eises, welchen seine Vorgänger meistentheils für bestimmt genug angesehen haben, nicht so richtig aussehe, so wie er solches zur Genüge selbst bewiesen hat in seiner Schrift, welche er hievon in französischer Sprache herausgegeben, die aber nun auch in das Deutsche übersezet worden ist und den Titel führet: **Michael du Crest kleine Schriften von den Thermometern und Barometern** **2c. Dritte Auflage Augsburg 1770.** Zu diesem Ende ware er darauf bedacht, wie er einen andern dergleichen festen Punkt finden möchte, welcher ihn in den Stand sezen könnte seine Eintheilung so richtig zu machen als es nur möglich ist. Er bemerkte, daß in dem Keller des Observatorii zu Paris, der 84. Schuhe tief ware, in einem Loche der Mauer immer einerley Stand behalte. Dieses Punktes, besonders da er ihn nachhero durch andere Versuche in tiefen Gruben bewährt und bestimmt genug gefunden hatte, bediente er sich, um das Mittel zwischen Wärme und Kälte anzuzeigen. Der Raum aber, der sich zwischen diesem mittelmäßigen und zwischen dem Punkt des siedenden Waßers fande, wurde von ihm in 100. gleiche

gleiche Theile oder Grade abgetheilet, eben sowohl als der Raum, der sich von dem Punkte des mittelmäßigen an bis zu der Kugel erstrecket. So konnte er also leicht seine erste Absicht erreichen und einstimmige Thermometer verfertigen. Die andere Absicht zu erhalten, nemlich andere Arten der Thermometer mit dem seinigen in eine Vergleichung zu bringen, hatte schon mehrere Schwierigkeiten bey sich; doch auch diese hat er glüklich überwunden, und nach vieler angewendeter Mühe, die von ihm in seiner allererst angeführten Schrift selbst beschrieben worden, gewiße Punkte, in welchen sie mit einander übereintreffen gefunden und dieselbe angegeben, so daß man mit Hülfe derselben nun durch die Rechnung, wiewohl es dennoch theils schwer theils mühsam ist, die Vergleichung derselben bewerkstelligen und zuwege bringen kan. Auf solche Art kan man also erst diese Instrumenten nüzlich gebrauchen und die an andern Orten und mit einer andern Art der Thermometer gemachte Beobachtungen mit den seinigen zusammen halten. Diese Art der Vollkommenheit bey diesem Instumente hat mich bewogen, da mir der Herr Erfinder deßelben die weitere Ausführung hievon gütigst aufgetragen, der vielen und großen Schwierigkeiten ungeachtet, die ich noch dabey zu übersteigen hatte, dieser Arbeit mich zu unterziehen, und die wenige Zeit, welche mir von meinen übrigen wichtigern mechanischen und physicalischen Arbeiten übrig gelassen wird, zu Verfertigung und Einrichtung dieser

Ther=

Thermometer anzuwenden. Damit aber auch Liebhaber wißen mögen, weßen sie sich von mir zu versehen haben, so will ich nur noch mit wenigem beschreiben, was ich theils nach denen bereits gemeldeten Vorschriften, theils zu mehrerer Vollständigkeit und Brauchbarkeit dieser Instrumente Neues hinzu gethan habe. Sie können also versichert seyn, daß keine Röhre zu einem Thermometer angewendet und keine Kugel angeschmolzen wird, deren gleiche innere Weite und Raum nicht zuerst auf das genaueste gemeßen und durch sehr mühsames Abwägen erforschet würde, damit das richtige gegenseitige Verhältnis genau bestimmet werden könne. Sie werden hierauf mit Weingeist, welcher die Probe hält, daß er das Pulver anzündet und also von wäßerichter Feuchtigkeit genugsam gereiniget ist, gefüllet, weil solches doch wegen seines gleichen Gangs der bequemste und beste Liquor ist, der zu Thermometern angewendet werden kan. Dann wenn gleich einige behaupten wollen, daß derselbe bey einer heftigen Kälte in der Röhre gefriere und solches mit dem alten Reaumurischen Thermometer beweisen, ingleichem auch daß er den Grad des siedenden Waßers niemals ausstehen könne, so ist doch das Gegentheil davon durch den Augenschein leicht darzuthun. Denn was das erste betrift, so kan das Reaumurische Thermometer nichts beweisen, indem daßelbe mit dem dritten Theil Waßer gefüllet gewesen, solches aber bey einer heftigen Kälte nothwendig gefrieren und das

In-

Instrument zerreißen muß. Seitdem bey der neuen Art dieser Reaumurischen Thermometer dieser Theil des Waßers weggelaßen worden, hat man noch niemand sich beklagen hören, daß der Weingeist in der Röhre gefriere. Besonders aber fällt dieser Einwurf fort, da zu diesen Thermometern kein anderer Weingeist gebrauchet wird, als nur ein solcher, welcher von aller wäßerichten Feuchtigkeit genugsam abgezogen worden und also nicht die geringste Gelegenheit zu dem Gefrieren mehr geben kan. Der andere Einwurf, daß der Weingeist den Grad des siedenden Waßers nicht aushalten könne, hat der Erfinder dieses Universal-Thermometers schon zur Genüge entkräftet, und ich darf mich kühnlich auf den Augenschein und auf die Probe, welche ein jeder selbst damit machen und anstellen kan, berufen, indem kein einiges von mir gegeben oder zu Ende gebracht wird, welches nicht diesen Grad der Hize ganz gut ausgestanden hätte. Dieses ist zwar gewiß, daß genugsam verdikte Luft darinnen bleiben müße, eben daher aber auch von mir dafür gesorget wird, daß sie alle unter einerley Stand des Barometers und zwar wenn derselbe auf 27. königlichen Zollen und 9 Linien sich befindet, oben zugeschmolzen worden. Ist es gleich nicht möglich in Augsburg diesen hohen Stand des Barometers zu erhalten, so habe ich dennoch ein Mittel ausfündig gemacht, wodurch ich eben diese verdikte Luft in die Röhre des Thermometers hineinbringen kan; so daß

es

es also doch an denjenigen Orten, wo die Barometer Höhe von 27. Zollen und 9 Linien sich befindet, die hundert Grade bis zu dem siedenden Waßer anzeigen muß. Hingegen aber wo zum Exempel die Barometer Höhe nur von 26 Zollen ist, so wird der Weingeist in der Röhre nicht mehr als 97. Grade in dem siedenden Waßer erreichen können, indem für jede 7. Linien des Barometers ein Grad der Höhe des Thermometers in dem siedenden Waßer abgerechnet werden muß. Außer diesen und andern Regeln, welche zu einer richtigen Verfertigung dieser Instrumente dienen und erfordert werden, habe ich eine Vergleichung der 8. bekanntesten Thermometer auf einer in Kupfer gestochenen Platte angebracht, nemlich des alt und neu Reaumurischen, Newtonischen, Delislischen, Fahrenheitischen, ingleichem der Thermometer von Hales, Fowlers und des neuen Lionischen; so daß diejenige, welche mit meinem Universal-Thermometer versehen sind, nicht mehr die Mühe haben dürfen die beschwerliche Ausrechnung selbst zu machen, sondern die Uebereinstimmung sogleich auf dieser Platte bemerken können. Denn so ist zum Exempel der Punkt des siedenden Waßers (eau bouillant) auf meinem Thermometer 100. Grade, will ich wißen wie viel er auf dem Fahrenheitischen betrage, so ist sogleich auf der linken Seite die Eintheilung deßelben angemerket und zeigt 214. Grade an. Weiter herunter ist der Punkt des siedenden Weingeistes

(Esprit

(Esprit de vin bouillant) dieser trift mit 27. und einem fünftheil Grad des Newtonischen Thermometers zu. Mit 51. Graden meines Thermometers kan die Schmelzung des Jungferwachses erhalten werden (fonte de la Cire vierge) und sogleich auf der rechten Seite kan man bemerken, daß der neu Reaumurische 60. und ein drittheil anzeige. Das Waßer in dem Eis (eau dans la Glace) ist auf 10. zwey fünftheil Grade unter der Nulle des meinigen, hingegen auf dem Delislischen auf 153. und einen halben. Nach diesen finden sich noch auf beyden Seiten zu äußerst vier andere Vergleichungen. Auf der einen ist das alte Reaumurische, deßen 13. und ein halber Grad unter der Nulle mit dem 25. und ein Viertheil Grad des meinigen, wo die mit Salmiak herfürgebrachte Gefrierung (Congelation forcée avec sel Armoniac) angemerket ist, zutrift. Gleich neben demselben aber stehet das Thermometer des de Hales, welches auf 30. und einen halben unter der Nulle stehen muß, wenn das meinige auf 29. Graden die Gefrierung mit Meersalz bezeichnet. Eben so ist es auch mit den zwey übrigen beschaffen, die auf der andern Seite zu äußerst stehen, so daß ein Liebhaber dieser Instrumente die Uebereinstimmung des seinigen mit diesen 8. Thermometern von Grad zu Grad ohne einige Mühe oder Beschwerlichkeit sehen und bemerken kan. Man kan sich auch auf die Richtigkeit der Aufzeichnung der Grade sicher verlaßen, indem sie we-

der

der einem Kupferstecher anvertrauet noch erst auf das Papier gezeichnet, sondern nach der gemachten Ausrechnung sogleich von mir selbst auf das Kupfer aufgetragen und bemerket worden sind, damit die Ausdehnung des Papiers nicht im Stande seyn möchte etwas Unzuverläßiges zu verursachen. Von diesen Thermometern nun, welche mit der möglichsten Sorgfalt, wie ich bishero gezeiget habe, von mir verfertiget werden, sind bey mir verschiedene Gattungen zu haben, nehmlich entweder solche welche bis zu 100. Graden, das ist bis zu dem siedenden Waßer hinauf steigen können, oder auch solche, welche keine so lange Röhren haben und nur 50, 60 oder 70. Grade anzeigen, welche an und für sich hinreichend genug sind Liebhaber zu vergnügen, welche nur die Wärme und Kälte der Luft damit beobachten, keineswegs aber die Versuche in dem siedenden Wasser selbst unternehmen wollen, und endlich auch Thermometer mit einer grossen Abtheilung, das ist, solche deren Grade in Viertel Grade wiederum abgetheilet sind, so daß man mit der grösten Schärfe dieselbe abzumessen im Stande ist. Diese letzte Art allein hat keine gestochene Abtheilung, sondern es muß dieselbe allezeit von freyer Hand aufgetragen und gemacht werden. Was den Preiß dieser Thermometer betrift, so können auch hievon die Liehaber versichert seyn, daß ich denselben nach der verschiedenen Beschaffenheit der Instrumente, welche sie for-

dern so billig machen werde, daß sie theils keine Ursache sich darüber zu beklagen haben, theils aber auch sehen sollen, daß meine gröste Freude darinnen bestehe dieses Instrument recht gemeinnützlich zu machen und zu einer Erweiterung auch dieses Stückes der Naturlehre beförderlich zu seyn. Endlich aber sind die Beobachtungen, welche darauf angemerket worden, folgende:

Grade der Wärme.

			Grade.
Das siedende Waßer	=	=	100
Der siedende Weingeist	=	=	$73\frac{1}{6}$
Geschmolzen Jungferwachs			51
Senegal 1738	=	=	$29\frac{1}{4}$
Marra 1736	=	=	26
Pondicheri 1737	=	=	$22\frac{1}{4}$
Paris 1738	=	=	$20\frac{1}{4}$
Basel 1745	=	=	$19\frac{1}{2}$
Mittelmäßig	=	=	●

Grade

Grade der Kälte.

	Grade.
Gefrornes Waßer oder Waßer in dem Eis = = =	$10\frac{2}{5}$
Paris 1740 = =	$21\frac{1}{4}$
Paris 1742 = =	$23\frac{1}{4}$
Gemachte Gefrierung mit Salmiak	$25\frac{1}{4}$. $2\frac{1}{3}$ Min.
Paris 1709 = =	$26\frac{1}{4}$
Basel 1745 = =	$26\frac{1}{2}$
Gemachte Gefrierung mit Meersalz	$29\frac{1}{8}$
Tübingen 1745 = =	$31\frac{1}{8}$
Schloß Arburg 1755 =	33
Tornea 1737 = =	$43\frac{1}{2}$
Reise nach Kamhatka =	$46\frac{3}{4}$
Kyringa 1738 = =	$55\frac{1}{6}$
Jenisci 1735 = =	$64\frac{1}{4}$

nacermometers

Temperirtes Clima 46. Gr. 8. Minuten

lima 43. Gr. 52. Minuten

265

31

XX VI. 97

Bayerische StaatsBibliothek

Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Micheli du Crest, Jacques Barthélemi, / Thenn, Johann Christoph, / Klett, Maria Jakobina,

Michael du Crest kleine Schriften von den Thermometern und Barometern

Augsburg 1770

Phys.sp. 188
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10133658-3
VD18 10544518